







PRAXEOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA

AVCTORE

IOSEPHO FRANK

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIIS STATVS, EQVITE ORDINIS
ST. ANNAE, ST. WLODIMERI, THERAPIAE SPECIALIS ET CLI-
NICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI PROFESSORE
EMERITO, PLVRIMARVM ACADEMIARVM ET SOCIETATVM
MEDICARVM SODALI.

PARTIS PRIMAE

EDITIO ALTERA DENO ELABORATA.

VOLVMINIS PRIMI SECTIO SECVNDA,


CONTINENS

DOCTRINAM FEBRIVM CONTINVARVM, MORBORVM
CVTIS IN GENERE, ILLANQVE PETICVLARVM, MILIA-
RIVM, BYLLARVM, VRTICARIAE, ERYSIPELATIS,
FVRVNCVLI, ANTHRACIS ET CARBVCVLLI.

L I P S I A E

SVMP TIBVS BIBLIOPOLII KUEHNIANI
CICIDCCCXXVI.





CONSPECTUS

RERUM PARTIS I. VOLUM. I. SECTION. 1 et 2.
PERTRACTATARUM.

VOL. I. SECT. 1.

CONSPECTUS HISTORIAE ET LITERATURAE PRAXEOS MEDICAE.

- Doctrinae definitio, utilitas, difficultas et historia.*
§. I. p. 3.
Doctrinae definitio. 1.
utilitas. 2.
difficultas. 3.
historia. 4.
- Medicinae origo. Medicina Aegypti et Graeciae. Hippocrates. Dogmatici. Empirici. Asclepiades.*
§. II. p. 11.
Medicinae origo. 1.
Medicina Aegypti et Graeciae. 2.
Hippocrates. 3.
Dogmatici. 4.
Empirici. 5.
Asclepiades. 6.
- Methodici. Pneumatici. Eclecticici. Theosophi. Schola Alexandrina. Secula barbara.*
§. III. p. 17.
Methodici. 1.
Pneumatici. 2.
Eclecticici. 3.
Theosophi. 4.
Schola Alexandrina. 5.
Secula barbara. 6.
- Arabes. Schola Salernitana.*
§. IV. p. 22.
Arabes. 1.
Schola Salernitana. 2.
- Seculum XIII. XIV. XV.*
§. V. p. 24.
Frank Prax. I. 1. 2.
- Seculum XIII. 1.*
Seculum XIV. 2.
Seculum XV. 3.
Seculum XVI. §. VI. p. 26.
Scholae Hippocraticae. 1.
Restauratio anatomiae. 2.
Conciliatores. 3.
Seculum XVII. §. VII. p. 31.
Paracelsus. 1.
Baco, Sydenham, Baglivi etc. 2.
Van Helmont. 3.
Iatro-chemici. 4.
Nova schola Hippocratica. 5.
Seculi XVIII. Initium.
§. VIII. p. 39.
Iatro-mathematici. 1.
Newtoni principia medicinae applicata. 2.
Boerhaave. 3.
Medicina dynamica. Stahl. 4.
Fr. Hoffmann. 5.
Conciliatores. 6.
Vallisneri. 7.
Seculi XVIII. Medium.
§. IX. p. 45.
Epocha aurea. 1.
Physiologia et anatomia pathologica. 2.
Materia medica. 3.
Meteorologiae. Topographiae. Morbi epidemici, endemici, contagiosi. 4.
a Mor-

- Morbi aetatum. 5.
 sexuum. 6.
 classium, exerci-
 tuum, artificum
 etc. 7.
 Monographiae. 8.
 Instituta clinica, et thera-
 pia specialia. 9.
 Dissertationes inaugurales. 10.
 Observatores. 11.
 Academiae scientiarum et
 societates medicae. 12.
 Diaria medica. 13.
 Nosologiae. 14.
Seculi XVIII. Finis.
 §. X. p. 68.
 Cullen. Brown. 1.
 Darwin. C. L. Hoffmann.
 Barthez. 2.
 Iatro-chemici. Concilia-
 tores. 3.
 Monitum. 4.
 Anatomia pathologica. 5.
 Historia naturalis et mate-
 ria medica. 6.
 Topographiae. Morbi en-
 demicis, epidemicis, con-
 tagiosi. 7.
 Morbi aetatum et sexuum.
 8.
 exercituum, clas-
 sium, artificum
 etc. 9.
 Monographiae. 10.
 Instituta clinica et therapia
 specialia. 11.
 Dissertationes inaugurales
 et programmata. 12.
 Observationes. 13.
 Academiae scientiarum et
 societates medicae. 14.
 Diaria. 15.
 Nosologiae. 16.
 Encyclopaediae et reperto-
 ria. 17.
 Vaccina. 18.
Seculi XIX. Initium.
 §. XI. p. 90.
 Doctrina del contro-sti-
 molo. 1.
 Xavier. Bichat. 2.
 Broussais. 3.
 Philosophia transcenden-
 talis medicinae applica-
 ta. 4.
 Magnetismus animalis. 5.
 Medicina mystica et magi-
 ca. 6.
 Hahnemann. 7.
 Conclusio. 8.
 Fautores anatomiae patho-
 logicae. 9.
 Auctores de meteorologiis.
 topographiis, morbis en-
 demicis et epidemicis. 10.
 Inquisitores contagiorum.
 11.
 Scriptores de morbis hac-
 reditariis, congenitis etc.
 12.
 de morbis aetatum
 et sexuum. 13.
 de morbis exerci-
 tuum, opificum
 etc. 14.
 monographiarum.
 15.
 Auctores therapiae specia-
 lis. 16.
 Professores clinices. 17.
 Observatores. 18.
 Academiae scientiarum. So-
 cietates medicae. Dia-
 ria. 19.
 Nosologiae, dictionaria,
 encyclopaediae, reperto-
 ria. 20.
 INTRODUCTIO AD STU-
 DIUM CLINICUM.
*Quaenam a nobis praxin me-
 dicam tractandi via incun-
 da sit.* §. XII. p. 111.
 Generatim. 1.
 Quid philosophia? 2.
 Quid chemia? 3.
 Quid mathesis? 4.
 Quid solidum vivum? 5.
 Quid observatio? 6. Eri.

Febris subcontinua. 2.
 Aliae larvatae. 3.
*Febres intermittentes benignae
 et perniciosae.* §. XXIV.
 p. 237.
 Divisio. 1.
 De febribus intermittenti-
 bus perniciosis in spe-
 cie. 2.
*Febres intermittentes regula-
 res et irregulares.* §. XXV.
 p. 238.
 Febres intermittentes in
 regulares et irregulares
 dividuntur. 1.
 Febres intermittentes re-
 gulares. 2.
 irregulares et ano-
 maliae. 3.
Necroscopia. §. XXVI.
 p. 245.
 Observationes. 1.
 Conclusiones. 2.
Causae. §. XXVII. p. 254.
 Paludosae regiones febrium
 intermittantium incuna-
 bula. 1.
 Quo pacto febres intermit-
 tentes producant. 2.
 An ob oxygenii defectum?
 3.
 An ob humiditatem? 4.
 An ob effluvium specifi-
 cum? 5.
 Miasma. 6.
 Miasma differt a contagio.
 7.
 Quando paludes praecipue
 febres intermittentes ge-
 nerent. 8.
 Aliae causae. 9.
 Causa proxima. 10.
Diagnosis. §. XXVIII.
 p. 272.
 Febres intermittentes a re-
 liquis morbis periodicis
 distinguuntur. 1.
 a febribus se-
 cundariis
 quibusdam

distinguun-
 tur. 2.
*Diagnosis febrium intermit-
 tentis manifestae.* 3.
 febris subconti-
 nuae. 4.
 aliarum febrium
 larvatarum. 5.
 febrium inter-
 mittentium
 infantum. 6.
 febrium inter-
 mitt. benigna-
 rum et perni-
 ciosarum. 7.
 typhorum in ge-
 nere. 8.
 quotidianae. 9.
 tertianae. 10.
 quartanae. 11.
 quintanae. 12.
 aliorum typho-
 rum. 13.
 indolis morbi.
 14.
 febris intermit-
 tentis simpli-
 cis. 15.
 inflammato-
 riae. 16.
 rheumaticae
 et catarr-
 rhalis. 17.
 gastricae in
 genere. 18.
 saburra-
 lis. 19.
 biliosae.
 20.
 pituitosae. 21.
 vermi-
 nosae.
 22.
 Complicatio febrium in-
 termittentium cum mor-
 bis chronicis. 23.
Prognosis. §. XXIX. p. 302.
 Pericula. 1.
 Utilitas. 2.
 Restrictio. 3.

Pro-

CONSPECTUS.

▼

Prognosis stadiorum. 4.	Cura febris gastricae sabur-
febrium perniciosarum. 5.	ralis. 10.
typorum. 6.	biliosae. 11.
febris intermittens simplicis et complicatae. 7.	pituitosae et verminosae. 12.
Cura. §. XXX. p. 320.	febris intermitt. simplicis. 13.
Prophylaxis. 1.	Cinchona. 14.
Morbi cura dividitur. 2.	Cinchonae species. 15.
Cura imminantis paroxysmi. 3.	Tempus administrationis. 16.
frigoris. 4.	Forma. 17.
caloris. 5.	Dosis. Modus exhibendi. 18.
sudoris. 6.	Correctiva. 19.
paroxysmi febris intermittens larvatae et perniciosae. 7.	Cinchonae praeparata. 20.
febris intermitt. inflammatoriae. 8.	De remediis surrogatis in genere. 21.
rheumaticae et catarrhal. 9.	Radices variae. 22.
	Herbae nonnullae. 23.
	Cortices varii. 24.
	Flores aliqui. 25.
	Semina. Fructus. 26.

VOL. I. SECT. 2.

DE FEBRIBUS CONTINUIS.

CAP. I.

De febre inflammatoria. p. 3—3.

<i>Definitio. Literatura.</i> §. I. p. 3.	<i>Diagnosis.</i> §. IV. p. 10.
Definitio. 1.	Nominis ratio. 1.
Literatura. 2.	Distinctio ab aliis febribus. 2.
<i>Symptomata. Necroscopia.</i> §. II. p. 5.	a febre intermitt. inflammatoria. 3.
Symptomata prodroma. 1.	Variae febris continuae inflammatoriae species. 4.
constitutiva. 2.	Febris inflammatoria cum phlogosi. 5.
Necroscopia. 3.	Monitum. 6.
<i>Causae.</i> §. III. p. 7.	Febris continua inflammatoria
Causae praedisponentes. 1.	
excitantes. 2.	
Causa proxima. 3.	

- toria cum exanthemati-
 bus. 7.
 Complicationes. 8.
 Decursus. 9.
 Distinctio a febre hec-
 tica. 10.
 a carditide, ar-
 teritide et
 phlebitide. 11.
Prognosis. §. V. p. 14.
 Boni effectus. 1.
 Mali effectus. 2.
Cura. §. VI. p. 16.
 Fons dieteticus. 1.
 Venae sectio. 2.
 Hirudines. 3.
 Cucurbitulae scarificantes.
 4.
 Epispastica. 5.
 Clysteres. 6.
 Pharmaca. 7.
 Ejusdem argumenti conti-
 nuatio. 8.
 Cura complicationum. 9.
 metastaseos. 10.
 convalescentiae. 11.
 Monitum. 4.
 Item. 5.
 Variae febris rheumaticae
 species. 6.
 Complicatio inflammatoria.
 7.
 Monitum. 8.
Prognosis. §. XI. p. 38.
 Generatim. 1.
 Prognosis febris rheumati-
 cae complicatae. 2.
 ex conditione
 aegroti. 3.
 sub defectu re-
 giminis et cu-
 rae. 4.
Cura. §. XII. p. 41.
 Prophylaxis. 1.
 Cura febris rheumaticae
 simplicis. 2.
 Continuatio argumenti. 3.
 Cura febris rheumaticae
 inflammatoriae. 4.
 Continuatio argumenti. 5.
 Cura morbi protracti. 6.
 Convalescentia. 7.

CAP. II.

*De febre rheumati-
ca.* p. 21—50.

- Definitio. Historia.* §. VII.
 p. 24.
 Definitio. 1.
 Historia. 2.
Symptomata. Necroscopiae.
 §. VIII. p. 26.
 Symptomata. 1.
 Necroscopiae. 2.
Causae. §. IX. p. 28.
 Causa proxima. 1.
 Causae praedisponentes. 2.
 excitantes. 3.
Diagnosis. §. X. p. 33.
 Est morbus sui generis. 1.
 Differt a febris inter-
 mittentibus. 2.
 Differt a febre continua
 inflammatoria. 3.

CAP. III.

*De febribus catar-
rhalibus.* p. 50—90.

- Definitio. Literatura.*
 §. XIII. p. 50.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
Symptomata. Necroscopia.
 §. XIV. p. 65.
 Symptomata febrium cat-
 arrhalium solitarum. 1.
 febrium catar-
 rhalium inso-
 litarum. 2.
 Necroscopia. 3.
Causae. §. XV. p. 70.
 Causae praedisponentes. 1.
 excitantes. 2.
 Causa proxima. 3.
Diagnosis. §. XVI. p. 74.
 Facilis confusio. 1.

Di-

Distinctio a febris in-
termittentibus. 2.
Febris catarrhalis simplex.
3.
 complicata. 4.
 inflammato-
 ria. 5.
 rheumatica. 6.
Prognosis. §. XVII. p. 77.
Generalia. 1.
Prognosis febris catarrhalis
inflammatoriae. 2.
 rheumaticae. 3.
 gastricae. 4.
 nervosae. 5.
 ex peculiari ae-
 gri conditione. 6.
Cura. §. XVIII. p. 81.
Prophylaxis. 1.
Cura febrium catarrhalium
simplicium. 2.
 inflammatoria-
 rum solita-
 rum. 3.
 inflammat. inso-
 litarum. 4.
 febris catarrh. rheu-
 maticae. 5.
Monitum respiciens emeti-
ca. 6.
 excitantia. 7.
Monita ad aegrium pecu-
liarem conditionem re-
spicientia. 8.
Convalescentia. 9.

CAP. IV.

De febris gastri-
cis. p. 90—167.

De argumento generatim.
§. XIX. p. 90.
Definitio. 1.
Divisio. 2.
Rerum ordo. 3.
De febre continua gastrica
saburrali primaria, ex in-
gluvie. §. XX. p. 91.

Definitio. 1.
Scriptores. 2.
Symptomata. 3.
Necroscopia. 4.
Causae praedisponentes. 5.
 excitantes. 6.
Causa proxima. 7.
Diagnosis. 8.
Prognosis. 9.
Prophylaxis. 10.
Cura. 11.
Continuatio argumenti. 12.
Monitum. 13.
Cura convalescentiae. 14.
De febris gastrico-sabur-
ralibus ex alimentis pravae
indolis. §. XXI. p. 102.
Definitio. 1.
Monitum. 2.
Fungi. 3.
Mel. 4.
Myili. 5.
Pisces. 6.
Carnes. 7.
Lac. 8.
Caseus. 9.
Farcimina seu botuli. 10.
De febris gastrico-sabur-
ralibus secundariis.
§. XXII. p. 117.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Causae praedisponentes. 4.
 excitantes. 5.
Causa proxima. 6.
Diagnosis. 7.
Prognosis et cura. 8.
De febris gastrico-biliosae.
§. XXIII. p. 123.
Definitio. 1.
Literatura. 2.
Symptomata. 3.
Necroscopia. 4.
Causae praedisponentes. 5.
 excitantes. 6.
Causa proxima. 7.
Diagnosis. 8.
Fallacia symptomatum. 9.
Distinctio ab aliis mor-
bis. 10.

Di-

- Distinctio a febre intermittente. 11.
 Varia indoles. 12.
 Febris biliosa simplex. 13.
 inflammatoria. 14.
 rheumatica; catarrhalis. 15.
 Prognosis. 16.
 Cura febris biliosae simplicis. 17.
 inflammatoriae. 18.
 rheumaticae. 19.
De febribus gastrico-pituitosis. §. XXIV. p. 148.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
 Symptomata. 3.
 Necroscopia. 4.
 Causae praedisponentes. 5.
 excitantes. 6.
 Causa proxima. 7.
 Diagnos. 8.
 Febris pituitosa simplex. 9.
 gastrica pituitosa inflammatoria. 10.
 pituitosa gastrico-saburralis. 11.
 pituitoso-nervosa.
 Prognosis. 13.
 Cura febris pituitosae simplicis. 14.
 inflammatoriae et rheumaticae. 15.
 gastricae saburralis. 16.
 Monitum. 17.
De febre gastrico-verminosa. §. XXV. p. 156.
 Definitio. 1.
 Literatura. 2.
 Symptomata. 3.
 Necroscopia. 4.
 Causae. 5.
 Diagnos. 6.
 Prognosis. 7.
 Cura. 8.
 Continuatio argumenti. 9.
 Continuatio argumenti. 10.
 Finis argumenti. 11.
 CAP. V.
De febribus nervosis. p. 168—252.
De argumento in genere. §. XXVI. p. 168.
 Definitio. 1.
 Monita. 2.
 Distinctio cardinalis. 3.
 Aliae distinctiones. 4.
De febre nervosa ex inflammatoria. §. XXVII. p. 170.
 Symptomata. 1.
 Necroscopia. 2.
 Causae. 3.
 Diagnos. 4.
 Prognosis. 5.
 Cura. 6.
De febre nervosa ex rheumatica. §. XXVIII. p. 175.
 Symptomata. 1.
 Necroscopia. 2.
 Causae. 3.
 Diagnos. 4.
 Prognosis. 5.
 Cura. 6.
De febre nervosa ex catarrhali. §. XXIX. p. 178.
 Symptomata. 1.
 Necroscopia. 2.
 Causae. 3.
 Diagnos. 4.
 Prognosis. 5.
 Cura. 6.
De febribus nervosis ex gastricis. §. XXX. p. 183.
 Notio. 1.
 Literatura. 2.
 Symptomata. Complicatio. 3.
 Transitus. 4.
 Ne-

Necroscopia. 5.
Causae. 6.
Diagnosis. 7.
Continuatio argumenti et
prognosis. 8.
Cura. 9.
Monitum. 10.

De febribus nervosis primariis.
§. XXXI. p. 203.

Indroductio. 1.
Symptomata prodroma. 2.
febris nervosae
acutae. 3.
febris nervosae
lentae. 4.

Necroscopia. 5.
Causae. 6.
Diagnosis. 7.
Continuatio argumenti. 8.
Argumenti finis. 9.
Prognosis. 10.
Transitus in alios morbos.
11.

Cura generatim. 12.
Continuatio argumenti. 13.
Cura complicationis in-
flammatioriae. 14.
aliarum complicatio-
num. 15.
morbis simplicis. 16.

Regimen diaeteticum. 17.
Continuatio argumenti. 18.
Continuatio argumenti. 19.
Continuatio argumenti. 20.
Cura symptomatum. 21.
aetuae. 22.
delirii. 23.
haemorrhagiarum.
24.
ischuriae. 25.
obstipationis alvi et
meteorismi. 26.
decubitus et gangrae-
nae. 27.
parosidis. 28.

Pharmaca. 29.
Acida. 30.
Arnica. Valeriana. 31.
Angelica. Calamus. Ser-
pentaria. 32.
Camphora. 33.

Moschus. 34.
Asa foetida. 35.
Castoreum. 36.
Crocus. Vanilla. 37.
Ammonia. 38.
Aetherea. 39.
Phosphorus. Mercurius.
Opium. 40.
Cinchona. 41.
Remedia externa. 42.
Monita. 43.

*De convalescentia post febres
nervosas.* §. XXXII.
p. 246.

In genere. 1.
Convalescentiae phaenome-
na. 2.
Recidiva. 3.
Cura convalescentiae. 4.
Continuatio argumenti. 5.
Finis argumenti. 6.

DE MORBIS CUTIS.

CAP. VI.

*De morbis cutis in
genere.* p. 255—335.

De argumento generatim.
§. XXXIII. p. 255.

Cutis consideratio. 1.
Scriptores. 2.
Doct. hae difficultas. 3.
Ordo noster. 4.

Symptomata. Necroscopia.
Analysis chemica.
§. XXXIV. p. 266.

Generatim. 1.
Stigma. 2.
Macula. 3.
Furfur. 4.
Squama. 5.
Crusta. 6.
Papula. 7.
Tuberculum. 8.
Vesica. 9.
Phlyctaeana. 10.
Pustula. 11.

Pru.

- Pruritus. 12.
 Necroscopia. 13.
 Analysis chemica. 14.
 Causae. §. XXXV. p. 268.
 Generatim. 1.
 Vitii haereditaria et congenita. 2.
 Aetas. 3.
 Sexus. 4.
 Constitutio corporis. 5.
 Clima. 6.
 Vestes. 7.
 Immundities. 8.
 Opificia. 9.
 Insecta. 10.
 Vermes. 11.
 Vegetabilia. 12.
 Contagia. 13.
 Pharmaca et venena. 14.
 Alimenta. 15.
 Sanguis. 16.
 Transpiratio. 17.
 Urina. 18.
 Bilis. 19.
 Semen. 20.
 Menstrua. 21.
 Lochia. 22.
 Lac. 23.
 Adeps. 24.
 Animi pathemata. 25.
 Motus, vigiliae. 26.
 Connubium causarum. 27.
 Causa proxima. 28.
 Diagnos. §. XXXVI. p. 280.
 Generatim. 1.
 Diagnos. formae in genere. 2.
 indolis in genere. 3.
 Exanthematum divisio. 4.
 Exanthemata symptomati-
 ca. 5.
 primaria. 6.
 Monitum. 7.
 Stadia varia. 8.
 Stadium latentis contagii. 9.
 invasionis. 10.
 eruptionis. 11.
 efflorescentiae. 12.
 desquamationis. 13.
 Stadium suppurationis. 14.
 exsiccationis. 15.
 Convalescentia. 16.
 Indoles exanthematum pri-
 mariorum. 17.
 Exanthemata primaria sim-
 plicia. 18.
 Complicatio inflammato-
 ria. 19.
 gastrica. 20.
 nervosa. 21.
 Observatio. 22.
 Impetiginum divisio. 23.
 Impetiginis primariae. 24.
 secundariae. 25.
 inflammato-
 riae. 26.
 gastricae. 27.
 arthriticae. 28.
 carcinomati-
 cae. 29.
 scrophulosae. 30.
 scorbuticae. 31.
 venereae. 32.
 nervosae. 33.
 Observationes. 34.
 Prognosis. §. XXXVII. p. 296.
 Prognosis exanthematum
 symptomaticorum. 1.
 primario-
 rum. 2.
 impetiginum pri-
 mariarum. 3.
 secundaria-
 rum. 4.
 Cura. §. XXXVIII. p. 300.
 Generatim. 1.
 Ars cosmetica. 2.
 Prophylactica. 3.
 Continuatio argumenti. 4.
 Finis argumenti. 5.
 Cura exanthematum sym-
 ptomaticorum. 6.
 primario-
 rum. 7.
 primario-
 rum sim-
 pli-

plicium. 8.	CAP. VII.
Cura exanthematum primariorum inflammatorum. 9.	<i>De peticulis.</i> p. 335 — 360.
primario- rum ga- strico- rum. 10.	<i>Definitio. Historia.</i> §. XXXIX. p. 335.
primario- rum ner- veorum. 11.	<i>Definitio.</i> 1. <i>Historia.</i> 2.
Monitum. 12.	<i>Symptomata. Necroscopia.</i> §. XL. p. 338.
Cura retrocessus. 13.	<i>Symptomata prodroma.</i> 1. <i>eruptionis.</i> 2.
convalescentiae. 14.	<i>Efflorescentia.</i> 3.
impetiginum genera- tim. 15.	<i>Desquamatio.</i> 4.
localium. 16.	<i>Necroscopia.</i> 5.
Manus chirurgica. 17.	<i>Causae.</i> §. XLI. p. 343.
Remedia abstergentia. 18.	<i>Causae praedisponentes.</i> 1. <i>exaltantes.</i> 2.
Res insectis contrariae. 19.	<i>Causa proxima.</i> 3.
Remedia emollientia. 20.	<i>Diagnosis.</i> §. XLII. p. 345.
irritantia. 21.	<i>Distinctio peticularum a</i> <i>morsibus pulicum.</i> 1.
adstringentia. 22.	ab aliis ex- anthemati- bus et im- petigini- bus. 2.
narcotica. 23.	Peticulae num exanthema primarium an secunda- rium? 3.
caustica. 24.	<i>Continuatio argumenti.</i> 4.
Cura impetiginum sympto- maticarum. 25.	<i>Continuatio argumenti.</i> 5.
inflammato- riarum. 26.	<i>Finis argumenti.</i> 6.
gastrico- rum. 27.	Peticulae in febribus inter- mittentibus. 7.
arthritico- rum. 28.	inflammato- riis. 8.
carcinoma- ticarum. 29.	rheumaticis. 9.
serophulo- sarum. 30.	gastricis. 10.
scorbutica- rum. 31.	nervosis. 11.
venerica- rum. 32.	<i>Prognosis.</i> §. XLIII. p. 355.
nervosa- rum. 33.	<i>Generatim.</i> 1.
complicationum. 34.	<i>Prognosis peticularum fe- bris intermittens pete- chizantis.</i> 2.
retrocessus impetigi- num. 35.	in febribus in- flammatiis et rheumati- cis. 3.
	<i>Prognosis.</i>

Prognosis peticularum in febris gastricis. 4.
in febris nervosis. 5.
Cura. §. XLIV. p. 357.
Generatim. 1.
Cura febris intermittens petechizantis. 2.
peticularum in febris inflammatoriis et rheumaticis. 3.
in febris rheumaticis et catarrhalibus. 4.
in febris gastricis. 5.
in febre nervosa. 6.
Monitum. 7.

CAP. VIII.

De miliaribus. p. 361 — 412.

Definitio. Historia. §. XLV. p. 361.

Definitio. 1.

Historia. 2.

Symptomata. Necroscopia. §. XLVI. p. 369.

Symptomata prodromata. 1.

Eruptio. 2.

Efflorescentia. 3.

Desquamatio. 4.

Necroscopia. 5.

Causae. §. XLVII. p. 375.

Causae praedisponentes. 1.
excitantes. 2.

Causa proxima. 3.

Diagnosis. §. XLVIII. p. 383.

Facilis confusio. 1.

Distinctio a peticulis. 2.

Complicatio peticularum et miliarium. 3.

Miliaria num exanthema primum an symptomaticum? 4.

Miliaria

in febris intermittenti-
bus. 5.

inflammatoriis.

6.

rheumaticis. 7.

catarrhalibus. 8.

gastricis. 9.

Continuatio argumenti. 10.

Miliaria in febre nervosa,
peste, typho etc. 11.

Prognosis. §. XLIX. p. 391.

Generatim. 1.

Prognosis miliarium
in febris intermittenti-
bus. 2.

inflammatoriis.

3.

rheumaticis et
catarrhalibus.

4.

gastricis et ner-
vosis. 5.

Reliquiae. 6.

Cura. §. L. p. 396.

Generatim. 1.

Continuatio argumenti. 2.

Cura miliarium
in febris intermittenti-
bus. 3.

inflammatoriis,
rheumaticis et
catarrhalibus.

4.

gastricis. 5.

nervosis. 6.

Continuatio argumenti. 7.

Finis argumenti. 8.

Cura recessus miliarium.
9.

CAP. IX.

De bullis. p. 412 — 425.

Definitio. Historia. §. LI. p. 412.

Definitio. 1.

Historia. 2.

Symptomata. Causae.

§. LII.

p. 417.

Symptomata. 1.

Causae.

Causae 2.
Diagnosis. §. LIII. p. 421.
Facilis confusio. 1.
Distinctio a vesicis acci-
dentalibus. 2.
a miliaribus. 3.
Bullae exanthema sympto-
maticum. 4.
in febribus intermit-
tentibus. 5.
in febre gastrica. 6.
nervosa, po-
ste et ty-
pho. 7.
in arthritide. 8.
in peripneumonia. 9.
in dysenteria. 10.
Prognosis. Cura. §. LIV.
 p. 425.

Prognosis. 1.
Cura. 2.

CAP. X.

De urticaria. p. 426
 — 436.

Definitio. Historia. §. LV.
 p. 426.

Definitio. 1.

Historia. 2.

Symptomata. Causae.
 §. LVI. p. 428.

Symptomata. 1.

Causae. 2.

Diagnosis. §. LVII. p. 431.

Facilis confusio. 1.

Distinctio a maculis, tu-
berculis etc. 2.

a miliaribus ru-
bris. 3.

Urticaria exanthema sym-
ptomaticum. 4.

in febribus in-
termitteuti-
bus. 5.

rheumati-
cis. 6.

gastricis.
 7.

nervosis.
 8.

Prognosis. Cura. §. LVIII.
 p. 436.

Prognosis. 1.
Cura. 2.

CAP. XI.

De erysipelate.
 p. 437 — 479.

Definitio. Historia. Momen-
tum. §. LIX. p. 437.

Definitio. 1.

Historia. 2.

Momentum. 3.

Symptomata. Necroscopia.
 §. LX. p. 441.

Symptomata, generatim. 1.

Erysipelas universale. 2.
capitis. 3.
trunci. 4.
neonatorum. 5.
extremitatum. 6.
internum. 7.

Necroscopia. 8.

Causae. §. LXI. p. 449.

Causae praedisponentes. 1.
excitantes. 2.

Causa proxima. 3.

Diagnosis. §. LXII. p. 456.

Facilis confusio. 1.

Distinctio a bullis. 2.
ab urticaria. 3.

Indoles varia. 4.

Erysipelas locale. 5.
rheumaticum. 6.
inflammato-
rium. 7.
gastricum. 8.
nervosum. 9.

Observatio. 10.

Erysipelas arthriticum. 11.
februm inter-
mittentium
symptoma. 12.
scorbuticum. 13.
carcinomaticum
et leprosum.
 14.

Prognosis. §. LXIII. p. 463.
Generatim. 1.

Exi-

Exitus. 2.
 Resolutio. 3.
 Oedema. 4.
 Induratio. 5.
 Suppuratio. 6.
 Exulceratio. 7.
 Gangraena. 8.

Cura. §. LXIV. p. 468.

Cura erysipelatis localis. 1.
 rheumatici. 2.
 inflammato-
 rii. 3.

Continuatio argumenti. 4.

Cura erysipelatis gastrici. 5.
 nervosi. 6.
 arthritici. 7.
 scurbutici. 8.
 carcinomati-
 ci. 9.

 convalescentiae. 10.

 exituum. 11.

 retrocessus. 12.

Prophylaxis erysipelatis ha-
 bitualis. 13.

CAP. XII.

De furunculo. p. 479
 — 489.

Definitio. Literatura.

§. LXV. p. 479.

Definitio. 1.

Literatura. 2.

Symptomata. Causae.

§. LXVI. p. 481.

Symptomata. 1.

Causae. 2.

Diagnosis. §. LXVII. p. 484.

Facilis confusio. 1.

Distinctio a comedonibus. 2.

Distinctio ab urticaria. 3.

 Varia indoles. 4.

Prognosis. Cura. §. LXVIII.
 p. 486.

Prognosis. 1.

Cura. 2.

CAP. XIII.

*De anthrace et car-
 bunculo.* p. 490—512.

Definitio. Historia. §. LXIX.
 p. 490.

Definitio. 1.

Historia. 2.

*Divisio. Symptomata. Necro-
 scopia.* §. LXX. p. 494.

Divisio. 1.

Symptomata. 2.

Necroscopia. 3.

Causae. §. LXXI. p. 498.

Contagium epizooticum. 1.

Insecta. 2.

Cachexia. 3.

Diagnosis. §. LXXII. p. 503.

Facilis confusio. 1.

Distinctio a bullis. 2.

 ab erysipelate. 3.

 a furunculo. 4.

Differentia inter anthracem
 et carbunculum. 5.

Epinyctis, thermintum quid
 sint? 6.

Prognosis. Cura. §. LXXIII.
 p. 506.

Prognosis. 1.

Prophylactica. 2.

Cura generatim. 3.

 localis. 4.

 universalis. 5.

DE
FEBRIBUS CONTINUIS.



Frank Praez. I. 1. 2.

A



CAPUT I.

De febre inflammatoria.

§. I.

Definitio. Literatura.

1. **F**ebbris continua, parum plerumque re-Definitio.
mittens, primum frigore sat intenso, dein calore
magno (attactui tamen amoeni), rubore cutis
universae (inprimis faciei), oculorum splendore,
vibratione arteriarum, pulsuque (nisi oppresso)
pleno, duro et constante, atque proclivitate ad
phlogoses et haemorrhagias, insignita, *inflamma-*
toria dicitur¹⁾.

A 2

2. De

1) *Synon.* Synochus imputris (GALENI); synochus simplex (HOFFMANNI); febris continens (STANLI); febris continua non putrida (BOERMAAVII); synocha (SAUVAGESII et CULLENII); febris inflammatoria (STOLLII); febris continens non putrida (SELLII); febris continua inflammatoria (J. P. FRANKII); Pyrexia (BRUNONIS); febris angiolenica (PINELII); febris irritativa (HUFELANDII); enecia cauma (MASQUE GOOD); pyrexia crethistica, neurico-sanguinea (HARLESSII), febris vasorum. ITALIC. *Febbre infiammatoria*. GALL. *Fièvre inflammatoire*. GERM. *Entzündungs-Fieber*. SUEC. *Brand-Feber*. DAN. *Betændelses feber*. ANGL. *Inflammatory fever*. BELGIC. *Ontstekings-Koorts*. HISP. *Calentura inflammatoria*.

Literatura. 2. De febre inflammatoria in specie scripserunt HENCKEL²⁾, FORST³⁾, DERCUM⁴⁾, KALT-SCHMIED⁵⁾, NEUBERT⁶⁾, LUDOLF⁷⁾, ITTNER⁸⁾, HARRER⁹⁾, FORDYCE¹⁰⁾, MÜLLER¹¹⁾, REIL¹²⁾, AYGALERG¹³⁾, WUCKE¹⁴⁾, GAUDICHAU - DELESTRE¹⁵⁾, MÜLLER¹⁶⁾, TONNET¹⁷⁾ aliique¹⁸⁾.

§. II.

- 2) Diss. de febr. inflammatoriis. Erfurt. 1747.
- 3) Diss. de febr. inflammator. in genere. Argent. 1747.
- 4) Diss. de febr. inflammator. in genere. Herbip. 1748.
- 5) Diss. de inflammationibus febre acuta stipatis, sive de febr. inflammat. in genere. Jen. 1750.
- 6) *Kenzeichen und Ursachen hitziger Entzündungsfieber.* Königsb. 1753.
- 7) Diss. de febr. inflammat. Erf. 1755.
- 8) Diss. de febr. inflammat. Mogunt. 1762.
- 9) Diss. de febr. inflammat. earumque phaenomenis. Mannheim. 1769.
- 10) *New inquiry into the causes, symptoms and cure of putrid and inflammatory fevers.* Lond. 1773.
- 11) Diss. de febribus inflammat. Erf. 1777.
- 12) Diss. de febre inflammat. simplici. Hal. 1794.
- 13) *Dissertation sur la fièvre angioténique inflammatoire.* Paris 1800.
- 14) Diss. de febre inflammat. Würceb. 1805.
- 15) *Essai sur la fièvre inflammatoire.* Paris 1806.
- 16) Diss. de febre inflammat. Lips. 1810.
- 17) *Essai sur la fièvre inflammatoire angioténique.* Paris 1813.
- 18) FOURNIER et VAIDY in *dictionnaire des sciences médicales.* T. XV. p. 247 — 257.; J. G. SCHLEGEL *Fieberlehre.* Erf. 1824. p. 78 — 111.

§. II.

Symptomata. Necroscopia.

1. Febris inflammatoria ut plurimum extem-
plo evolvitur. Alias illam praecedunt sensus tor-
poris, inquietudinis, et caloris interni, noctes in-
somniais perturbatae, rubor insolitus faciei, capi-
tis gravedo, vertigo, aurium susurrus, sitis, ci-
borum desiderium modo deletum, modo auctum,
dolores artuum et lumborum, atque interdum
sanguinis e naribus stillicidium.

2. Febris ipsa frigore, plerumque sat intenso, Sympto-
haud tamen multum protracto incipit. Succedit ^{mata pro-}
calor, magnus quidem, sed attactui amoenus. ^{droma.}
Corporis volumen augetur. Venae turgent. Cutis,
primum arida, dein sudore sive universali, sive
partiali, eoque vaporoso cooperitur. Pulsus ple-
nus, durus, interdum oppressus, ut plurimum
modice frequens semperque constans. Facies ac
universum corpus rubent, oculi splendent, lucem
aegre ferunt, palpebrae tenduntur, nares, os,
lingua et labia siccescunt, magna est sitis, cum
potus frigidi desiderio. Urgent pro re nata ce-
phalaea, vigiliae, sopor, et interdum transitoriae
convulsiones. Vibrant cor et arteriae tum caro-
tides, tum temporales. Respiratio fit anhelosa,
intercurrente tussicula. Urina pauca, ignea, sub
mictu uret. Alvus obstructa. Saepe sanguis
sponte e naribus, vagina, ano manat, vel in tex-
tum cellulosum vasa cutis capillaria ambientem,
sub

sub forma macularum lenticularium deponitur. Cruor e vena ope vulnusculi duarum vel trium linearum, ita ductus, ut spatio vigesimae horae partis circiter octo illius unciae vase metallico colligantur, talis, inquam, cruor in placentam (marginibus elevatis introrsum reclinatis instructam), coire, crustam sic dictam phlogisticam¹⁾ formare, gravitatem specificam majorem²⁾ electricitatemque minorem exhibere³⁾ solet. Placenta illa mollior est, albumen sanguinis minus ab alcohole et a calore coagulatur, facileque in materiam lacteam et pultaceam commutatur⁴⁾. Interdum

1) Recentissimi de hoc argumento scriptores sunt: J. E. BELHOMME *observations faites à l'Hôtel-Dieu sur le sang et la couenne inflammatoire pendant l'an 1823. (Revue médicale, mars 1824)* et C. SCUDAMOR *an essay on the blood, comprehending the chief circumstances which influence its coagulation, the nature of the buffy coat etc. Lond. 1824.*

2) JOHN DAVY in *philosophical transactions of the Royal society of London for the year 1822.*

3) C. F. BELLINGHRI *sull' elettricità del sangue nelle malattie.* — Magnus iste aevi nostri physiologus et nuper mihi scripsit: *„gli dirò che ho fatte molte nuove esperienze, le quali sempre mi confermano che nelle malattie infiammatorie l'elettricità del sangue è minore di quello che sia nello stato di salute.“*

4) PARMENTIER et DREUX *Abhandl. über das Blut in REIL's Archiv für Physiologie. 1. B. 2. Heft. p. 5.* Cfr. G. KOENIG *diagn. physiologico-pathologica sistens*

dum vero sanguinem hic vidimus vix a normali diversum. Donec febris inflammatoria cruoris aut spontanea aut artificiali evacuatione non infringatur, remissiones haud conspicuae sunt. Solvitur morbus plerumque post unum alterumve nychthemeron; alias ad septimum protrahitur diem. Crisis fit per indicatas haemorrhagias, praeterea per sudorem, per urinam, largo sedimento puriformi instructam, per alvi profluvium, per somnum, et per metastasin. Morbo neglecto aut male tractato symptomata febris nervosae, phlebitidis, viscerumque phlogoseos, propriis periculis stipata, in conspectum veniunt.

3. *Cadavera* sic defunctorum multifaria ex-^{Necrosco-}hibent phaenomena. Inter haec proximum cum^{pi.} morbo primario, febre videlicet inflammatoria, nexum habet phlogosis arteriarum et venarum illiusque varii exitus 5).

§. III.

C a u s s a e.

1. Praedisponunt ad febres inflammatorias Praedispo-
nentes.
aetas

experimenta quaedam circa sanguinis inflammatorii et sani qualitatem diversam instituta. Bonnae 1825.

- 5) Cfr. Partis secundae, voluminis secundi, sectionis secundae Cap. XIV. §. LVI. Cap. XVIII. §. LXXIV. Et R. I. BERTIN *traité des maladies du coeur et des gros vaisseaux, rédigé par J. BOUILLARD. Paris 1824. chap. de l'aortite.* G. B. JEMINA *cenno sull' aortite toracica acuta (In repertorio medico-chirurgico di Torino. No. 57. Settembre 1824).*

aetas infantilis, juvenilis et media, senili non excepta¹⁾; corporis fabrica robusta, ossa nimium voluminosa, muscoli torosi, vasa sanguinea ampla; temperamentum sanguineo-cholericum; sexus masculinus, alias epocha catameniorum, graviditatis, puerperii, lactationis et cessationis menstruorum; venaesectionis habitualis intermissio; evacuationes consuetae, imprimis cruentae, suppressae; sed et illarum excessus, imprimis phlebotomiae crebrae²⁾; vitia congenita vel acquisita cordis vasorumque majorum; victus praeter modum succulentus, e regno animali petitus, aromatibus aliisque vegetabilibus aestuosis conditus; potus vini, alcoholis, taphiae, cerevisiae fortis, coffeae; usus protractus pharmacorum calefa-

1) An medicum in RICHTERO cognosceres, ubi ait: „Das Entzündungsfieber befallt nur gesunde, starke und (!) robuste Personen im mittleren Alter von 20 bis 40 Jahren, sehr selten Kinder (!!) und alte Leute. (Specielle Therapie. I. B. p. 123.)? —

2) Doctrina antiquiorum pathologorum de plethora ad vasa (BÜCKNER de crebriore sanguinis missione plethorae genitrice. Halae 1758) hio mirifico cum illa recentiorum de nimia arteriarum irritabilitate, ut februm inflammatoriarum causa, convenit. (GATTI del sangue e del salasso considerati sotto nuovi rapporti. Bologna e Torino 1824). „Dal salasso, ait, la debolezza, e dalla debolezza l'intolleranza; dal contatto poi del nuovo irritante sangue nel circolo la reazione, quindi l'infiammazione dei vasi.“

lefacientium³⁾; regiones montosae⁴⁾; transitus repentinus hiemis siccae in ver; calor⁵⁾ et electricitas⁶⁾ atmosphaerae.

2. Excitantur febres inflammatoriae aquilone Excitantur et euro, ignotâ annua seu epidemica constitutione^{tes}, praeposterâ vestium hiemalium depositione, insolatione, balneis calidis, corporis nimio motu, e. c. laboribus duris, cursu, exercitiis gymnasticis et palaestricis, choreis etc.; ebrietate, irâ, vigiliis, contagiis, quibusdam venenis, et violentiis externis.

3. Repetebatur *causa proxima* febris inflam- Proxima.
matoriae: a sanguinis fermentatione⁷⁾; — a mu-
tuo

3) E. c. guttularum antihystericarum, aloes etc.

4) Legi meretur de hoc argumento PANZANI *Beschreibung der Krankheiten in Istrien*. Lübben 1801.

5) Calorem, non frigus, febribus inflammatoriis favere, observationes ab aliis circa morbos regionum tropicalium et a me circa illos Lithuaniae, collectae, docent. Sub rigidissima hieme, thermometro Reaumuriano per hebdomadem inter gradum vigesimum tertium et vigesimum nonum sub congelationis puncto fluctuante, morbos inflammatorios vix Vilnae conspexi, saltem non crebriores, quam reliqua anni temporibus. Nec, quâ hic occurrunt, morbi inflammatorii, tanta vi saeviunt, ac in Austria et Insabria.

6) HOPF diss. sistens rudimenta theoriae de principio febres inflammatorias epidemicas gignente. Tubingae 1794. — BELLINGHAMI l. c.

7) Chimiatri. Cfr. Conspectus hist. et lit. prax. medicae. § VII. 4.

tuo inter sanguinem et vasorum parietes attritu⁸⁾; — ab illius lentore mucosaeque conditione⁹⁾; — a cruore, oxygenio abundante¹⁰⁾; — a sthenia seu virium vitalium excessu¹¹⁾; — a vita arteriosa ad altiore, quam par est, potentiam evecta¹²⁾; et a statu inflammatorio arteriarum¹³⁾. Haec quidem ultima opinio veritati proxima videtur; verum nec *sanguinis ipsius* constitutio morbosa¹⁴⁾, nobis ignota, excludenda est.

§. IV.

D i a g n o s i s .

Nominis
ratio.

1. Ut in morbo, de quo agitur, denominando, hypothesium vix allatarum vestigia, quousque licet, evitarem; illum nomine usitatissimo, febris continuæ *inflammatoriae* compellavimus.

Incen-

8) Istomechanici. §. VIII. 1.

9) BOERHAAVE ibid. 3.

10) BAUMES *fondemens de la science méthodique des maladies*.

11) BROWN *elem. med.*

12) VAL. AB HILDENBRAND op. c. T. II. p. 201.

13) WEDEKIND et J. P. FRANK in *Epitom. de cur. hom. morbis*. Vol. I. p. 187.

14) RAIMANN (*Handbuch* §. 74.) statum irritationis systematis vasorum pro probabili febrium inflammatoriarum causâ proxima agnoscens, addit „*verbunden mit erhöhtem Leben im Blute selbst, mit beschleunigter und vermehrter Bereitung, und grösserer Geneigtheit derselben zur Gerinnung (organischen Bildung)*,” Cfr. LAPPENBERG diss. de diathesi sanguinis inflammatoria. Gotting. 1783.

Incendii enim metaphora, cui hujusmodi innitur denominatio, scopo therapeutico optime respondet.

2. Characteres gentilitii febris continuae inflammatoriae in data ejus definitione exarati sunt. Distinctio ab aliis febribus. Toties ad illos recurrendum erit, quoties de distinctione febris continuae inflammatoriae ab aliis, adhuc describendis, febribus quaeretur.

3. *Distinctio febris continuae inflammatoriae* Distinctio a febr. intermittente inflammatoria. *interdum ardua est.* Conveniunt enim inter se haec febres, quod ambae a frigore sat intenso ordiuntur. Differunt, quod febris intermittens inflammatoria, nisi apyrexiam perfectam, saltem remissionem evidentem habet; quod vero febris continua inflammatoria parum remittit. Praeterea haec febris ut plurimum sporadice¹⁾; — illa plerumque epidemice obvenit.

4. Inter ipsas vero febres inflammatorias *differentiae* locum obtinent. Febres enim istae modo *per se*, modo *phlogosi*, aut *exanthematibus primariis* stipatae, apparent. Quum hoc ultimo in casu morbus adpellationem aut a parte phlogosi correpta, aut a forma eruptionis cutaneae nanciscatur; nomen *febris continuae inflammatoriae* pro primo illo reservatur. Variae febris continuae inflammatoriae species.

5. Cacterum prorsus convicti sumus, phlogoses Febr. inflammatoriae.

1) „Aussi la fièvre angioténique est-elle presque toujours sporadique.“ FOURNIER et VAIDY l. c. p. 251.

cum phlogosi. goses viscerum, quae epitheto *inflammatoriarum* salutarī solent, re ipsa nil aliud esse, quam *febres continuas inflammatorias, cum eminente phlogosi partiali*. Pars prae aliis laeditur, dum illa caussis febris inflammatoriae generalibus quoque prae aliis patula est. Praeterea ad eundem effectum etiam praedispositio, sive haereditaria, sive, morborum praegressorum culpa, acquisita, concurrit.

Monitum. 6. Absit vero, ut allatam doctrinam quoque ad phlogoses *originis traumaticae* extendamus. Hic enim morbus e parte inflammata emanat, febrisque plane symptomatīca est. Et talis febris, favente constitutione annua et dispositione aegrotorum morbis inflammatoriis, indolem inflammatoriā induere valet. At magna inter eam et febriem inflammatoriā primariā intercedit differentia! Ibi enim febris a phlogosi pendet, hic contra phlogosis a febre regitur.

Febris contin. inflamm. cum exanthematibus. 7. *Febres continuae inflammatoriae cum exanthematibus primariis* (e. c. variolis, morbillis, scarlatina), id proprium habent, quod sua absolute percurrere debent stadia. Quoniam exanthemata haec *post* febrem comparere solent, quaeritur, quomodo ista in primo morbi limine a febre inflammatoriā simplici distinguī possint? Distinguitur propter absentiam signorum, quae exanthematū primariorum adventum annuntiant²⁾.

tiant²⁾. Dubia vero hoc sub respectu interdum urgere, debitis docebitur locis.

8. Febris continua inflammatoria, quæ, ob ^{Complica-} defectum phlogoseos partialis et exanthematum, ^{tiones.} simplex dicitur, caeterum *complicationes* rheumaticas, catarrhales, gastricas et nervosas, serius indicandas, non respuit.

9. Tam simplex, quam complicata febris con- ^{Decursus.} tinua inflammatoria, frequentissime ut *ephemera* decurrit. Alias etiam septimum attingit diem. In genere quis istiusmodi morborum limites statuere auderet? Fateri nihilominus oportet, a nobis febrim *inflammatoriam chronicam*, de qua mentio injicitur³⁾, visam non esse. Cavendum, ne hoc sub respectu *febres hecticæ*, et *inflammationes* diuturnæ *cordis* et *vasorum majorum* in errorem ducant.

10. *Febris hectica* similitudinem, quam ab ^{Distinctio} initio cum febribus intermittentibus habuit⁴⁾, ^{a febre he-} ^{ctica.} progrediente morbo amittit, ac sub forma febris continuæ sævit. Huic quoque feбри haud raro symptomata inflammatoria sociæ sunt. At quum febris hectica phlogoses, in suppurationes conversas, sequatur, et præter symptomata localia istiusmodi suppurationum, maciem, evacuationes colliquativas et defluvium capillorum sociæ agnoscat,

²⁾ Cap. VI. §. XXXVI. No. 10.

³⁾ J. P. FRANK l. c.

⁴⁾ Part. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXVIII. No. 2.

scat, facillime illa a febribus inflammatoriis simplicibus distinguitur.

Distinctio 11. Longe difficilior est harum febrium distinctio a *carditide*, *arteritide* et *phlebitide*. Neque id mirum, quum inter statum irritationis vasorum sanguiferorum in febre inflammatoria, et inter illorum inflammationem, *gradus* dumtaxat differentia locum obtineat. Haec tamen differentia admodum conspicua est; in febre enim inflammatoria simplici, gravis angustia, magna praecordiorum oppressio et deplorabilis pulsuum conditio, carditidi, arteritidi et phlebitidi propriae, desiderantur. Excipi solummodo merentur febres inflammatoriae, quae miliaris stipantur, priusquam nempe hoc exanthema prorumpat, ut plurimum symptomata, quae illis inflammationum vasorum sanguiferorum admodum similia sunt, observari solent.

§. V.

P r o g n o s i s.

Boni effectus. 1. *Febris continua inflammatoria* per se periculo vacat. Imo ea sub forma ephemeræ, praecipue vernali tempore obveniente, salutaris esse solet. Vidimus saltem homines diu haemorrhoidibus, viscerum abdominalium vitiis, arthritide et labe mercuriali excruciatos, illius ope, pro tempore saltem, incolumes evasisse. Itaque ephemeræ inflammatoriae non immerito *depuratoriae* vocan-

vocantur. Quum autem de bonis istis effectibus nonnisi superata jam febre, certitudo habeatur; ab initio morbi prognosis esto cauta.

2. Potest enim febris continuæ inflammato-^{Mali effe-}
 riae simplici inopinate visceris cujusdam nobilis ^{ctus.}
phlogosis cum suis sequelis adsociari. Porro *hae-*
morrhagia, in genere salutaris ac haud raro cri-
 tica, aut modum excedendo, aut in contextum
 viscerum irruendo magna interdum portendit pe-
 ricula. Sunt praeterea aegri, qui conspicuum
 febris inflammatoriae gradum, quin vires multum
 decrescant, diu sustinere nequeant. In illis tran-
 situs morbi in *febrem nervosam* timendus. Et
miliare exanthema a febribus continuis inflam-
 matoriis (praecipue certarum regionum et puer-
 perarum) non alienum; praeter omnem expecta-
 tionem graves excitare valet angustias. Tandem
 quo propius illae febres ad pericarditidem, arte-
 ritidem et phlebitidem accedunt; eo majora et
 multifaria urgent pericula. Nisi enim lymphæ
 coagulabilis a membrana interna vasorum san-
 guiferorum exsudata per renes excernatur, atque
 sub specie sedimenti puriformis albi in urinis
 compareat; illius in varia corporis humani loca,
 secundum ignotas leges, depositio expectari de-
 bet. Sic, febre inflammatoria versus finem ver-
 gente, brachium dextrum feminae inopinate sum-
 mo dolore correptum fuisse observavimus. Ex-
 plorata illico parte dolente, en, sine praevia
 phlo-

phlogosi abscessus jam maturus! In doctrina inflammationis vasorum sanguiferorum palam fit¹⁾, quot mala chronica, plerumque insanabilia, illo ex morbo, saepe sub forma febris inflammatoriae simplicis, recondito, ortum trahant. Adde pericula, quae e simplici hac febre in aegrum, jam prius vitiis organicis cordis vasorumque majorum contaminatum, incidente, emergunt. Postremo ipsa illa vitia, dum tandem in chronicam phlogosin desinunt speciem febris inflammatoriae, prognosi atra notandam, exhibent.

§. VI.

C u r a.

Fons diae-
teticus.

1. Febris continua inflammatoria *simplex* saepe uno *regimine diaetetico* debellatur. En illius cardines. Nisi agatur de puerpera, de aegro sudore irrorato, miliaribus cooperto, deque sene consuetudini adhaerente; vestes, amicula cubicularia, mitrae dormitoriae, idque genus alia, removenda sunt. Decumbat enim aeger, indusio dumtaxat tectus, in lecto amplo, culcitris plumeis et stragulis lanceis destituto. Astantes sunt pauci, animus et mens tranquilli, conclave spatiosum. Temperaturam illius inter caloris gradum duodecimum et decimum quartum thermometri Reaumuriani optamus. Aeger parvis iisque repetitis

1) Part. II. Vol. II. Sect. II. Cap. VII. §. XXIII. 2.
Cap. XIV. §. LVI. 1. Cap. XVIII. §. LXXIV. 4.

titis haustibus multum aquae fontanae vel simplicis vel syrupo citri (limonada), aceti, berberum, ribesiorum, mororum, vaccinii oxycoci, vel oxymelle ad gratum usque saporem nuptae, bibat. Potus liquorum fermentatorum omnis generis, ciocolata, thea, coffea, sacra sunt. Ita carnes eorumque juscula licet tenuia. Nil enim hic impedit, quominus aeger per unum alterumve nycthemerum absque cibis maneat. Caeterum, fame urgente, praesertim apud pueros, oryza, hordeum, avena, in aqua decocta, cum parva butyri et salis copia, concedi possent. Ita appropinquante convalescentia fructus horaei vel recentes, dummodo maturi, vel cocti unoque saccharo conditi.

2. *Venaesectio* tunc solum indicatur, dum ^{Venaesectio} aegrotus est valde robustus et plethoricus; dum morbus ab omissione vel suppressione evacuationis sanguinis habitualis excitatus fuit; dum natura ipsa haemorrhagiam spontaneam largiorem incassum molitur; et maxime, dum cerebrum, spinalis medulla, trachea, pulmones, cor, vasa sanguifera atque viscera abdominis et pelvis phlogoseos periculum incurrunt. Hoc ultimo in casu *venaesectio revulsiva* (juxta praecepta in tractatibus specialibus inflammationum tradenda) indicatur. Alias parum interest, qualis pro sanguine emittendo seligatur locus. Ut plurimum brachium sinistrum phlebotomiae inservit. Homini adulto cruoris ab uncis novem usque ad libram detra-

himus; infanti tot circiter drachmas, quot illi uncias¹⁾. Necessitas, venam repetitis vicibus secandi, raro in hoc morbo occurrit. Fracto enim illius impetu, quod reliquum est, naturae tutissime committitur. Venaesectionem eousque repetere, donec omnis febris extincta fuerit, idem est, ac illius crisin impedire, et aegros graviores in morbos, aut saltem in diuturnam convalescentiam conjicere²⁾.

3. Mor-

1) Sanguinis emissi pondus accuratissime determinandum esset, rite monente J. FR. GLASSER (*Blutwage und Blutgeschirr. Hildburghausen 1758. et: „Send-schreiben den 21. May 1764. im 281. Stück des Arztes“*).

2) De venaesectionis abusu legantur: J. PORES de nimis licentiosa ac liberaliore intempestivaque sanguinis missione, qua plerique hodie abutuntur. Lion. 1566. — CASTELL de abusu phlebotomiae. Romae 1628. — J. FUCHS compendium abusuum auctoritate Galeni et Hippocratis dampnatorum. Monachii 1629. — DE LA COUVÉE frequentis phlebotomiae usus et cautio in abusum. Paris. 1647. — P. BARRA *abus de l'antimoine et de la saignée. Lion 1664.* — ABRAH. a GEHMA *Grausame med. Mordmittel. Bremen 1688.* — DODART non ergo phlebotomia magnorum morborum omnium princeps et universale remedium. Paris. 1691. — C. HORNLAGER *höchstschädliche Wirkung d. Aderlassens und Purgirens. Ulm 1691.* — R. J. CAMERARIUS diss. de abusu venaesectionum. Tubing. 1715. — FR. HOFFMANN diss. de venaesectionis abusu. 1730. Opp. T. VI. — HEISTER diss. de venaesectionis abusu apud Gallos. Helmst. 1750. — BOYER *de l'abus*

3. Morbus noster, quippe in vasis majoribus ^{Hirudi-}
 vigens, et affectione locali destitutus, *hirudines* ^{ica.}
 generatim respuit. Nec credas, illas ad praepe-
 diendam affectionem localem inservire posse.
 Morsu enim et suctione hirudines affluxum san-
 guinis in partem, prope quam adplicantur, pro-
 movent, qua ratione phlogosis in ea potius eli-
 citur. Hirudinum itaque usum ad illas circum-
 scribimus febres continuas inflammatorias simpli-

B 2 ces,

de la saignée démontré par des raisons de la nature.
 Paris 1759. — CH. G. W. BEHRISCH *die Missbräuche*
des Aderlassens. Leipz. 1767. — MELON *Abhandl.*
vom Missbrauch des vielen Aderlassens. Nürnberg 1774.
 — BALDINGER *de abusu sanguinis missionis in variis*
morbis. Gotting. 1778. (v. opuscula p. 157.). —
 BACH *Abhandl. über die Schädlichkeit des allzugrossen*
Blutlassens in Ansehung der Seelenwirkung. Bresl. 1786.
 — M. E. STYX *über den Missbrauch des Aderlassens in*
den nördlichen Provinzen Russlands. Riga 1793. — J.
 M. SCHRAO *über den Missbrauch des Aderlassens und*
die daraus entspringenden Folgen. Stuttgart 1815. —
 L. BUCCELLATI *il salasso considerato quale causa della*
maggior parte delle malattie e della frequenza delle im-
mature ed improvisi morti in onta a tutte le leggi.
Italia 1819. — HUFELAND *die Gefahren der Blutent-*
ziehung (in *Journ. der pr. Heilk.* 1824. Jan. p. 1.). —
 HOPPE in *Bibliothek für Lægar.* 1823. p. 231. — L.
 ANGELI *l'abuso del salasso condannata dall' autorità de'*
sommi pratici, dalla ragione, e dalla sperienza. Imola
 1824. — *Della prudenza necessaria nella prescrizione*
dei salassi, ossia avvertimento salutare al popolo. Mi-
 lano 1825.

ces, quae ex suppressione cujusdam haemorrhagiae salutaris ortum ducunt, quaeque in hominibus debilioribus adeo mite decurrunt, ut phlebotomiam instituere piaculum foret. Hoc in casu hirudines partibus, e quibus sanguis prius manare erat solitus, admoventur. Quantis cum cautelis id fieri debeat, debitis locis indicabitur. Hic adhuc per transennam dicendum, nos in neonatis, qui morbis inflammatoriis, phlebotomiam exposcentibus, corripuntur, hirudinem, lanceolae loco, venae aut medianae aut saphenae admove-re, partem dein sauciatam, detracta necessaria cruoris copia, consueta fascia circumdando.

Cucurbitulae scarificantes.

4. *Cucurbitulae*, imprimis *scarificantes*, prae-
via venaesectione ad sanguinem magis magisque a corde et vasis majoribus ad corporis superficiem inque systema vasorum capillarium revocandum inserviunt. Tanta autem vi hoc chirurgicum instrumentum corporis superficiem aggreditur, tantamque operari illud solet cruoris revulsionem, ut neque hominibus delicatis, neque illis, qui de vitiis vasorum sanguiferorum suspecti sunt, adcommodari tuto possit. Reservatur igitur pro rusticis, militibus, aliisque, habitu corporis athletico donatis.

Epispastica.

5. De *vesicatoriis*, utpote febribus continuis inflammatoriis simplicibus e diametro oppositis),

tis³⁾), nequaquam loquimur. Quisne enim prudens igni ignem admovert? Tutius *sinapismi*, haud acerrimi, procul a parte, phlogoseos periculum incurrente, per breve temporis spatium appliciti, usurpantur. Si enim sinapismi vehementem excitent dolorem, cutemque exedant; quo teneriores sunt aegri aetas et constitutio, eo evidentius nocent, pabulumque feбри addunt. Quamobrem apud infantes et feminas, *panis fermentum*, *aceto adpersum*, omni alio epispastico anteponimus. Sunt, qui adhuc mitiora commendant⁴⁾).

6. *Clysteres* ex furfuribus, aut herbis emollientibus aqua decoctis, additis oleo olivarum paucoque sale culinari, tepideque adhibiti, omni nycthemero semel bisve injiciendi sunt, si alvus obstructa fuerit, si aeger absque magna adversitate illos admittat, sique haemorrhoides ani non obstant.

7. *Pharmacorum*, quibus ad curandas febres *Pharmacae* continuas inflammatorias simplices indigemus, dispensatio, pharmacopolas non reddet divites. Enimvero in ephamera, - quum medici prudentia sit, ante omnia observare, quorsus ingruens morbus

3) Probatur meridiana luce clarius a BAGLIVIO (diss. VII. vid. opp.) — TRALLESIO (usus vesicantium salubris et noxius in morborum medela. Berolini 1776.) multisque aliis.

4) Cataplasma ex seminibus lini (DESRUELLES in *Journ. universel des sciences médicales*. 1824. Janvier).



bus tendat, tempus formulas concinnandi fere deest. In reliquis febribus inflammatoriis, quid praeter *nitrum*, *cremorem tartari* et *tamarindos* commendandum foret, ignoramus. Nec magnae hujusmodi pharmacorum doses requiruntur⁵⁾; alias enim a *nitro* cardialgia, et a *cremore tartari* atque a *tamarindis* alvus liquida imminet. — *Salem* quidem *ammoniacum*, nitri aemulum, in febre inflammatoria simplici curanda non spernimus, ast ob ingratum illius saporem vix adhibemus. Pro usu *calomelani* et *foliorum digitalis purpureae* nulla hic urget necessitas. Haec enim pharmaca adversus febres inflammatorias, quae jam ad inflammationem cordis et arteriarum spectant, determinandis sub circumstantiis, reservari debent. Illa adversus simplicem febrem inflammatoriam in usum ducere, idem foret, atque in levi excubiarum externarum pugna tormenta, obsidioni urbium munitarum dicata in auxilium vocare.

Ejusd. argumenti
continuat.
tiq.

8. Sudor salutaris versus febris inflammatoriae simplicis finem erumpens probe sustinendus, ast non

5) R. Pulv. nitri grana quinque — cremoris tartari — sacchari albi 32 grana decem. M. S. Cap. secunda quaque hora pulverem. — Cfr. P. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXX. (37). — R. Fructuum tamarindorum unciam unam, mellis puri uncias duas. Nitri puri drachmam unam. Ebulliant per aliquot horae momenta. Colatum librae unius d. s. Cap. sesquiunciam secunda quaque hora.

non vi promovendus. Itaque aeger tantillum magis cooperitur stragulis, commutato potu frigidiusculo in tepidum, puta infusum *florum* sive *sambuci*, sive *tiliae*. Fortiora diapnoica, nec excepta multorum panacea, videlicet *spiritu Blindereri*, nocent. Idem de *tartaro emetico* dicendum.

9. Febris inflammatoria *complicata* juxta prae-^{C. complicatio-}cepta, quae ex sequentibus capitibus prodeunt,^{num.} curanda est.

10. Contingente *metastasi purulenta* ad par-^{C. meta-}tem *externam*, haec cataplasmate emolliente fo-^{staseos.}venda, ac pseudo-abscessus secundum chirurgiae regulas curandus. Febris hîc, forte ex irritatione locali orta, probe a praegressa primaria distinguenda. Illam enim unis auxiliis antiphlogisticis non tolles. Idem de *metastasi interna* dici debet. Doctrina ipsius ad tractatus de abscessibus variorum viscerum pertinet.

11. In *convalescentia* febrium inflammatoria-^{C. conva-}rum de virium restauratione ope victus nutrientis,^{lescentiae.} vini et cinchonae non est cogitandum. Etenim alias morbus in perniciem aegrorum rursus accenderetur. Loquimur vero hîc de convalescentibus nostra methodo curatis, non de illis, qui a cruoris evacuationibus exhausti fuere. His sane tonica.

CAPUT

CAPUT II.

De febre rheumatica.

§. VII.

Definitio. Historia.

- Definitio. 1. *Febris continua*, vicissitudinum atmosphaerae progenies, insignita horrore crebrius intercurrente calore, exacerbationibus et remissionibus sat distinctis, doloribus sedem vicissim in fibris muscularibus, membranis serosis, tendinibus, ligamentis et periostio, sine reliquis phlogoseos indiciis, figentibus, *rheumatica* dicitur¹⁾.
- Historia. 2. Hujus morbi clara vestigia inveniuntur apud HIPPOCRATEM²⁾, GALENUM³⁾ et ARETAEUM⁴⁾.

Gra-

1) *Synonym.* Febris lymphatica Fracassinii (comprehendens etiam febrem catarrhalem); febris lymphatica glandularum conglobatarum, ETTMÜLLERI (item); Synocha subphlogistica systemati fibroso eminentius propria HARLESSII; GERM. *Flussieber.* GALL. *Fièvre rhumatique.* ITAL. *Febbre reumatica.*

2) Opp. Lib. de locis. Et Epidem. Lib. I. cap. 3. aeger 6. 10. 13. 14. Lib. III. cap. I. aeger 3. Cfr. BARKER *essai sur la conformité de la médecine.* p. 272. — REIMART de tum; ligam. §. 88.

3) Opp. cap. VII. de differentiis febrium.

4) Lib. II. cap. 12.

Graphice illum BALLONIUS⁵⁾, LANCISIUS⁶⁾ et SARCONE⁷⁾ descripserunt. Accedunt observationes C. PISONII⁸⁾, L. RIVERII⁹⁾, TH. SYDENHAMI¹⁰⁾, FRACASSINII¹¹⁾, ETTMÜLLERII¹²⁾, WEDEMI¹³⁾, FR. HOFFMANNI¹⁴⁾, GORTERI¹⁵⁾ et LEIDENFROSTII¹⁶⁾. De eodem quoque argumento dissertationes auctoribus JUNCKERO¹⁷⁾, BOEHNERO¹⁸⁾,

HART-

- 5) Opp. omnia. Tom. IV. Liber de rheumatismo.
- 6) Opp. varia. De nativis et adventitiis coeli Romani qualitativibus. (Epidemia rheumatica, quae cum acutia febribus Romae pervagata est, hieme praesertim a. 1709.).
- 7) *Krankheiten von Neapel. (A. d. Ital. von) SCHMID VON BELLICON. Zürich 1770.) Von dem rheumatischen Fieber, welches im Februar 1764. ist beobachtet worden.*
- 8) Opp. de serosa colluvie. Sect. V. cap. III.
- 9) Praxis medica. Lib. XVI. cap. 3.
- 10) Obs. med. Sect. VI. c. 5. (Aliorum observationes aut ignorans, aut spernens, morbum pro novo descripsit).
- 11) De febribus. Sect. 3. De febre continua lepta.
- 12) Opp. omnia. L. II. Collegia practica.
- 13) Exercitationes med. philolog. Decad. I. Diss. de catarrho et rheumatismo.
- 14) Med. rat. syst. de febribus. Sect. I. cap. 6.
- 15) Syst. prax. med. Lib. III.
- 16) Opuscula. Vol. IV. No. 6.
- 17) Diss. de congestionibus, vulgo catarrhis et rheumatismis. Hal. 1748.
- 18) Diss. de rheumatismo et febre rheumatica. Halae 1774.

HARTMANNO¹⁹⁾ et FABRICIO²⁰⁾ exstant. Mirum igitur est, praxeos medicae compendia de febribus rheumaticis, quarum nomen in ore est omnium, vix aut ne vix quidem mentionem injicere²¹⁾. Propter hoc medici, qui e schola ad artis exercitium perveniunt, magna difficultate premuntur. Nec satis! Gravia quoque pericula inde in aegrotos redundant. Palam enim fiet, febrem rheumaticam sistere morbum sui generis, a reliquis febribus continuis (inflammatoriis et catarrhalibus non exceptis), a rheumatismo acuto, et ab affectionibus rheumaticis apyreticis plane diversum, propriisque periculis stipatum atque peculiarem medendi methodum exposcentem. Februm rheumaticarum tractatum propterea quoque magni facimus, quod ille doctrinae *inflammationum rheumaticarum* pro fundamento inservit.

§. VIII.

Symptomata. Necroscopiae.

Symptomata.

1. Febris evolutionem lassitudo spontanea, gravi-

19) Diss. de nonnullis ad februm rheumaticarum solutionem pertinentium.

20) Diss. de rheumatismo — veterum medicorum fragmenta. Erlang. 1802.

21) „Man muss über die zweifelhafte Sprache erstaunen, welche sowohl die ersten Väter der Heilkunde, als ihre Nachfolger über diese Krankheit, die wir rheumatisch nennen, sowohl in Hinsicht auf ihre Natur, als in Hinsicht der Heilmittel geführt haben.“ (SANCORE l. c. §. 87.).

gravitas artuum praecedere solent. Morbus ipse horrore, crebrius intercurrente calore, orditur. Aeger itaque, ut stragula mox admoveantur, mox removeantur, enixe rogat. Serius ocius tamen frigoris sensus plane deletur, relicto calore, eo-que sat ardente. Pulsus saepe normalem parum excedit frequentiam¹⁾; est vero ut plurimum contractus et duriusculus. Sitis modica; dolores, veluti ossa frangentes²⁾, nunc hanc, nunc illam partem invadunt, et ab alio loco in alium drepente migrant, priori subito immuni reddito, ac dolore omnino vacuo. Adgrediuntur sic caput, collum, pectus, dorsum, lumbos et artus. Ubique a partis affectae motu augentur. Caeterum tumorem et ruborem vix socios habent. — Cuncta morbi symptomata horis pomeridianis aut vespertinis exacerbantur, leniunturque circa mediam noctem aut diluculum. Exacerbatio haud raro inquietudinem, anxietatem, vigiliasque socias agnoscit. Urina incipiente morbo plerumque copiosa et aquea, serius pauca flammea atque sedimento roseo, puriformi, instructa. Nisi morbus sub ephemeræ adspectu obveniat, praecise ad septimum diem perdurare solet, quo, praevia

for-

1) „Manus quidem medici percipit calorem acrem et mordacem; sed in pulsu nil aut parum quid febrile percipitur.“ — „Si pulsum consulis, febris aut nulla aut exigua esse videtur; et tamen febris est revera, sed non valde magna.“ (BALLONIUS l. c.).

2) Osscarea lassitudo GALENI.

fortissima exacerbatione, sudore universali terminatur. Tandem et urina, rursus copiosa reddita, sedimentum grave deponit. Quae singula nisi tempore indicato contingant; morbus ad diem decimum quartum, vigesimum primum et ultra protrahi potest.

Necroscopiac.

2. „Praecordia rubentia usque ad diaphragma et nigricanti sanguine coacto, inque magnis cordis vasis polyposo, inspecta sunt“³⁾. — Haec vero, plurimaeque aliae, non de febre rheumatica simplici, hactenus descripta, sed de alia gravi, adhuc describenda, et imprimis de illius transitu in varios morbos, debitis locis anatomicè per-lustrandos, intelligenda sunt.

§. IX.

C a u s s a e.

C. proxima.

1. *Causa proxima* februm rheumaticarum (et rheumatismi) quaerebatur in carniū refrigeratione¹⁾; — in flatu tunicis et musculis infenso²⁾; — in humore seroso tenui fervidoque³⁾; — in

3) LANCISIUS l. c.

1) HIPPOCRATES de locis in homine. („Fluxiones autem contingunt ex perfrigerata valde carne et super-tumefacta“).

2) AVICENNA Fen. I. Lib. 3. tract. 2. cap. 7. („Et flatus est quandoque in tunicis membrorum et villis, sicuti in colica flatuosa; aut ex tunicis membrorum, et sub membranis et super ossa; aut in circuitu musculorum; inter carnem et cutem; aut in ipso membro latitans, ut in musculis in pectore“).

in lymphâ acidâ⁴⁾; — in stasi humoris acris⁵⁾; — et in cohibita perspiratione cutanea. Quam ultimam opinionem (cæterum ab explicatione *modi*, quo perspiratio cohibeatur, abstinentes)⁶⁾ etiam nos amplectimur. Confirmatur nimirum ea a comparatione caussarum, quæ ad febres rheumaticas prædisponunt easque excitant, cum experimentis a SANCTORIO⁷⁾ aliisque⁸⁾ respectu negotii perspirationis cutaneæ institutis.

2. Ad

3) RIVERIUS l. c. („Causa igitur proxima et immediata hujus effectus est humor *serosus*, qui propter *tenuitatem* partes in tumorem non elevat, et propter substantiam minime suppurationi idoneam nullum unquam abscessum producit, sed tantum dispositionem quandam inflammatoriam *ex seri fervore* oriundam“).

4) ETTMÜLLER l. c.

5) LEIDENFROST l. c. §. 26. („Rheumatismus est dolor musculorum, oriens *ex stasi humoris serosi* plus vel minus *acris* in suis vasis serosis propriis, vel aliquando etiam extra ea in vaginas villorum muscularium effusi“).

6) De hoc modo per sequentem hypothesin FRACASSINI (l. c.) rationem reddit: „A calore, ait, fluida nostri corporis ad circumferentiam pelluntur, cutisque poruli aperiuntur; postea vero, si in aërem frigidum transeamus, . . . transpirationis oscula obturantur. Hinc transpirabilis materia alio tendit, et ubi minor solidorum elasticitas invenitur, ibi stagnat.“

7) Ars de statica medicina, aphorismorum sectionibus VII comprehensa. Una cum MARTINI LISTER in hos aphorismos commentariis. Lugd. Batav. 1728.

8) Doleo, experimenta ope sellæ pensilis SANCTORII ad

C. prae-
disponen-
tes.

2. Ad febres rheumaticas praedisponunt: aetate florens⁹⁾, sexus masculinus¹⁰⁾, interdum corpori constitutio robusta¹¹⁾, longe saepius debilitas¹²⁾; (praesertim post phlebotomias aliasque haemorrhagias¹³⁾), morbi alii¹⁴⁾, victus depravatus¹⁵⁾.

jeju

exemplum a PETRO MOSCATI quondam instituta, publici juris facta non fuisse. Sed gaudeo, C. REILIUS istam viam iterum prosequutum esse. (*Ueber die Ausdünstung und die Wärmeentwicklung zur Tages- und Nachtzeit. Im deutsch. Archiv für die Physiologie von J. F. MECKEL. 7. B. 3. Hft.*). Praecessit J. FRIEDLÄNDER *Versuche in der Arzneykunde. 2. Th. Ueber die Perspiration nebst den Aphor. des Sanctorius, an Keills und einem Modell zu einem Compend. stat. med. Leipz. 1809. 2. Aufl. Cfr. Cap. VI. §. XXXIII. Nr. 1. (10).*

- 9) Infantes aut raro febribus rheumaticis obnoxios esse ubicunque locorum observavi.
- 10) In epidemia a LANCISIO descripta, feminae minus leviusque adfligebantur: „constabat autem hoc fieri eo, quod non similiter velut viri prodierunt.“
- 11) „Corpus plethoricum, validum ac juvenile, praesertim si intempestive exerceatur, isto rheumatismo facile corripitur.“ (BALLONIUS l. c.).
- 12) „Frigus externum prohibet perspirationem in debili . . .“ SANCTORIUS l. c. Sect. I. aphor. 68.).
- 13) „Qui post venaesectiones aut haemorrhagias criticae ac in aërem liberiores frigidiores conferunt.“ (F. HOFFMANNUS l. c.).
- 14) „Duo genera corporum maxime occupari ab ea affectione, experientia comprobavit: unum sanorum . . . alterum eorum, qui jam reapse aegrotant.“ (BALLONIUS l. c.). Sic aegroti, ruri habitantes, qui propter

jejunium¹⁶), crapula¹⁷), ebrietas¹⁸), vita desidiosa¹⁹), tristitia²⁰), ira²¹), vigiliae²²), somnus
pertur-

chronicum, quo laborabant, morbum, consilii expetendi gratia Vilnam vigentibus pluviis aut gelu vehebantur, aut sub ipso jam itinere, aut paulo post, saepe in febres rheumaticas inciderunt. Complicatio inde orta diagnosim hand raro perdifficilem reddebat. Praeterea aegroti pusillanimes, recentem aegritudinem, pharmacis, quae vix sumere inceperunt, adscribentes, timore percutiebantur.

15) „Illud genus edulii optime perspirat et commode nutrit, cujus pondus in ventre non sentitur.“ (SANCTORIUS l. c. Sect. III. aphor. 28.).

16) „Dum omittitur coena, vacuo existente ventriculo, nulloque urgente paroxysmo, *retinetur perspirabile*, et *retentum fit acre*, inde corpus ad calidas aegritudines praeparatur.“ (Idem ibid. aph. 15.). — „Qui vacuo ventriculo it cubitum, ea nocte tertiam partem minus more solito circiter perspirat. (Idem l. c. Sect. IV. aph. 20.).

17) FR. HOFEMANN l. c. 18) Idem, ibidem.

19) „Nimia animi quies magis prohibet perspirationem, quam corporis.“ (SANCTORIUS l. c. Sect. V. aph. 15.).

20) „Moestitia et timor impediunt perspirationem.“ (Idem l. c. Sect. VII. aphor. 8.).

21) Qui sub irae insultu caussis, febrem rheumaticam excitantibus sese exponit, licet is caeterum ad humo morbum non sit praedispositus, illius fieri solet praeda. Idem, corpore aestu venereo calefacto, accidit.

22) „Somno solito brevior semper aliquid perspirationis prohibetur, quod nisi sequentibus diebus plenior perspiratione compensetur, imminet febris periculum.“

perturbatus²³⁾, peculiaris materiei perspirabilis conditio²⁴⁾, et defectus consuetudinis, corpus actioni frigoris et caloris vicissim exponendi²⁵⁾.

C. excitantes.

3. Febribus rheumaticis *occasionem praebent*: vicissitudines atmosphaerae, potissimum transitus repentinus blandae aestatis in rigidam hiemem²⁶⁾; zephyrus vicissim cum borea alternans; pluviae uberiores et diuturnae²⁷⁾, aura frigida, vel etiam frigidiuscula²⁸⁾, corporis partem, eamque

(SANCTORIUS Sect. IV. aphor. 30.). — „Quae impediunt somnum, impediunt quoque perspirationem cocti perspirabilis.“ (Idem aphor. 8.).

23) „Qui dormiunt, et non somniant, bene perspirant, et versa vice.“ (Idem aph. 27.).

24) Saepe miratus sum, nonnullos homines, etiamsi sanos, a minima perspirationis perturbatione in febres rheumaticas incidisse, quin alii sub eadem rerum positione ex eadem causa detrimentum ullam ceperint. Nonne hic materies perspirationis eandem qualitatem nocivam *continuo* habet, quam illa dumtaxat sub irae insultu pro tempore acquirit?

25) Sic Russi corpus prius balneo vaporis exponere, ac dein nive perfricare solent, idque *saepe* sine damno, imo aucto inde valetudinis prosperae sensu.

26) Exemplo sit epidemia a LANCISIO descripta (l. c.).

27) „Causae externae, quae prohibere solent perspirationem, sunt *aër frigidus, coenosus et humidus*; natatio in aqua frigida; cibi crassi et visceri; intermissio exercitii corporis vel animi, et in robustis nimia abstinencia a coitu.“ (SANCTORIUS l. c. Sect. I. aph. 67.).

28) „Aura jucunda et frigidiuscula corporibus excalefactis *magis* nocet, quam aëris vel aquae frigoris in ex-

que sub somno denudatam²⁹⁾, allidens; frigus praesertim humidum pedibus, vel nuchae³⁰⁾ admotum; vestium levitas aut defectus; labores duri sub coelo frigido absoluti; domicilium humidum, igne aliisque praesidiis orbatum; lecti positio prope parietem facie altera intemperiiis externis expositam.

§. X.

D i a g n o s i s.

1. Febrem rheumaticam *morbum sui generis* Est mor-
sistere, clarius probare nequimus, quam illius ^{bus sui} generis.
a reliquis aegritudinibus *differentias* statuendo,
quod partim hic, partim aliis in locis¹⁾ fiet.

2. Conspicuae remissiones, quibus febres Differt a
rheumaticae insigniri solent, illarum cum febr. in-
termitt.
bus

cessu." (SANCTORIUS l. c. Sect. II. aphor. 12.). —
„Auster instar fraudulentis aquilonis est reputandus,
eoque nocentior, quod, cum frigoris sensu minus in-
commodet, ab eo nobis ipsis quam minime metuemus
atque caveamus." (LANCISIUS l. c.).

29) „Corporis partes tectae salubriter perspirant; si verò
a somno detectae inveniantur, etiam ab aëre calidissi-
mo eorum pori condensantur." (SANCTORIUS l. c.
aph. 59.). „In dormientibus, stragulis detectis, ma-
gis impeditur perspiratio, quam in vigilantibus, ve-
stibus denudatis." (Idem l. c. Sect. IV. aph. 52.).

30) „Constipata perspiratione in *cervice*, stupescit sen-
sus pericranii." (SANCTORIUS l. c. Sect. I. aph. 19.).

1) Part. I. Volum. III. Sect. II. cap. de rheumatismo
acuto.

Frank Prax. I. 1. 2.

C

bus intermittentibus, jam dudum animadversam²⁾, similitudinem constituunt. Maxima ea est in febribus intermittentibus complicatione rheumatica stipatis. En differentias:

<i>Febris intermittens.</i>	<i>Febris rheumatica.</i>
a. Frigus solum scenam aperit.	a. Orditur frigore intercurrente calore.
b. Membrorum dolores praecipue sub stadio frigoris obveniunt.	b. Dolores per totum morbi decursum exstant, ac cum calore febrili exacerbari solent.
c. Insultus ut plurimum matutinus.	c. Exacerbationes vespertinae.
d. Morbus vernalis, aestivus, autumnalis.	d. Morbus plerumque hiemalis.

Differt a
febre cont.
inflammato-
ria.

3. Quum *febres rheumaticae* et *febres inflammatoriae* ambo ad febres *continuas* pertineant, illarum statuere discrimina mugis arduum est. Haec porro nequiquam pro complicationis reciprocae casu valere possunt.

Febris

- 2) SAUVAGES nosol. method. Class. VII. Ord. I. Gen. 2. spec. 9. — Rheumatismus febriculosus MORTONII. cap. 9. hist. 22. — Febris intermittens rheumatismum simulans, seu febris rheumatica. Ejusdem hist. 12. 10 — 14. — Cfr. STOLL rat. medend. T. III. p. 93. A, p.

Febris inflammatoria simplex.

- a. Parum remittit.
- b. Orditur intenso frigore.
- c. Pulsus febrem evidentissime indicat.
- d. Sitis magna.
- e. Calor attactui amoenus.
- f. Rarius atmosphaerae vicissitudinibus excitatur³⁾.

Febris rheumatica simplex.

- a. Multum remittit.
- b. Incipit frigore, cui calor crebro intercurrit.
- c. Febris praesentia minus ex pulsu, quam ex reliquis symptomatibus evuitur.
- d. Sitis modica.
- e. Calor sat ardens.
- f. Constans atmosphaerae vicissitudinum progenies.

4. Praeterea *violentiae externae* (imprimis a Monitu⁴⁾ verberibus, a concussionem corporis, e. g. vehendo in rheda incommoda super vias saxosas, pila ludendo, equitando insolenter) dolores membrorum, a *rheumaticis* sane distinguendos⁴⁾, excitant.

5. Febris rheumaticae dolores quoque acmulantur *cruciatibus membrorum consensuales*, quales

C.2 in

3) Jam GALENUS febrem illorum, „qui ex fervore solis aegrotant,“ — a febre illorum, „qui ex cute densata atque adstricta laborant,“ distinxerat.

4) Ipse BALLONIUS (l. c.) hoc monitum non est dedignatus.

in febribus verminosis, aliisque gastricis, praecipue flatulentis, obveniunt. Item ad scapulam dextram in affectionibus hepatis, atque ad sinistram in illis cordis.

Variae
febr. rheu-
mat. spe-
cies.

6. *Febrem rheumaticam*, ita, uti descripsi-
mus⁵⁾ constitutam, *simplicem* vocabimus. Rerum
positiones magis intricatae *complicationum* no-
mine salutabuntur. Hic de *complicatione inflam-*
matoria, — de reliquis serius⁶⁾.

Complica-
tio in-
flammat.

7. In *febre rheumatica inflammatoria*, remis-
siones sunt minus evidentes, pulsus est frequen-
tior, durior, calor magis urens, sitisque inten-
sior, quam in simplici. Sunt, qui delirium⁷⁾,
sudores profusos⁸⁾, et miliaria⁹⁾ experiantur.
Sanguis e vena ductus in insulam, multo sero
circumdatam, et corio obtectam, coit. Praeterea
partes dolentes, quae in febre rheumatica sim-
plici dumtaxat *quid inflammatorii (epiphlogisma)*
habent¹⁰⁾,

5) §. VIII. No. 1.

6) Cap. IV. §. XXIII. No. 15. cap. V. §. XXVIII.

7) „Quodsi non raro in hac epidemia contingat *deli-*
rium, illud oritur vel ab impetu bilis, vel ex
inflammatione propagata ad diaphragma ac nervos prae-
cordiorum usque ad cerebrum, quae omnia non ma-
lignam, sed acutam epidemiae indolem ostendunt.“
(LANCISIUS l. c. §. 15.).

8) SINNEN *Darstellung eines rheumatischen Schweissfie-*
bers. Würzburg 1803.

9) *Rheumatismus miliaris SAUVAGESII l. c. spec. 12. —*
Vid. BONTÉ Journ. de médecine 1757. Janvier.

habent¹⁰⁾, in inflammatoria proprius ad *phlogosin* accedunt. Hac phlogosi omnibus numeris absolutâ, morbus nomen febris rheumaticae gerere cessat, et a parte inflammata denominatur¹¹⁾. Indoles inflammationis (quae superficialis, valde dolens, fugax, et maxime ad secretionem seri prona est) tantummodo per epitheton *rheumaticae* designatur. Nihilominus febris, morbi fundamentum manet, atque inflammatio dumtaxat illius sistit symptoma¹²⁾. Valet id de ipso *rheumatismo acuto*¹³⁾ ut ejus decursus¹⁴⁾ et therapia docent.

8. Sco-

10) Sunt verba BALLONII l. c.

11) Pulcherrime SARCONE (l. c.) transitum febrium rheumaticarum in anginam, pleuritidem etc. designavit.

12) „Unde liquido constat, in praesenti epidemia febrem esse morbum praecipuum, cujus symptomata sunt ejusmodi inflammationes.“ (LANCISIUS l. c. Sect. I. §. 6.) „Aegri enim eo se modo habent in toto corpore, quo arthritici in suo paroxysmo in uno, aut paullo plurimis partibus.“ (BALLONIVS l. c.).

13) Part. I. Vol. III. Sect. II. cap. de rheumatismo acuto. (Hic morbus revera est febris rheumatica inflammatoria, saepe in corpore arthritico nidulans, cum phlogosi musculorum (myositis), tendinum, ligamentorum etc. Eadem inter rheumatismum acutum et febrem rheumaticam simplicem intercedit ratio, ac inter febrem inflammatoriam simplicem et arteritidem.

14) „Etenim in aegris non solum rubentes urinae, atque interdum turbidae sunt, sed paroxyami (exacerbationes) quoque statis recurrunt periodis, et iis prae-

Monitum: 8. Scopo februm rheumaticarum complicationes propius eruendi, refert, ut non solum ad constitutionem morborum regnantium atque aegrorum, sed etiam ad causas, quae aegritudini ansam praeberunt, respiciatur¹⁵⁾.

§. XI.

P r o g n o s i s.

Genera- 1. Febris rheumatica *per se* nullum agnoscit
tim. periculum. Secus autem 1° si *complicata fuerit*;
2° si *in hominem alioquin valetudinarium inci-*
dat; 3° si *aeger debitum regimen servare ne-*
queat; sique 4° *perverse curetur*.

Pr. febris 2. Si febris rheumaticae complicatio fuerit
rheumat. *inflammatoria*, nisi epistaxis succurrat¹⁾, *phlo-*
complica- *goscos* imminet periculum. Quacunque in parte,
tae. haec sedem figat, gravia inde exspectanda sunt
mala, eoque majora si pars phlogosi affecta de-
bito robore destituta sit²⁾. In genere musculi,

mem-

sertim desinunt crisis, quae *in acutis febribus, quas*
scholae appellant essentielles, solent accidere. (LAN-
CISIUS l. c.).

15) „Morbi ex prohibita vel minuta perspiratione pro-
venientes, *differunt pro natura causarum impedi-*
tum.“ (GORTER l. c. Titul. III. No. 127.).

1) „Quibus speratur in articulos abscessus, . . . si ex
naribus sanguis fluxerit, brevi fit solutio.“ (HIPPO-
CRATES aphor. 74. Lib. IV.) — „Haemorrhagia con-
fert.“ (BALLONIUS l. c.).

2) „Qui morbi ab imbecillibus partibus ad fortiores re-
meaverint, ii soluti sunt faciliores; influxus enim

membranae serosae, tendines et periostia, sese ab effectibus inflammationis (a sero, a lympa, secreta), longe difficiliter liberant, quam membranae mucosae, loca patula, ut nares, bronchia, intestina investientes³⁾. Ecce fontem rigiditatum, abscessuum, tumorum, cariei. Quodsi praeterea fibrae musculares cordis, intestinorum, aliorumque viscerum phlogosi rheumatica tententur; gravissimi morbi praesto sunt. — Idem accidit dum membranae, cerebri, et medullae spinalis involucra sistentes, inflammatione rheumatica corripuntur. Transit nempe malum facile in partes subjectas aut saltem serum aut lympa coagulabilis phlogoseos culpa inter involucra et pulpam nerveam deposita, huic vim inferunt. Systematis nervorum partibus essentialibus sic pessumdati, vires vitales dejiciuntur, atque subsultus tendinum, convulsiones, deliria, paralyses in conspectum veniunt.

3. Si febris rheumatica in hominem alioquin *Progn. ex*
valetudinarium incidat, partium, jam pridem la- *conditio-*
befectarum, affectio nova vix evitanda est⁴⁾. Sic *ne aegroti.*
 in

facile a robore excludentur." (HIPPOCRATES PART. 5.
 Lib. II. de natura humana).

3) „In febre catarrhali *excretio* subsequitur — in rheumatica, ubi externae musculorum tunicae patiuntur, morbus *evacuatione* non *solvitur*." (FR. HOFFMANN l. c. §. 12.).

4) „Partes imbecilliores a morbis excrementitiis primae

in *scrophulosis* rheuma tumores glandularum, probe a meris *scrophulosis* distinguendos, provocat. Sic *haemorrhoidarii*, febre rheumatica correpti, incommodis ex imo ventre prodeuntibus, solito magis excruciantur. — Maxime vero febris istiusmodi in *arthriticos* saevit. Ut plurimum tunc rheumatismo arthritico-aucto ansa praebetur. Non raro autem febris rheumatica hominibus, arthritide vexatis, pro depuratoria inservit. Saltem sub illius decursu et fine incredibile dictu est, quot humores foetidi, quotque alii morborum effectus interdum sudoris et urinarum ope aegro, dein veluti regenerato, evacuentur. Tandem ut febris rheumatica gravis evadat, non semper requiritur, ut homo sit absolute valetudinarius. Jam *menstruatio*, *graviditas* et praecipue *puerperium* ad hoc sufficiunt. Etenim tunc febris rheumatica, caeterum simplex et benigna, uterum, ovaria et peritonaeum, in consensum trahens, amplam interitui aperit viam.

Pr. sub
defectu re-
giminis et
curae,

4. Mala hucusque recensita eo facilius locum obtinent, si *debitum regimen dieteticum*, vel ob aegrorum paupertatem, vel ob casus fortuitos, interdum nulla prudentia evitandos, *servari nequeat*. Nuntii ingrati causâ febres rheumaticas, antehac levissimas, mox gravissimas evasisse, observavimus. Idem de aura frigida, tempore sudoris

corripuntur. Sic fiunt a fluxione nati effectus." (Galenus ad aphor. 57. Lib. V.).

doris critici admissa (communissima metastasium caussa) deque erroribus in diaeta et cura valet. Quae quum ita sint in omni febre rheumatica prognosis esto cauta!

§. XII.

C u r a.

1. *Prophylaxis* febrium rheumaticarum ma-^{Prophyla-}
 gno morborum numero quadrat^{xia.}). Consistit praesertim in eo, ut sexus sequior in usum ducat calceos, non cartaceis, sed densis soleis instructos; — tibialia, non reticulata, sed compacta; — tunicasque, non vitreas, sed ad fovendum corpus idoneas. Caput, nucham, mammas, brachia et crura, haecque braccarum ope tucantur oportet. Praeterea quoties locus calidus cum frigidiore commutatur, vestitui aliquid addendum. Pallia²⁾ et vestes pelliceae³⁾ tunc praesto esse debe-

1) Maximam morborum partem ex temporum vicissitudinibus ortum ducere, HIPPOCRATES docuit (Lib. III. aphor. I.). — „Natura, dum in perspirandi officio est impedita, incipit statim in multis deficere.“ (SANCTORIUS l. c. Sect. I. aph. 40.). Cfr. RITTER von den Vorkehrungen und Mitteln, Erkältungskrankheiten zu verhüten (In RUST's Magazin für die gesammte Heilkunde. 12. B. 2. Heft. p. 264.) qui immerito a MIGNIUS criminatur. (In allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1824. 11. Heft. p. 1442.).

2) Exemplo Hispanorum, Venatorum.

3) Exemplo Turcarum et Judaeorum Polonicorum. — Quum anno 1809. parens meus Vindobonae a Napo-

deberent. De fornacibus diversimode sentiunt diversae gentes. Ferreae sane generatim reprobandae sunt. Secus autem fornaces argillaceae, dummodo modice calefactae. Nova methodus, aërem jam calefactum in cubicula introducendi, maxime arrideret, nisi talis aër praeter modum humidus esset. Qui caminum sufficere putant, curent saltem, fenestras una cum januis apprime claudi posse. Refrigerationis periculum quum maxime sub somno incurratur; lecti debita positio et conditio rem summi momenti sistit. — Interea annua constitutione febribus rheumaticis favente, arduum est sese illius imperio, quod a hieme usque ad aequinoctium vernale extendi solet⁴⁾, subtrahere.

2. Fe-

leone Bonaparte circa saluberrimam nationalem vestiendi rationem interrogaretur; *Turcarum* sane, respondit. Imperator addidit: „Potuisset ea sub finem prioris saeculi facile in Galliam introduci, — nunc sero nimis.“

- 4) „Haec autem durabant et non remittebant usque ad aequinoctium.“ (HIPPOCRATES I. Epid. const. 2. in Thaso. No. 1.). — „Solis enim accessu ad verticem nostrum, calidaeque lucis radiis ad nos recta magis evibratis, quemadmodum nives glaciesque solutae defluunt, atque herbis campi et floribus herbae vestiuntur; ita humana corpora blando ac subtilissimo igne replentur, quo sanguis novo motu cietur, ac solvitur, atque aptior ad transpirationem efficitur, quam ego praecipuum urgentis epidemiae remedium arbitror.“ (LANCISIUS l. c. §. 18.).

2. Febris rheumatica *simplex*, nisi jam pri- C. febris
mo aut altero nychthemero solvatur, certissime, ^{rheumat.}
ut monuimus, ad septimum usque diem decurrit, ^{simplicis.}
Utroque in casu morbi decursus, utpote placidus
et insons, nulla medela est perturbandus. Quor-
um enim pharmaca? — Illorum ope morbus
neque temporis puncto brevior redditur. E con-
trario: *antiphlogistica*, motus febriles, ad susti-
nendam morbi vim in partibus externis atque ad
praeparandam absolvendamque crisin necessarios,
impediendo, morbum certe longiorem, forte etiam
periculosum, reddunt. Sic SYDENHAMUS primum
sanguinis missionem eamque repetitam suasit;
posterioribus autem curis invenit, debilitatem
inde inductam plus quam rheumatismum nocere,
ideoque sententiam mutavit, simplicemque absti-
nentiam, victumque ex sero lactis, ad morbum
tollendum sufficientes, commendavit⁵⁾. *Hirudi-*
nes et *cucurbitulae scarificantes* partibus dolenti-
bus admotae aut irritationem adaugent, aut effi-
ciunt, ut morbi vis, in superficie externa defla-
grata, in visceribus pabulum inveniat. *Nitrum*
et *eccoprotica* excretionem urinae et alvi pro-
movendo, perspirationem impediunt⁶⁾. — Forte
emol-

5) l. c.

6) „In fluxu et vomitu prohibetur perspiratio, quia di-
vertitur.“ (SABOTRIUS l. c. Sect. I. sph. 53.). —
„Febricitantes in pejus aequo incidunt, si, a medico
imperito medicamentis importune exhibitis, illorum
perspiratio divertatur.“ (Idem, ibid.).

emollientia? . . . *Interne*, nisi complicatio cum adfectione catarrhali fortuito adsit, nil emollieridum est; decocta mucilaginosa et emulsiones nonnisi saporem depravant, linguam obducunt, ac ventriculi vires pessumdant. *Extrinsecus* locis adfectis *cataplasmata* admove, aegrum sine fructu molestat⁷⁾. Neque ad *balneum*, quippe generatim statui febrili adversum, cogitandum. *Linimenta* et *emplastra* irritantia ad locum aliquin irritatum adhibere velle, insanum foret. — *Certissime diaphoretica?* Haec, ab initio et sub decursu morbi porrecta, febrem semper adaugent, saepeque complicationem inflammatoriam provocant⁸⁾. Etiam si illorum ope sudor excitetur; hic, utpote vi expressus, potius nocet. Natura vero ipsa tempore criseos sudorem beneficum largiente; cui bono diaphoreticum? Damnum potius inde expectandum, quum hujus generis pharmaca stimulo specifico, quo in cutem agunt, sudorem spontaneum impedire possint. Interea si in aegrotis paullulum debilioribus sudor criticus segniter procederet, neque ad illum ut decet eliciendum aliquod infusum theatum sufficeret; diapnoicis fortioribus⁹⁾ calcaria utique addi possent.

7) „Externa balnea, fomenta et reliqua humida, neque juvant, neque prosunt, saepe ad interiora repellunt.“ (LEIDENFROST l. c. §. 29.).

8) RIVERIUS (l. c.) ait: „Sudorifera in principio et augmento non esse proficua, imo plurimum nocere.“

9) R. Spiritus Mindereri, Roob sambuci àà unciam

sent. Quodsi aeger aut illius familia praescriptionem formulae medicinalis sub morbi decursu optaret, illorum impatientiae facile aquis destillatis et syrups ianocuis occurritur¹⁰⁾.

3. Quo minus autem in cura febrium rheumaticarum *simplicium* pharmacis favemus; eo <sup>Continua-
tio argu-
menti.</sup> magis *regimini*. Praeter victum jam a SYDEN-
HAMO indicatum, parcum videlicet, vegetabilem, lacteum, esto *potus* copiosus, aqueus, subacidulus, et non frigidus¹¹⁾. *Temperatura* cubiculi inter gradum decimum quartum et decimum sextum thermometri Reaumurii requiritur. Aeger decumbat quietus¹²⁾ modiceque tectus. Promittatur

unam. Capiat binis vicibus ad vespere c. s. q. infusi subcalidi florum sambuci. Si forte alvus fluida diaphoresi obstatet; *pulveri Doweri* a granis tribus ad sex, hora somni porrigendo, locus foret.

10) E. c. aquae et syrups florum rosarum rubrarum, rubi idaei etc.

11) Quoniam aegri habent sensum caloris, „aliquatenus juvantur usu rerum frigidarum; *sed nocent bifarium*; partim quia difflatum prohibent; partim, ubi quis usus est paullo frigidioribus remediis, remanent, domito morbo, major infirmitas nervorum, unde *arthritidis* occasio postmodum nasci potest.“ (BALLONIUS l. c.).

12) „Corporis in lecto frequens circumvolutio . . . perspirationem utilem diminuit. *Remedio est in eodem situ obstinate quiescere.*“ (SANCTORIUS l. c. Sect. I. aph. 90.).

tatur ipsi proximus morbi finis¹³⁾. Ne timeat inquietudinem et augmentum symptomatum, ut plurimum crisin praecedentes.

C. febris
rheumat.
inflammato-
ris.

4. In febre rheumatica inflammatoria curanda, morbus, quo citius id fieri potest, ad simplicitatem reducendus. Itaque *methodus antiphlogistica* illico viriliter adhibenda. Quo fortior est febris, quoque majus periculum phlogoseos partialis; eo magis *venaesectio*, suadentibus GALENO¹⁴⁾, BALLONIO¹⁵⁾, LANCISIO¹⁶⁾, HUXHAMIO¹⁷⁾, indicatur. Quodsi prima phlebotomia morbi vim non satis frangeret, et alteri locus foret. Caveamus autem, ne plus quam par est sanguinis mittatur, cujus erroris potissimum RIVERIUS particeps redditus est¹⁸⁾. Status enim inflammatorius nostro in morbo accessorius est, atque aegritudinis essentiam non efficit¹⁹⁾. Quamobrem

13) „Animi consolatio, quaecunque causa fiat, aperit meatus, et *largam perspirationem facit*.“ (Idem, ibid. Sect. VII. aphor. 19.).

14) „Curationis initium a missione sanguinis fit.“ (Cap. 8. Lib. de sanguinis missione).

15) l. c.

16) „Mirifice phlebotomia succurrit.“ (l. c.).

17) De aëre et morbis epidem. a. 1748. Vid. opp.

18) „Nec refert, si per decem aut duodecim dies sanguis detrahatur.“ (l. c.).

19) Id GALENUS probe intellexisse videtur. Licet enim, ut monui, venaesectionem commendaverit, addit tamen: „Curationis scopus est non *evacuatio*, sed *totius habitus roboratio*.“

obrem etiam *frigus* quacunque sub forma ab illius cura excludimus. Scias praeterea, *hirudines* nunquam *phlebotomiae* vices agere posse! Hac revera necessariâ, illae potius detrimentum afferunt. Indicantur vero *hirudines*, ubi fracto omnino ope *phlebotomiae* universali morbi impetu, *phlogosis* partialis perstat. Quodsi hoc a morbi initio sine magna febre, atque in aegro nequaquam *plethorico* obveniret, aut *haemorrhagia* quaedam habitualis, febris rheumaticae characterem inflammatorium conciliasset; cura illico ope *hirudinum* inchoanda. *Cucurbitulas scarificantes* *hirudinibus* anteponimus, si pars *phlogosi* tentata illas in viciniis admittat, sique aeger non nimis sensibilis sit. Quousque illae indicantur, eousque *nitro* quoque locus est. A purgantibus scopo antiphlogistico sub morbi vigore abstinemus; quaevis enim tubi intestinalis irritatio *phlogosin* hac in parte provocare posset²⁰⁾. Libertati alvi *clysterum* ope studemus.

5. Quam primum complicatio inflammatoria deleta est, ac morbus ad simplicitatem reductus; Continuatio argu-
menti. methodus expectativa iterum jus sibi vindicat.

6. Accidit quandoque, ut febris rheumatica C. morbi protracti. septimo morbi die non solvatur. Hujus infortunii causa multifaria est. Plerumque aliquid *gastrici*

20) „Purgantia medicamenta . . . ab initio usurpata nil prosunt; imo morbum et dolorem augent.“ (RIVIERUS l. c.).

stricti latet, quod (nisi recentissimae originis) cundum praecepta alibi tradenda²¹⁾, jam duci abigi debuisset. Ast re huc producta, a turbulentis evacuationibus tubi intestinalis, quod vires frangentibus, abstinendum. Tutissimae vae, saepeque repetitae *tartari emetici* doses prescribuntur²²⁾. Alias febris a *rheumate*, in qua quadam nidulante, sustinetur. Tunc, praemindicatis evacuationibus sanguinis localibus affectio inflammatoria organa uropoetica detrit), *emplastrum vesicatorium*, si fieri poterit, super locum affectum egregie operatur. Indum vero praeter rheuma in partibus prius per gosi correptis, quid morborum relictum est. In hoc in casu juxta praecepta, exitibus inflammationum specialium medendi, est ordinanda. *Iomel* quidem et *digitalis* tunc locum invadunt; ast, nisi maxima urgeat necessitas, infusum *stipitum solani dulcamarae*²³⁾, ad si febris adhuc vigeat, *nitro*, anteponimus. aliis decoctum *radicis polygalae Senegae* laetur²⁴⁾. *Dulcamara* quoque conducit, dum si rheumatica protracta in scrophulosis et arthr

21) Cap. IV. §. XXIII. No. 19.

22) R. Tartari emetici granum unum. Solve in destillatae libra una. D. S. Omni hora capiat unam.

23) Drachmae duae stipitum ad colaturam librae cum syrupo violarum, pro nychthemero.

24) SARGONE l. c.

nidulatur. Debet autem per plures dies continuari. In arthriticis praeterea *sinapismi* internae superficiei crurum, surarum, admoti, levamen adferunt. Ad epispastica haec etiam in primo limine febrium rheumaticarum recurrimus, dum hae homines, viscere quodam labefactato praeditos, aggrediuntur. Irritatis nimirum mature epispasticorum ope extremitatibus inferioribus, morbi vis ab interioribus avertitur. Nec dubitare licet, febres rheumaticas interdum ob *virium defectum* in longum trahi. Quod si absque complicatione gastrica accideret, juscula carnea, praesertim cum vitellis ovorum, concedenda sunt. Potatoribus aliquid vini aut cerevisiae permittitur. Inter pharmaca *aura* sic dicta *camphorata* excellit²⁵⁾. Item tenue *decoctum cinchonae*²⁶⁾. Caeterum qualiscunque fuerit caussa, terminum consuetum febrium rheumaticarum impediens, postquam indicationibus urgentibus satisfeceris, ut, quod reliquum est, a natura, nisi secunda, saltem tertia, quartave hebdomade absolvatur, permittas quaeso. De *febrium rheumaticarum in nervosas transitu* alibi quaestio erit²⁷⁾.

7. Con-

25) R. Camphorae \times . granum semis. Subige in mucilaginis gummi arabici drachma una. Adde aquae fontis uncias sex. Syrupi citri unciam unam. M. D. S. Omni secunda hora unciam unam.

26) Drachmae tres corticis ad colaturam unciarum decem.

27) Cap. V. §. XXVIII.

Frank Prax. I. 1. 2.

D

Convalescentia. 7. *Convalescentibus* lectum prius, quam crises omnibus numeris absolutae sint, deserere non permittitur. Aëri libero sensim sensimque adsuescere debent.

CAPUT III.

De febribus catarrhalibus.

§. XIII.

Definitio. Literatura.

Definitio. 1. **F**ebres continuæ, atmosphaeræ vicissitudinibus aut peculiari illius constitutioni originem debentes, horripilatione cum intercurrente calore ingruentes, remissionibus protractis, nec non affectione membranae pituitariae viarum respirationis, tussi, absque reliquis plerisque pneumoniae signis, stipatae, *catarrhales*¹⁾ dicuntur.

Literatura. 2. Hujus morbi *literatura* bifaria est: altera nimirum febres catarrhales *solitas*, altera *insolitas*, seu peculiari modo epidemicas respicit.
Illa

1) *Synonym.* Catarrhus febrilis. GERM. *Flussfieber, Brustfieber.* GALL. *Pièvre catarrhale, fièvre de rhume.* ANGL. *Catch cold.* ITAL. *Febbre catarrale.* POLON. *Kataralna Gorączka.*

Illa ad pauca circumscripta est opuscula²⁾; haec docentibus praesertim CULLEN³⁾, SAILLANT⁴⁾, M. L. WITTEWER⁵⁾ et G. F. MOST⁶⁾, amplissima. Ab ipso enim orditur HIPPOCRATE⁷⁾, et, interpositis notitiis vagis⁸⁾, jam e seculo *decimo*

D 2 . *sexto*

- 2) CMAUSE diss. de febribus catarrhalibus. Jen. 1676. — ADOLPHI diss. de febre catarrhali. Uliraj. 1702. — MEISNER diss. de febre catarrhali. Uliraj. 1702. — STAHL dissert. de febre catarrhali maligna. Hal. 1708. — ERASZ diss. de febre catarrhali. Erf. 1714. — DECHER diss. de febre catarrhali benigna seu quotidiana continua veterum. Erf. 1724. — SCHULZE diss. de febre catarrhali benigna. Hal. 1736. — WEDDEL diss. de febre catarrhali. Jen. 1738. — FR. SAALMANN descriptio febrium malignarum in genere, et speciatim sic dictae catarrhalis malignae. Münst. 1781.
- 3) Synopsis nosologiae methodicae. Edimb. 1772.
- 4) *Tableau historique et raisonné des épidémies catarrhales vulgairement grippe depuis 1510. jusqu'à et y compris celle de 1780.* Paris 1780.
- 5) *Ueber den jüngsten epidemischen Katarrh.* Nürnberg 1782.
- 6) *Influenza Europaea, oder die grösste Krankheitsepидemie der neuen Zeit für Aerzte und Nichtärzte.* Hamburg 1820.
- 7) Epidemicor. Lib. VI. Sect. 7. Edit. LINDENI. T. I. p. 814. Cfr. SPRENGEL's *Pathologie*. 2. Th. p. 116 sq.
- 8) Dio Cass. LXVII. DREUIGNES T. I. part. I. p. 120. (a. XC. aerae christ.). — GODEFRID. annal. 1164 — 1237. edidit MENCKE script. rer. Germ. Vol. II. p. 483. — AUCL. GEMBL (a. MCLXXIII.) — TARSONI TOZZETTI *raccolta d'osservazioni med.* P. I. p. 75. (Epid. MCCCXXIII.). — Cfr. SCHNURER *Chronik*

sexto certa emanat. Hoc enim seculo versus finem vergente, videlicet a. MDLXXX. epidemia universam fere Europam affligens saeviit, cujus historiam PETRUS SALIUS DIVERSUS⁹⁾, J. BOREL¹⁰⁾, J. SPORISCH¹¹⁾, B. BRUNNER¹²⁾, L. STENGEL¹³⁾, J. WIERUS¹⁴⁾, J. N. PECHLINUS¹⁵⁾, J. CRATO A

KRAFT-

der Sauchen. Tübing. 1823. 1. Th. p. 85—250. — VALESCLUS DE TARANTA (a. MCCCLXXXVII Monte Pesulano), — VALLERIOLO append. ad loc. comm. cap. 2. (a. MDX.), — MARCHESI supplem. istor. di Forli. L. VI. (a. MCCCLXXXVII.). — Cfr. MOROAGNI de sed. et caus. morb. epist. XIII. art. 4. — FONTED in disput. de Gerotillo (a. MDXVII. Byzantii).

9) De febre pestilent. in opusc. med.

10) Synopsis novi morbi, quem plerique medicorum catarrhum febrilem, vel febrem catarrhosam vocant, qui non solum Germaniam, sed paene universam Europam gravissime afflixit. Helmst. 1680.

11) Idea medici . . . et de febre epidemica a. 1580. Francof. 1582.

12) Kurzer Bericht von der jetzt regierenden Hauptkrankheit, und wie dieselbe zu kuriren sey, gestellt und nach dem geschriebenen Exemplar corrigirt. Leipz. 1580.

13) Theses de natura, causis, et curatione morbi epidemici. a. 1580. Augustae Vindelicor.

14) Med. observ. hactenus incognitae. L. II. De pestilentiali et epidemica tussi, quae a. 1580. universam fere Europam invasit. V. opp. omnia. Amstelod. 1660. p. 978.

15) Observ. physico-med. Hamb. 1691. Lib. II. obs. 26. p. 244.

KNAFTHHEIM¹⁶⁾ et MERCATUS¹⁷⁾ chartis commiserunt. Praeter alias epidemias minus certas¹⁸⁾, illae secutae sunt a. MDCLVIII. — a WILLISIO¹⁹⁾, et a. MDCLXXV. a SYDENHAMO²⁰⁾, C. RAYGER²¹⁾, W. MOLYNEUX²²⁾, M. ETTMÜLLER²³⁾, exaratae. Memorabilis²⁴⁾ praeterea est epidemia, quae a. MDCCXII.

16) Consilior. et epistolar. med. Lib. II. Edit. L. SCHOLZII. Francof. 1592. p. 235. Hic quoque duae epistolae de eodem morbo, auctore MERCURIALI, inveniuntur.

17) De intern. morbor. curat. et HAERNISCH in ARTARUM p. 315 et 396.

18) FORESTUS observ. et curat. Lib. VI. obs. 1. 3. — RIVERIUS obs. comm. obs. 9. 10. obs. addit. obs. 10. — SENNERTUS de febribus Lib. IV. cap. 17. — SCHIFFLET. V. SCHNEIDER de catarrhis p. 162.

19) De febribus. Cap. XVII. p. 85.

20) Opp. Lugd. Batavor. 1726. Sect. V. p. 244. Observ. circa morb. acut. hist.

21) De catarrhis a. 1675. per autumnum grassantibus (In miscell. acad. natur. curios. Dec. I. a. 6 et 7. p. 312).

22) *Historical account of the late general coughs and colds; with some observations on other epidemick distempers* (in *philosoph. transact. for the year 1694.* p. 105).

23) Opp. med. Edit. J. C. WESTPHAL. Francof. 1697. T. II. p. 1445.

24) Minoris momenti sunt febres catarrhalicae a. 1708. (SCHNÜCK eph. nat. curios. Dec. I. a. 6 et 7. obs. 213.) et a. 1709. (FR. HOFFMANN syst. rat. T. II. p. 45.), ac dubiae num ad epidemicas pertinuerint, illae, de quibus mentio fit apud BLECAU (Zodiac. med. Gall.

MDCCXII. regnavit, memorabilioresque illae, quae ab a. MDCCXXVIII. ad a. MDCCXXXVII. Germaniam, Galliam²⁵⁾, Bataviam, Angliam, ipsamque Americam adflixerunt. Hujusmodi epidemiae descriptae fuere a CAMERARIO²⁶⁾, LANZONIO²⁷⁾, C. F. LÖW²⁸⁾, J. BECCARIO²⁹⁾, MÜHPAUER³⁰⁾, J. G. HAHN³¹⁾, DERN³²⁾, STORCH³³⁾, SCHEFF-

a. I. Genev. 1680. Decemb. obs. 6. p. 184.) et SYDENHAM (l. c. epist. respons. de morb. epid. ab 1675. ad 1680. ad ROB. BRADY. p. 310).

25) Sub nomine: *le grand rhûme*.

26) *Anmerkungen, von ansteckenden Krankheiten bey Gelegenheit der Krankheit à la mode und von der Präservation der grassirenden Seuche. Tübing. 1712.*

27) *Act. acad. nat. curios. Vol. I. p. 41.*

28) *Historia febris catarrhalis, quae a. 1729. mens. Nov. et Dec. per Europam epidemice grassata est; accedit constitutio epidemica a. 1730. (Act. acad. natur. cur. Vol. III. append. p. 77).*

29) *Commentatio de quadam peculiari constitutione epidemica et speciatim de catarrho epidemico a. 1730. (Act. acad. nat. cur. T. III. p. 112).*

30) *De febre epidemica catarrhali. Altdorf. 1730.*

31) *Febrilia continuorum, quae a. 1729. Vratislaviae populariter grassatae sunt, recensio, occasione catarrhi febrilis per Europam epidemici adornata. Vratislaviae 1731.*

32) *Diss. de febre catarrhali petechizante superioribus annis infesta atque epidemica. Giess. 1732.*

33) *Commerc. literar. Norimb. 1733. p. 52. — quinquepartit. pract. T. II. p. 100.*

SCHEFFLER³⁴), CARL³⁵), C. F. X. KOEFFERLE³⁶),
L. AFFORTY³⁷), J. DE GORTER³⁸), A. STOCH³⁹),
J. H. KANNENGIESER⁴⁰), J. H. FÜRSTENAU⁴¹),
J. F. PAULI⁴²), HUXHAM⁴³) etc. 44). Nec silentio
prae-

34) *Commert. liter. Norimb.* 1733. p. 108.

35) *Ibidem.*

36) *De febre catarrhali epidemice grassante.* Basil. 1733.

37) *Quaest. med. „an catarrhis epidemicis theriaca?“*
Paris. 1733.

38) *Morbi epidemici brevis descriptio et curatio per*
diaphoresin. Harderovic. 1732.

39) *Diss. de morbo epidemico hac hieme grassato, nec-*
dum cessante, cum animadversion. in GORTERI de-
scription. Euchus. 1733.

40) *Observat. med. clinicae de febre catarrhali maligna*
1735. Chiloniam Holsationum obsidente.

41) *Historia febris catarrhalis circa finem a. 1734. et ini-*
tium a. 1735. passim epidemicae. (act. acad. nat. cur.
Vol. V. p. 510).

42) *Historia febris catarrhalis malignae vernalibus men-*
sibus a. 1737. Wratislaviae et in complurimis Silesiae
locis epidemicae grassantis. (act. acad. nat. cur. Vol. V.
p. 248).

43) *Observ. de aëre et morb. epidem. ab a. 1728. ad*
finem 1737. Plymouth. fact. in opp. edit. REICHEL.
Lips. 1764. p. 102. (Notandum est, vocabulum *in-*
fluenza pro prima vice apud HUXHAMUM (p. 268.) ob-
venire).

44) *Edinburgh medical essays. Vol. X. p. 18. — Bres-*
lauer Sammlung 1722. p. 33. — Cfr. SCHEUCHZER
obs. meteorolog. (append. ad act. nat. cur. Vol. IV.)
— HILLARY on the weather and diseases of Barbadoes.
p. 3. — MORGAGNI de sed. et caus. morbor. Epist.

praeteriri debent epidemiae, quarum prima circa a. MDCCXLII. in Germania, altera paullulum serius in Italia, et tertia a. MDCCLVIII. in Scotia obvenerunt. Primae historiam GOELICKE⁴⁵⁾, BÜCHNER⁴⁶⁾, H. P. JUCH et J. J. ZUBERBÜHLER⁴⁷⁾, BAUMLIN⁴⁸⁾, COHAUSEN⁴⁹⁾ tradiderunt; secunda a JOANNE TARGIONI TOZZETTI⁵⁰⁾, et tertia a R. WHYTT⁵¹⁾ adnotata est. Longe lateque grassabatur

XIII. art. 3. 4. — WINTRINGHAM comm. nosol. p. 319. — RUTTY *history of the weather at Dublin*. p. 17. — SWIFTEN constit. epid. I. p. 350.

45) Diss. de febre catarrhali petechizante, nunc epidemico grassante. Francof. 1741.

46) Diss. de febre catarrhali maligna epidemico hactenus grassante. Erford. 1742. et: Diss. historia et curatio febris catarrhalis inter milites epidemica. Erford. 1745.

47) Diss. de febre catarrhali epidemica, cum tussi et coryza complicata, mensibus vernalibus anni praeteriti in plurimis Germaniae provinciis grassante. Erford. 1743. Recus. in A. HALLERI collect. disput. ad morborum historiam et curationem facientium. T. V. LAUSAN. 1758. p. 295. Cfr. A. v. HALLER *Beyträge z. Beförderung der Geschichte und Heilung der Krankheiten. Aus dessen Sammlung pr. Streitschriften in einen Auszug gebracht und mit Anmerkung versehen von Dr. L. CRELL*. 2. B. Berlin 1781. p. 30.

48) *Commerce. literar.* Norimb. a. 1743. p. 188.

49) *Ibidem* p. 313.

50) *Prima raccolta d'osservazioni mediche* p. 174. (Epidemias ab annis 1323. ad ann. 1752. Florentiis observatas recenset).

51) *Medic. Bemerkung. u. Untersuchung. einer Gesellschaft*

tur epidemia a. MDCCCLXII. descripta a D. MONRO⁵²⁾, ISENFLAMM⁵³⁾, J. FR. EHREMANN⁵⁴⁾, C. MERTENS⁵⁵⁾, E. GILCHRIST⁵⁶⁾, MACERIDE⁵⁷⁾, G. BAKER⁵⁸⁾, WATSON⁵⁹⁾ et RAZON⁶⁰⁾. — Morbus
noster

von Aerzten in London. 2. B. A. d. E. Altenb. 1764.
No. 13. p. 166.

52) Abhandl. von den Krankheiten, welche unter den Truppen im Felde und in Besatzungen am gewöhnlichsten sind. Mit Zusätzen des BRUGES DE PRESLE, unter dem Titel: Kriegsarzneywissenschaft. 2. B. Altenb. 1771.
p. 352.

53) Versuch von denen Ursachen der gegenwärtigen allgemeinen Brustkrankheiten. Wien 1762.

54) Diss. de morbo catarrhali benigno hoo anno inter nos epidemico. Argent. 1762.

55) Observationes medicae de febribus putridis, de peste nonnullisque aliis morbis. Vindobonae 1778. P. I. Cap. I. Febris catarrhalis putrida a. 1768. et T. II. Cap. 1. Febris catarrhalis epidemica a. 1762. Viennae observata.

56) Observations on the catarrhal epidemic of 1762. (Essays and observat. physic. and litterar. Vol. III. p. 409).

57) Introd. method. ad theor. et prax. med. T. II. cap. 6. p. 35. (Epidemias, quae Dublinii ann. 1729. 1732. 1733. 1737. 1743 et 1762. reguarunt, descripsit).

58) De catarrho et dysenteria Londinensi, epidemica utrisque a. 1762. Libellus. Lond. 1764.

59) Extract of a letter containing some remarks upon the catarrhal disorder, which was very frequent at London and its neighbourhood in May 1762. (Philosoph. transactions for the year 1762. p. 646).

60) V. Journ. de médecine, par A. ROUX. T. 18. Paris 1763. p. 112.

noſter etiam anno MDCCLXVII. et ſequentibus ignotus non erat, ut teſtantur J. F. K. GRIMM⁶¹), BOEHMER⁶²), HEBERDEN⁶³), ABT⁶⁴) et BAUMER⁶⁵). Imprimis vero ille a. MDCCLXXV. in Anglia et Scotia caput extulit, ubi ipſum deſcripſerunt ANTONIUS FOTHERGILL⁶⁶), JOANNES FOTHERGILL⁶⁷), J. PRINGLE, G. HEBERDEN, G. BAKER et H. R. REYNOLDS⁶⁸), W. CUMING⁶⁹), TH. GLASS⁷⁰), ASH⁷¹), W. WHITE⁷²), J. HAYGARTH⁷³).

61) *Sendschreiben an Hrn. v. HALLER von der Epidemie von Eisenach in der ersten Hälfte des J. 1767 und den Mitteln wider dieselbe. Hildburghausen 1768.*

62) *Diss. de febre catarrhali maligna epidemica, angina gangraenosa stipata. Hal. 1768.*

63) *The epidemical cold, in June and July 1767. (Medical transact. Vol. I. p. 437).*

64) *Diss. de febre catarrhali epidem. maligna. Giess. 1772.*

65) *Pr. de febre catarrhali epidem. maligna. obs. Giess. 1773. Et: Diss. de febre epidemica catarrhali maligna. Giess. 1780.*

66) *Mem. of the medical societ. of London. Vol. 3. p. 30.*

67) *Med. observat. — by a soc. of physicians in London. Vol. 6. p. 340.*

68) *Observations on the influenza in the year 1775. at London. ibid. Vol. 6. p. 348. 349. 352. 355.*

69) *Observations on the influenza in the year 1775. at Dorchester. ibid. Vol. 6. p. 357.*

70) *Observat. on the influenza in the y. 1775. at Exeter. ibid. Vol. 6. p. 364.*

71) *Observat. on the influenza in the y. 1775. at Birmingham. ibid. Vol. 6. p. 377.*

GARTH⁷³⁾, R. PULTNEY⁷⁴⁾, W. THOMSON⁷⁵⁾, G. SKENE⁷⁶⁾, CAMPBELL⁷⁷⁾, G. GRANT⁷⁸⁾. Eundem morbum circa hoc tempus in Germaniam reliquasque Europae provincias pervenisse, ex M. STOLLII⁷⁹⁾, BURSERII⁸⁰⁾, aliorumque⁸¹⁾ operibus elucet. Quid quod per eum simul Americam infestatam fuisse, PERKINS⁸²⁾ et HILLARY⁸³⁾ testantur.

72) *Observat. on the influenza in the y. 1775. at York.*
ibid. Vol. 6. p. 383.

73) *Observ. on the influenza in the y. 1775. at Chester.*
ibid. Vol. 6. p. 389.

74) *Observ. on the influenza in the y. 1775. at Blandford in Dorsetshire.* ibid. Vol. 6. p. 402.

75) *Observ. on the influenza in the y. 1775. at Worcester.*
ibid. Vol. 6. p. 403.

76) *Observ. on the influenza in the y. 1775. at Aberdeen.*
ibid. Vol. 6. p. 404.

77) *Observ. on the influenza in the y. 1775. at Lancaster.*
ibid. Vol. 6. p. 405.

78) *A short account of the epidemic cough and fever 1775. in a letter to Dr. DELACOUR at Bath. Lond. 1776.*

79) *Ratio medendi.* P. I. p. 22. Vindobon. 1778.

80) *Instit. med. pract.* Tom. I. §. 415.

81) *Description et traitement de la fièvre catarrhale épidémique observée en 1732. parfaitement semblable à celle qui s'étend journellement en Europe, vulgairement appelée la grippe.* Montauban 1776.

82) *Sur la nature et l'origine des fièvres catarrhales épidémiques extrait d'un mémoire remis à la société, par Mr. FRANKLIN (histoire de la soc. R. de médecine de Paris. Vol. I. p. 206. a. 1776).*

83) *On the weather and diseases of Barbadoes.*

stantur. Memoratu dignissimae epidemiae MDCCLXXXII. memoria nostro adhuc aetget. Petropoli⁸⁴⁾ illa mense Februario praeapparuit, ibique *influenza* dicta. Mense prae Poloniam, maris baltici oras, et Daniam : ubi *catarrhus Russicus*, aut *Grippe*⁸⁵⁾ (quod nomen antiquius est) adpellabatur. Mense Martii Germaniam et Angliam; mense Junio in Scandinavia mense Julio in Galliam, et mense Novembri Bataviam migravit, ac tandem curriculum solum per universam Europam, sed imo per totum orbem terrarum absolvit. Stupenda haec epidemia descripta est a J. D. METZGER⁸⁶⁾ B. RANOE⁸⁷⁾, C. STRÄCK⁸⁸⁾, CRELL⁸⁹⁾, J. L. SEN⁹⁰⁾, PH. L. WITTE⁹¹⁾, G. GRANT⁹²⁾

84) Putant nonnulli, illam Astrachanii exortam, et tandem Petropolim propagatam esse.

85) *Grippe* a vocabulo Polonico *Chrypka*, quod *respiratio* significat? Non igitur a nominibus gallicis *grève*, *la grive*, ut GRANT (l. c.) contendit?

86) *Beiträge zur Geschichte der Frühlings-Epidemien*. J. 1782. Königsberg 1782.

87) *Observationum medico-practicarum subsecuti decem*. No. 1. *Symbola ad historiam catarrhi epidemici*. 1782. epidemice grassantis. (Acta R. soc. medic. niensis. Vol. I. p. 451).

88) *Diss. de catarrho epidemico* a. 1782. Moguntiae.

89) *Historia catarrhi epidemici* a. 1782. Helmst. 1782.

90) *Kurze Nachricht von der epidemischen Schnupfenzeit u. der Beschaffenheit der Luft* 1781. 1782. 1782.

HAMILTON⁹³⁾, G. FALCONER⁹⁴⁾, E. GRAY⁹⁵⁾, C. M. SMYTH⁹⁶⁾, J. P. MICHELL⁹⁷⁾, C. H. A. ROY⁹⁸⁾, S. G. VOGEL⁹⁹⁾, LENTIN¹⁰⁰⁾, J. WARREN¹⁰¹⁾ aliisque¹⁰²⁾. Num febres catarrhales annis proxime sequen-

91) L. c.

92) *Observations on the late influenza . . . as it appeared ad London in 1775—1782.* Lond. 1782. (Samml. ausserles. Abhandl. f. pr. Aerzte. 10. B. p. 234).

93) *Some remarks on the influenza that appeared in Spring 1782.* (Memoirs of the medical society of London. Vol. II. p. 418).

94) *Account of the epidemic catarrhal fever called the influenza.* Lond. 1782. — Et: Mem. of the med. soc. of London. Vol. III. p. 25.

95) *An account of the epidemic catarrh of the year 1782.* (Med. communications. Vol. I. p. 1).

96) *Remarks on the influenza of the y. 1782.* (ibid. Vol. I. p. 1).

97) *Vaderlandsche. Letter-Oefeningen.* Deel. IV. No. 10. p. 389. (Samml. ausserles. Abhandl. f. pr. Aerzte. 8. 1. Hft. p. 14).

98) *Waarneeming van eine kwaadaartige Zinkingskoorts; welke in het Roomsche Meisjes-Weeshuis te Amsterdam in de Maanden Nov. en Dec. 1782. en Jan. en Febr. 1783. geregeerd heeft.* (Handel. van het Genootsch. Servandie civibus. Deel 9. Bl. 337.).

99) *Handbuch der prakt. Arzneywissenschaft.* Stendal 1785. 2. Th. p. 201.

100) *Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft.* Wien 1800. 1. B. p. 25.

101) *Description of the influenza of America.* Y. 1782. (Memoirs of the med. soc. of London. Vol. 4.).

102) *An account of the epidemic disease called the in-*

sequentibus a J. D. METZGER¹⁰³⁾, WOLF¹⁰⁴⁾, WEGENER¹⁰⁵⁾, GILBERT¹⁰⁶⁾, G. CURRIE¹⁰⁷⁾ observatae, ad eandem epidemiam pertinnerint, nec ne, determinare non audent. Certissime nova fuit epidemia a. MDCCCIII., quam ipsimet Parisiis mensibus Februario et Martio, dein Londini mensibus Aprili et Majo observavimus. Praecedentis ea circiter iter secuta est. Legi de hac epidemia merentur opuscula HORSTI¹⁰⁸⁾, JONAS¹⁰⁹⁾, KORTUM¹¹⁰⁾, KLEES¹¹¹⁾, SEDILLOT ejusque sociorum¹¹²⁾, DOUBLE¹¹³⁾, TARANGET¹¹⁴⁾,

VI.

influenza, of the y. 1782. collected from the observations of several physicians in London and in the Country by a Committee of the Fellows of the R. College of Physicians in London. In Medical transact. Vol. III. p. 54.

103) *Beyträge zur Geschichte der Frühlingsepidemie im J. 1800. Altenb. 1801.*

104) In HUFELAND's *Journ. der prakt. Heilkunde.* 9. B. 4. St. 10. B. 1. St.

105) *Diss. de febre maligna catarrhali per Slesvici et Holaeitiae loca maritima grassante. Kil. 1789.*

106) *Resumé des observations des médecins de Lyon, sur la fièvre catarrhale, qui a régné dans cette ville en Vendém. Brum. et Frim. l'an IX. (Recueil des actes de la société de santé de Lyon. Tom. 2. p. 369).*

107) *Short account of the influenza which prevailed in America in the y. 1789.*

108) HUFELAND's *Journal.* 2. B. 109) *Ibidem.* 2. B.

110) *Ibidem.* 13. B. 3. St. 111) *Ibid.* 16. B. 4. St.

112) *Journal général de médecine. T. XVI. p. 126. V. Sammlung auserles. Abhandl. f. pr. Aerzte. 21. B. 2. St. p. 110.*

VIMONT¹¹⁴), CHARPENTIER¹¹⁵), L. DEFFERARI¹¹⁷),
nec non responsa quinquaginta novem medico-
rum ad quaestiones a societate medica Londi-
nensi circa illam propositas¹¹⁸). Annis quoque
sequentibus febrium catarrhalium epidemiae po-
tissimum in Gallia observatae ac descriptae sunt
a J. C. GASC¹¹⁹), ROUX¹²⁰), BOURJAT¹²¹), BAR-
REY¹²²),

113) Ibid. Tom. XVI. et Abhandl. p. 133. 145.

114) *Observation sur l'affection catarrhale, qui a régné dans quelques départements du Nord de la France dans les premiers mois de l'an XI. (Annales de la soc. de médecins de Montpellier. T. I. part. 2. p. 201).*

115) *Reflexions sur les maladies catarrhales, qui ont régné pendant l'an XI. à Château-Saline précédées d'un essai sur la topographie médicale de cette ville. (ibid. T. IV. p. 129).*

116) *Observations sur le catarrhe épidémique à Niort. (ibid. T. 7. p. 153).*

117) *Rapport fait à la société médicale de Gènes sur l'épidémie catarrhale, qui a régné dans la Ligurie l'an 1803. Traduit de l'italien. (ibid. T. VII. p. 162).*

118) *Mem. of the med. soc. of London. Vol. VI. p. 266, 272. 290. 293. 299. 300. 305. 318. 326. 330. 339. 343. 347. 350. 354. 358. 375. 380. 390. 398. 404. 406. 411. 416. 421. 428. 433. 437. 441. 447. 448. 453. 454. 459. 462. 470. 479. 483. 490. 498. 501. 505. 507. 514. 517. 521. 533. 539. 543. 545. 559. 565. 571. 575. 577. 578. 582. 592. 596.*

119) *Mémoire sur une fièvre catarrhale maligne observée à Tonneins vers la fin de l'automne de l'an 1805. et le commencement de l'hiver 1806. (Annales de la société de médecine de Montpellier. T. VIII. p. 193).*

REY¹²²), PT¹²³), HORTEL¹²⁴), MAYNEC¹²⁵
RIN¹²⁶), LACORDAIRE¹²⁷), BYLON¹²⁸) aliis

- 120) *Notices sur les maladies catarrhales, qui ont*
Seurre. (GRAPERON bulletin des sciences médi-
II. p. 11).
- 121) *Reflexions sur les causes matérielles ou effec-*
catarrhe épidémique (extrait). (Annuaire de
de médecine du département de l'Eure. A.
170).
- 122) *Rapport sur une épidémie de fièvre catarrha-*
regné dans le village de la Tour de Serre du
au 12. Avril 1807. (Annales de la soc. de
Montpellier. T. II. p. 305).
- 123) *Mémoire 1. sur le catarrhe épidémique, qui*
à Narbonne (ibid. T. VII. p. 225). *Mémoire :*
fièvre catarrhale grave (ibid. T. X. p. 5. 69).
d'une fièvre catarrhale pleuritique, qui a regné
bonne . . . pendant les quatre premiers mois
1810. (ibid. T. XXIII. p. 301).
- 124) *Histoire des fièvres catarrhales, qui regnent*
noles dans le val de Ribas en Bapagne. Extrait
port avec quelques considérations sur l'influence
mate, par Mr. DOUBLE. (SEDILOT recueil pe-
de la soc. de méd. de Paris. T. XXVII. p. 17).
- 125) *Mémoire sur la fièvre catarrhale, qui pendant*
mier semestre de 1810. a regné épidémiquement
département du Lot. Partie 1. 2. (ibid. T. X.
209. 313).
- 126) *Observations cliniques sur les catarrhes épidé-*
qui ont regné à Toure pendant les premiers six
l'an 1813. (ibid. T. XXXIII. p. 313).
- 127) *Observation sur une affection catarrhale épi-*
(Bulletin de la soc. de méd. de Paris 1815. p. 38

§. XIV.

Symptomata. Necroscopia.

1. Febres catarrhales *solitae* ordiuntur a sen-8. fe-
 su aegritudinis ac lassitudinis, quibus sub vespe-^{brium ca-}
 ram frequens horripilatio, intercurrente calore, ^{tarrh. so-}
 accedit. Pulsus fit sano frequentior et plenior. ^{litarum.}
 Urget plus minusve sitis. Haec singula circa
 mediam noctem aegrotum minori vi affligunt.
 Remissio non solum ad matutinum tempus, sed
 ad solis occasum usque protrahi solet. Praeterea
 serius ocius animadvertuntur capitis, praecipue
 circa sinus frontales, gravitas, dolor ruborque
 oculorum, lachrymatio, obturatio narium, emun-
 gendi continua necessitas, sternutatio, abolitio
 odoratus, calor et siccitas oris, sapor depravatus,
 lingua albida, screatus frequens, raucedo, de-
 glutitionis quaedam difficultas, rubedo faucium,
 titillatio laryngis, sensus ponderis ad pectus, ma-
 xime

128) *Korte aanteekening wegens eene algemeene Ziekte
 doorgaans genaamd de Knokkelkoorts. (Verhandel. van
 het Bataviaasch Genootsch. Ed. Batw. Deel 2. bl. 17.
 6. Edit. Rotterd. Deel 2. bl. 176.).*

129) *Rapport sur l'épidémie régnante (fièvre catarrhale) a.
 1805 et 1806. lu à la société de Marseille dans la Séance
 du 1. Févr. 1806. par la commission nommée à cet effet,
 (Annales de la soc. de méd. de Montpellier. T. XV.
 hist. T. III. p. 69). — HUYELAND's Journ. d. prakt.
 Heilkunde. 1. B. 24. B. 2. St. p. 110. — ZEVIANI
 opuscolo sul catarro epidemico. (Memoria della soc. Ita-
 liana. T. XI. p. 476).*

Frank Prax, I. 1. 2.

E

xime vero tussis, primum sicca, dein spu-
 cosis, ductilibus, interdum striis sanguin-
 tatis, tandem puriformibus insignita. Inf-
 adultisque nonnullis haec tussis vomitum
 In plurimis illa somnum impedit. Excitan-
 tissimum tussis insultus inspiratione p-
 (caeterum dolorem nullibi provocante), a-
 natione, vagitu, corporisque motu. De-
 tamen undique concessus. Ciborum desi-
 quandoque auctum, ut plurimum vero in-
 tum.' Pusiones mammarum papillas, qua-
 arripiebant, mox respuunt'). Alvus mo-
 structa, modo liquida, raro normalis. U-
 plurimum ignea. Sudor, praesertim parti-
 multis singulas remissiones concomitatur
 dumtaxat versus morbi finem, videlicet
 septimum diem, raro citius, saepe seri-
 cunda nimirum, tertia quartave hebdoma-
 paret, isque super universam corporis sup-
 extensus. Sequitur plerumque urina cu-
 mento puriformi. Nares, excreta mater-
 formi, sputis non dissimili, liberae.
 Caeterum quaedam tussis, in aegrotis
 sanis mox evanitura, saepe restat.

S. febr. ca-
 tarrhal. in-
 solitarum.

2. Febres catarrhales *insolitae* ²⁾ a p

1) Arduum enim foret, ore repleto naribusq-
 obstructis, spiritum ducere.

2) *Influenza; la Grippe; Russischer Katarrh, E-*
tarrh. (SPRENGEL's Handb. d. Patholog. 2. Th

virium dejectione³⁾ et temulentia incipere solent⁴⁾. Haud raro vertigo⁵⁾, interdum auditui gravi nupta⁶⁾; obvenit. Aegroti de capitis obtuso dolore conqueruntur. Dolor iste praecipue transversim regiones supraorbitales detinet⁷⁾. Sunt, qui palpebras movere nequeant⁸⁾, quique lucem aegre ferant⁹⁾. Oculi interdum splendore destituti¹⁰⁾. Facies modo est collapsa, modo tumidula¹¹⁾. Dolet praeterea dorsum dolentque lumbi¹²⁾. Nonnunquam extremitatum et surarum¹³⁾ percipiuntur cruciatus. Febris a paucio frigore ordiri solet¹⁴⁾; visum tamen illud est concutiens¹⁵⁾. Calor sequitur intensus cum cute sicca¹⁶⁾, multaque siti¹⁷⁾. Pulsus frequens, mollis, interdum parvus¹⁸⁾, et intermittens¹⁹⁾. Gra-

E 2 vis

3) Major erat virium lapsus in epidemia 1803. quam fuerat in illa 1782. (METZGER l. c.).

4) Gravem morbum expectavi, dum febris catarrhali, a. 1803. Parisiis grassante, correptus eram.

5) GRANT l. c. (a. 1782).

6) WITTWER l. c. (*Schwindlige Taubheit des Kopfes*).

7) HAMILTON l. c. WITTWER l. c. (*Ein queer über den Augen liegender Schmerz*).

8) HAMILTON l. c. 9) HAMILTON l. c.

10) WITTWER l. c. 11) Idem l. c.

12) SYDENHAM, GRANT, RANOE, WITTWER ll. cc.

13) WITTWER l. c. 14) MICHELL l. c.

15) WITTWER l. c. 16) MICHELL l. c.

17) WITTWER, HAMILTON ll. cc.

18) SYDENHAM, GRANT ll. cc.

19) WITTWER l. c.

vis est coryza atque e naribus serum adeo acre manat, ut labium superius inde erodatur²⁰⁾. Vehemens observatur in multis sternutatio²¹⁾, per quam capitis dolor augetur²²⁾. Haud raro est epistaxis²³⁾. Raucedo saepe difficultati deglutiendi jungitur²⁴⁾. Nonnulli sensum globi in faucibus haerentis percipiunt²⁵⁾. Fere omnes anxietate²⁶⁾ et pectoris angustia²⁷⁾ laborant. Tussis haud raro sputum cruentum largitur²⁸⁾, pectorisque dolorem socium agnoscit²⁹⁾. Plurimis epidemiis familiares sunt dolor epigastrii³⁰⁾, anorexia et nausea³¹⁾, pertinaxque vomitus³²⁾. Alvus plerumque obstructa³³⁾; interdum diarrhoica³⁴⁾. Urina crassa³⁵⁾. Febris cum reliquis symptomatibus vespere exacerbatur, fugato omnino somno nocturno³⁶⁾. Alias sopor et quandoque stupiditas, delirium³⁷⁾, convulsiones, maculae lividae cutis³⁸⁾, abdominis saevi dolores, dysuria³⁹⁾, et ischuria⁴⁰⁾ observari solent.

20) HAMILTON l. c. 21) WITTWER l. c.

22) HAMILTON l. c. 23) HAMILTON l. c.

24) RANOE l. c. 25) HAMILTON l. c.

26) MICHELL l. c. 27) HAMILTON l. c.

28) RANOE, METZGER ll. cc. 29) HAMILTON l. c.

30) MICHELL l. c. 31) MICHELL l. c.

32) SAILLANT (a. 1744.), RANOE, MICHELL, WITTWER ll. cc.

33) METZGER l. c. 34) WITTWER l. c.

35) SAILLANT l. c. (a. 1744.) GRANT l. c.

36) MICHELL l. c. 37) WITTWER l. c.

38) SAILLANT l. c. (a. 1744.).

39) SAILLANT l. c. (a. 1744.). 40) MICHELL l. c.

solent. Morbus modo trium quatuorve dierum spatio terminatur, modo ad hebdomadem tertiam⁴¹⁾ et longe ultra protrahitur. Finem comitantur sudor, urina foetida⁴²⁾, diarrhoea⁴³⁾, abscessus aurium⁴⁴⁾, ptyalismus⁴⁵⁾, hydroa circa labia⁴⁶⁾, epistaxis⁴⁷⁾, furunculus⁴⁸⁾.

3. Phaenomena, ad anatomiam pathologicam ^{Neeroscopia} morbi nostri spectantia, jam in prima praesentis operis editione⁴⁹⁾ sequentibus verbis descripsimus. Sectis, aiebam, permultis cadaveribus hominum, qui ex febribus catarrhalibus tum sporadicis tum epidemicis defuncti sunt, constanter *inflammationem* internae superficiei *bronchiorum* detexi. Eorum cavitas ut plurimum mucum spumoseum, non raro sanguine tinctum, offerebat. Ipsa vero pulmonis substantia omnis inflammationis experta erat, si excipiamus externam illorum superficiem, hinc inde roseo colore notatam. Nonnunquam serum vel lympham coagulabilem, ad uncias paene multas, in cavitatibus thoracis inventa est.

§. XV.

41) METZGER l. c. 42) MICHELL l. c.

43) RANOE l. c. 44) HAMILTON l. c.

45) RANOE l. c. 46) RANOE l. c.

47) RANOE l. c. 48) MICHELL l. c.

49) Itaque a. 1811. longe ante BADHAMI de bronchitide opus, addidi (§. LXV. No. 6.): „... rectam habebis febrium catarrhalium saltem fortiorum ideam, si eas pro inflammatione bronchiorum, sive pro bronchitide consideres.“

§. XV.

C a u s s a e.

C. prae-
dis-
ponentes. 1. Febres catarrhales, vulgo *influenza*, *grippe*, fere nemini parcunt¹⁾, atque ita supra terram et supra mare migrant²⁾. Facillime corripiuntur juvenes³⁾, et

1) „Hoc tempore (ab a. 1728. — a. 1737.) hanc regionem (Angliam) infestavit morbus, omnium, quotquot ego saltem memini, maxime epidemicus; omnes pervasit domus, pauperum tabernas regumque turres: vix unus aut alter, rure vel in urbe, senex aut puer, robustus aut infirmus, evasit.“ (HUXHAM l. c.). — Nemini parcebat, „ita, ut etiam hunc catarrhum diversis morbis chronice decumbentes invasisse observavim.“ (RANOE l. c.). — „In sehr vielen Häusern war die Herrschaft nebst dem Gesinde krank, so dass jene sich fremde Leute zur Bedienung miethen mussten.“ (METZGER l. c.). — ST. ALBANI decerant morbi epidemici culpa milites pro excubiis (HAMILTON); Londini ex eadem causa deficiebant actores pro spectaculis theatri Drury Lane (METZGER l. c.). — „Sie (die Influenza) wurde so allgemein und heftig (in Wien 1782), dass öfters die Mannschaft auf den Militair-Wachen abgelöst, und sogar das Theater auf acht Tage geschlossen werden musste.“ (Wien's Geschichte, Beschreibung u. s. w. 1. B. p. 290. Wien 1821). Idem circiter ibidem accidit a. 1803. — Eodem tempore Parisiis epidemia effecit, ut necessarius veredariorum et aurigarum numerus pro servitio publico desideraretur.

2) HAMILTON l. c.

3) PERKINS l. c. („L'épidémie (1745.), qui affecta particulièrement les jeunes gens et ceux d'un âge moyen“).

et feminae⁴⁾; minus infantes⁵⁾, quos contra facillime febres catarrhales solitae adgrediuntur, praesertim sub primo dentitionis opere. Febres huiusmodi maxime habitui corporis molli et laxo, atque temperamento sanguineo-phlegmatico addictae sunt. Favent praeterea illis rerum positiones omnes, quae ad febres rheumaticas disponunt⁶⁾.

2. Epidemiae supra commemoratae neutiquam repeti possunt a vicissitudinibus repentinis atmosphaerae⁷⁾, a nebulis⁸⁾ ab Euro⁹⁾, a quibus febres catarrhales solitae, instar rheumaticarum, nasci solent¹⁰⁾. Ignota hinc annua constitutio accusari debet¹¹⁾. *Contagii* suspicio a plurimis factata¹²⁾, propterea, quod morbus uno temporis

ictu¹³⁾

4) WITTWER l. c. 6) WITTWER l. c.

6) Cap. II. §. IX. No. 2.

7) Contra opinionem, quam MICHELL, WITTWER aliique tuebantur.

8) SAILLANT (a. 1780. Parisiis), SCHNURMAN op. o. T. 2. p. 198.

9) MORGAGNI l. c. 10) Cap. II. §. IX. No. 3.

11) Varias sunt annorum constitutiones, quae neque calori, neque frigori, non sicco humidoque ortum suum debent, sed ab occulta potius et inexplicabili quadam alteratione in ipsis terrae visceribus pendent, quae humana corpora huic vel illi morbo addicunt determinantque, stante scilicet praefatae constitutionis dominio." (SYDENHAM de morb. epid. opp. T. I. p. 22).

12) GRANT, CULLEN, METZGER, WOLF, MOST ll. cc.

ictu¹³⁾ integras provincias infestat, ita, ut a simplici contactu et communicatione tanta propagationis velocitas pendere non possit, minime admittenda¹⁴⁾. Probabilius igitur est causam febrium catarrhalium insolitarum pendere a conditione insolita atmosphaerae aut a praesentia materiae cujusdam acris in ea latitantis, a *miasmate* videlicet sive ventorum ope advecto, et quaquaversum disperso¹⁵⁾, sive pedetentim e variis globi terre-

13) „Circa finem Aprills (1658.) *derepente* emleuit affectus, qui velut afflatu quodam a sideribus emissus, quam plurimos una corripuit, ut in quibusdam oppidis, unius septimanae spatio, plus quam mille homines simul decumberent.“ (WILLIS l. c.),

14) Pulchre Sir GILBERT BLANE (*the Edinburgh medical and surgical Journal*. July 1825. No. LXXXIV. p. 61.): „... that if any disorder affecting a whole community arises from some noxious principle in the soil and air, it must, in the nature of things, attack simultaneously all who are exposed to it; whereas, if it proceeds from any morbid principle generated in the human body, its attack will be progressive; a certain space of time being necessary for it to pass from individual to individual, and still more from one region or community to another.“

15) HUXHAM, R. WHITT, METZGER ll. co. JUCH l. c. — SELLER med. clin. p. 126. — WEIKARD in BALDINGER's n. Magazin für Aerzte. 4. B. 3. St. — HECKER die Kunst, die Krankheiten der Menschen zu heilen. 2. Aufl. Wien 1803. 2. Th. p. 274. — G. W. CR. CONBRUCH clinisches Taschenbuch für prakt. Aerzte. 4. Aufl. Grätz 1807. 2. B. p. 342.

terrestris locis eructato, et contiguo aëri communicato. Tale miasma ab *exhalationibus mineralibus*¹⁶⁾ aut ab *electricitate*¹⁷⁾ repetere, hypothesis est, cui quodammodo favet observatio, febrium catarrhalium indicatas epidemias nonnunquam serius ocus post terrae motus¹⁸⁾, explosiones vulcanicas¹⁹⁾, et meteora ignea²⁰⁾ exortas fuisse. Ast quum haec portenta saepius obvenerint, quin illae epidemiae secutae sint, nexum illa inter et has, qui adlatæ hypothesei opitulari posset, desideramus. Idem de opinionibus valet, tales epidemias omni vigesimo anno cyclum absolvere²¹⁾, atque a solutione nivium in montibus glacialibus ad polum arcticum²²⁾, aut ab insectis²³⁾, aut ab excessu oxygenii²⁴⁾ pendere. Memorabile est,
*fere*²⁵⁾

16) SYDENHAM l. c.

17) SPRENGEL l. c. 2. Th. p. 120. — MOST l. c. §. 102.

18) A. 1580. (in Anglia, Gallia), 1703. (Romae) SAILLANT l. c. SCHNURER l. c. T. 2. p. 247. 252. a. 1712. (multis in locis).

19) A. 1677. (*Ile de Fer*) SAILLANT l. c. — a. 1767. SCHNURER l. c. p. 318.

20) A. 1676. (in Italia et Turcarum imperio). A. 1737. (in Anglia). SAILLANT l. c.

21) MOST l. c. §. 69. et §. 115 sq. (epidemiis a. 1742. 1762. 1782 et 1802. innixus). Attamen ubi est praedicta illa anni 1822?

22) MOST l. c. §. 86. Cfr. METZGER l. c. p. 61.

23) Cfr. METZGER l. c. p. 60. — VOGEL l. c. 2. Th. p. 206. *Anmerkung*. — MOST l. c. §. 101. p. 139.

24) LANGUTH l. c. — MOST l. c. §. 107 — 114.

*ferè*²⁵⁾ omnes hujus generis epidemias, quasi barbarorum incursiones aemularentur, inter Europae saltem confinia, a septemtrione ad meridiem migrasse.

C. proxima.

3. Ad *causam proximam* febrium catarrhaliū quod spectat, illam in peculiari affectione membranae pituitariae cavitates narium, faucium, laryngis et bronchiorum investientis locamus, cui in morbo solito, perspiratio cohibita, in insolito autem, peculiaris irritatio ansam porrigunt. Ille igitur morbus a febribus rheumaticis dumtaxat relate ad *sedem* differt²⁶⁾; hic autem *specificus* est²⁷⁾. Quum et febres catarrhales solitae rheumaticarum instar epidemice grassari possint; specificas illas consulto non unico nomine *epidemicarum* compellavimus. Placuit potius denominatio *morbi insoliti*, a GRANT²⁸⁾ deprompta.

§. XVI.

D i a g n o s i s.

Facilis confusio.

1. Febres catarrhales cum *febribus intermittenti-*

25) Epidemia a. 1580. a meridie ad Septemtrionem tendebat.

26) „Quae fluxiones fiunt ad pulmones, asperam arteriam et alias cavitates corporis, *catarrhi*; quae vero ad artus, *rheumata* sunt aut *rheumatismi*.“ (GALENI comment. 3. in HIPPOCRATIS aphorismos). Et sequens distichon:

„Si fluat ad pectus, dicatur rheuma catarrhus,
Ad fauces branchus, ad nares esto coryza.“

27) MOSY op. c. §. 13. 28) l. c.

tentibus, typho, morbillis, croup, peripneumoniis, phthisi pulmonali incipiente, coqueluche, catarrho et coryza confundi possent.

2. Periculum confusionis *februm catarrhalium cum febre intermittente quotidiana, s. tertiana duplici et subcontinua* (quod jam dudum medicorum attentionem excitavit¹⁾), facile intelligitur, si perpendatur, febres illas saepe remissiones adeo protractas agnoscere, ut speciem apyrexiae imperfectae prae se ferant; hasque interdum complicationem catarrhalem sociam habere²⁾. Verum febris intermittens quotidiana, tertiana duplex, et subcontinua *horis antemeridianis invadunt*³⁾; catarrhalis contra *vespere* exacerbatur. Ibi paroxysmus *exquisito frigore*; hic exacerbatio inter-

Dist. a febribus intermittibus.

1) STRACK l. c. p. 25. LAFONT-GONZI *mémoire sur cette question: Les fièvres catarrhales graves différent elles essentiellement des fièvres remittentes pernicieuses?* (Mém. de la soc. méd. d'émulation, a. 6. p. 322). — FAYAT *mém. sur les fièvres catarrhales graves et remittentes pernicieuses.* (Actes de la soc. de méd. pratiqu. de Montpellier. a. 1804—1806. Mém. p. 3). — J. C. JACOBS *diss. de febribus perniciose remittente et catarrhali gravi.* (ibid. Mém. p. 119). — GAILLARD *de febrium catarrhalium cum remittentibus perniciosis comparatione.* Diss. ibid. p. 161. — *Rapprochement des fièvres catarrhales graves et fièvres intermittentes pernicieuses.* (Annales de la soc. de méd. de Montpellier. T. 16. Hist. T. 4. p. 843).

2) P. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXVIII. No. 17.

3) Ibid. No. 9 et 10.

intercurrente calore incipit. Tandem dubia in diagnosi etiam notiones morborum plus minusve regnantium resolvuntur⁴⁾.

Feb. catarrhal. simplex. 3. *Febris catarrhalis* nobis est *simplex*, dum illa modo supra indicato⁵⁾ decurrit. Ipsa haec denominatio etiam febribus catarrhalibus insolitis, ubi lenissime adfligunt, convenit.

Feb. catarrhal. complicata. 4. Febres catarrhales pro *complicatis* declaramus, dum praeter symptomata catarrhalia illa febribus inflammatoriis, rheumaticis, gastricis et nervosis propria exhibent.

Feb. catarrhal. inflammatoria. 5. Symptomata *inflammatoria* febribus catarrhalibus superaccedere solent; si aeger fuerit robustus, floridus, juvenis, plethoricus et liquorum fermentatorum potui addictus; si evacuationes habituales inprimis menstrua et haemorrhoides suppressae fuerint; si annua vel epidemica constitutio morbis inflammatoriis faveat, sique methodus medendi calefaciens adhibita fuerit. Nec rarum est hac sub rerum positione membranam mucosam narium, faucium, laryngis et bronchiorum revera inflammari. Tali in casu morbus nomen febris catarrhalis gerere cessat, illudque ex loco inflammato desumptum, accipit. *Inflammationes* hujusmodi *catarrhales* id proprium habent, quod maxime membranis mucosis addictae sunt, quod muci puriformis secretionem largiuntur, quodque sedem facile mutant.

6. *Rheu-*

4) STRACK, WITTWER II. cc. 5) §. XIV. No. 1.

6. *Rheumaticam salutamus febrem catarrha-* Feb. ca-
lem, quae praeter adfectionem membranae pitui-
 tariae, vias respiratus ambientis, simul affectione
 membranarum serum secernentium, musculorum,
 tendinum, ligamentorum et periostii stipatur.
 Quodsi istiusmodi partium affectio prae eâ mem-
 branae mucosae emineat; morbo potius nomen
 febris *rheumaticae* catarrhalis impertitur. Caete-
 rum hic de uno eodemque agitur morbo, solum
 quoad sedem magis complicato, et, si febris si-
 mul cum notis inflammatoriis urgeat (*febris ca-*
tarrhalis rheumatico - inflammatoria) magis ad
pleuritidem proclivi⁶⁾.

§. XVII.

P r o g n o s i s.

1. Febres catarrhales *simplices*, in corpore Generalia.
 caeterum bene constituto, periculo vacant. Lon-
 ge aliter de *complicatis*, praecipue in hominibus
 jam antehac valetudinariis, in infantibus et seni-
 bus, maxime si perversa accesserit curandi ratio,
 sentiendum est, ut conspicua funerum sub epide-
 miis febrium catarrhalium copia docet⁷⁾.

2. Fe-

6) Sic sese res habebat in epidemia a LANCISIO descri-
 pta (opp. varia. de adventitiis coeli Romani qualitati-
 bus), quae a nonnullis immerito ad febres catarrhales,
 vulgo *influenza*, referebatur.

7) Scriptores de febribus catarrhalibus epidemicis, vulgo
influenza, uno ore fatentur, morbum per se fuisse
 insontem, ac funera unico rerum positionibus ad-

P. feb. catarrh. inflammatoriae.

2. *Febris catarrhalis inflammatoria* varii generis pericula portendit: 1° potest affectio inflammatoria membranae pituitariae cavitatum nasalium, *encephalo* communicari; tunc, quemadmodum saepe in infantibus accidit, sopor, vomitus, convulsiones, et, morbo haud rite curato, mors, praesto sunt; 2° potest irritatio membranae mucosae laryngem et tracheam investientis ad inflammationis usque gradum attolli, atque *croup*, cujus pericula in proprio tractatu exponentur, efficere; 3° potest idem hoc morbi augmentum in membrana interna bronchiorum locum habere et *bronchitidem* largiri. Et hacce ad inflammationem parenchymatis pulmonum dumtaxat gressus exstat.

P. feb. catarrhal. rheumaticae.

3. Quodsi agatur de *febre catarrhali rheumatica*, facile evenit, ut membranae scrosae et fibrae musculares, quae locis affectione catarrhali prehensis proximae sunt, simul afficiantur. Hoc in casu *meninges* et praecipue *pleura* patiuntur, quin dici possit morbum e cavitatibus nasalibus et e bronchiis ad illas membranas pervenisse.

Simul-

ventitiis fuisse adscribenda. Sic in epidemia a. 1782. a GRANT descripta, omnes aegroti, uno excepto, sanati fuerunt. In epidemia, quam a. 1803. Parisiis et Londini observavi, omnes, qui firma antehac sanitate frui erant, atque nunc rite tractabantur, convalescerunt. Strages, quas morbus ediderat, maxime phthisicis, qui ante terminum consuetum e medio tollebantur, adscribendae erant.

Simultanea haec plurimarum partium adfectio, per se jam molesta, periculosa evadit, si pars rheumate detenta revera inflammetur, et quidem propter phlogoseos exitum. Tali pacto febribus catarrhalibus *encephalitidem* et *pleuritidem* supervenisse atque ex istis *hydropem acutum cavitatis cranii* et *sacci pleurae* evolutum fuisse pluries vidimus.

4. Ubi febris catarrhali *complicatio gastrica* P. feb. catarrh. gastricae. jungitur (sicut saepissime in epidemicis accidere solet²⁾); varii generis pericula obveniunt. Urget enim periculum virium lapsus ex saburrarum et bilis in systema nervosum deleteria actione, urgetque illud affectionis membranae tubi intestinalis, aut ex stimulo saburrarum et bilis, aut ex ipsa huc delata causa catarrhi. Quo magis tubi intestinalis conditio ad inflammationem accedit, quoque magis peritoneum in consensum trahitur, eo peior aegri status.

5. Sicuti febris rheumaticae sub determinatis P. feb. catarrh. nervosae. rerum positionibus³⁾ in febres *nervosas* transire possunt; ita etiam *catarrhales*. Imo febres istiusmodi *epidemicae*, quatenus vires systematis nervosi mox a morbi initio deprimunt, prae caeteris

2) SYDENHAM, GRANT, STOLL, VOGEL, MICHELL II. co. etc. Cfr. VILLAIN observation sur une fièvre catarrho-gastrique avec malignité. (Annales de la soc. R. de médecine de Montpellier. T. XII. p. 325).

3) Cap. II. §. XI. No. 2. 3.

ris talem minantur transitum. Caeterum suspi-
camur, nonnullos confudisse febres catarrhales
cum typho⁴⁾, symptomatibus catarrhalibus sti-
pato⁵⁾.

P. feb. ca-
tarrhal. ex
peculiari
aegror.
conditio-
ne.

6. Quodsi febris catarrhalis ob fortuitas com-
plicationes jam tot pericula portendat; quid de
illa febre nidulante in corpore alioquin imbecillo,
ad alienos morbos praedisposito aut ab illis jam
depravato, expectandum erit? — Respondeant
medici, qui febres catarrhales curarunt in infan-
tibus tempore primae dentitionis, in senibus ad
affectiones soporosas proclivibus, in gravidis et
puerperis, in hominibus, strumis, varicibus et
tuberculis pulmonum, vitiis organicis cordis va-
sorumque majorum, nec non viscerum abdomi-
nalia laborantibus. — Audietis, febres illas,
etiamsi per se insontes, sub allatis rerum posi-
tionibus (ex culpa quoque mechanici effectus tus-
sis) provocasse hydrocephalum acutum, apople-
xiam, abortum⁶⁾, peritonitidem, accessus suffo-
cationis, haemoptoën, phthisin pulmonalem, hy-
dropem pectoris etc.

§. XVIII

4) O. F. W. FRENTZEL de peculiari quadam febris ma-
lignae catarrhalis exanthematicae, purpuraceae — pu-
stularis speciei. (Acta acad. nat. cur. Vol. X. p. 260).
— DENN I. C. KANNENGIESSER I. C.

5) J. C. BERTRAND *mémoire sur un typhus catarrhal,*
qui a régné en Lithuanie. (Hist. et mémoire de la^e soc.
de méd. prat. de Montpellier. a. 1816. p. 3).

6) GRANT op. c.

§. XVIII.

C u r a.

1. Prophylaxis febrium catarrhalium *solita*-^{Prophylaxia.}
rum cum illa febrium rheumaticarum¹⁾ convenit. ^{xia.}

Attamen si febres catarrhales datis temporibus, praesertim circa aequinoctia, habituales fuerint, operae pretium foret, malo in plethoricis ope *phlebotomiae*, proxime ante indicatam epocham instituendae, occurrere. Homines compagis laxioris saepe habituales febres catarrhales, *decocto diaphoresin movente*, praepediunt²⁾. Febres catarrhales *insolitas* nec morborum contagiosorum instar impedire³⁾, nec jam praesentes, quemadmodum morbos constitutionales, evitare concessum est. Suadent quidem quotidie corporis superficiem pannis laneis perfricare, domum ante sumtum jentaculum non derelinquere, ante cubitum potus theatos cum pauxillo taphiae haurire, fumigationes varii generis instituere etc.; sed, ut experti sumus, sine successu. Quamobrem satius erit, tempore, quo talis *influenza* grassatur, civibus inculcare, ut ordinatissime vivant, eo fine, ut ingruens morbus a complicationibus saltem

1) Cap. II. §. XII. No. 1.

2) Consilio Fr. Hoffmanni l. c.

3) Proponit quidem Mospius (l. c. §. 145.) cautelas adversus pestem valentes et adversus febres catarrhales epidemicas valere; probatur inde cl. virum nunquam vidisse quo pacto febres catarrhales insolitae uno temporis puncto integras provincias invadunt.

Frank Prax. I. 1. 2.

saltem liber maneat. Imprimis evitandae sunt res, nexum cum peculiari epidemiae genio habentes, e. c. si character morbi fuerit inflammatorius — potus liquorum fermentatorum, alimenta nimis succulenta; si fuerit gastricus — crapula, cibi crudi; si nervosus — evacuationes nimiae, animi pathemata deprimentia etc.

C. feb. catarrhal. simplicium. 2. *Cura febrium catarrhalium simplicium illi febrium rheumaticarum simplicium respondet.* Ordinato hinc indicato regimine diaetetico⁴⁾, et praeterea *silentio*, morbus naturae committitur, ut decursum suum placide absolvere possit. Haec regula, testimonio omnium⁵⁾ maxime valet, quum de *influenza* in hominibus, caeterum bona constitutione donatis, agitur. Solum ad tussim leniendam *pharmaca emollientia, mucilaginosae et oleosae*, potissimum sub forma linctus⁶⁾, praescribuntur. Ad finem jam jam vergente morbo, naturaque salutarem sudorem molliente, *pharmaca*

4) l. c. No. 3.

5) BOCKEL, SPORISCH, SYDENHAM, GRANT, HAMILTON, METZGER, WITTWER etc.

6) R. Mucilaginis gummi arabici, syrupi violarum ana unciam unam. Aquae fontis uncias quatuor. M. cap. cochleatim. Vel: R. Olei amygdalarum dulcium recentem expressi unciam semis. Mucilag. gummi arabici, syrupi althaeae aa unciam unam. M. Vel: R. Radicis salep grana quindecim. Coq. c. s. q. aquae per quartam horae partem. Colaturae unciam septem adde syrupi capillorum veneris unciam unam. M.

maca illa in vehiculo leniter *diapnoico* 7) suppetantur.

3. Febre catarrhali *notas inflammatorias* aut C. feb. catarrh. inflamm. solitar. in universo corpore, aut in aspera arteria aut in bronchiis exhibente, in morbo *solito* sine induciis ad *phlebotomiam* e brachio confugiendum. Illa enim si juxta virium aegrorumque constitutiones instituat, atque repetatur, semper valde proficua est. Neque hic de solis adultis, sed etiam de infantibus, utut adhuc ubera sugentibus, loquimur. Quodsi illis vena brachii sauciari haud posset, lanceolae loco *hirudo*, uti docuimus 8), adplicanda. Febre parum urgente, saltem in *infantibus*, symptomata localia, inflammationem cavitationum nasalium, asperae arteriae, bronchiorum aut inflammationis jam exortae propagationem ad cerebri medullam et pulmonis parenchyma minitanti, *hirudinibus*, pone aures, ad jugulum, et inter costarum, praecipue superiorum 9), interstitia, applicitis, iisque pro re nata repetitis, abiguntur. Simul *nitrum* in vehiculo mucilaginoso ad modicas doses, ne inde tussis aut cardialgia excitentur, propinatur 10).

F 2

Tem-

7) E. c. pro linctu aquae fontis loco, illa sambuci, vel tiliac.

8) Cap. I. §. VI. No. 3.

9) Ob originem arteriarum bronchialium ex intercostali prima, aut ex mammaria interna.

10) Nitri drachmam unam pro libra una decocti salep vel althaeae cum uncia syrupi liquiritiae.

Temperatura cubiculi esto fere similis illi, quam in febribus inflammatoriis commendavimus¹¹⁾. Febribus enim catarrhalibus inflammatoriis aura frigidiuscula (quam SYDENHAM¹²⁾, MONETA¹³⁾ et WEICKARD¹⁴⁾ perperam in omni fere febre catarrhali suaserunt) debitos intra limites accommoda est. Morbus summum gradum attingens, uti *bronchitis*, ad quam tunc spectat, curandus.

C. feb. catarrh. inflammator. insolitum.

4. *Febres* quidem *catarrhales inflammatoriae insolitae* phlebotomiam, aliarum instar exposcunt, at cum majore circumspectione. Docuit nimirum experientia, illarum febrium epidemias, etsi indiciis inflammatoriis stipatas, nihilominus venaesectiones generatim respuisse, ita, ut haec operatio dumtaxat in hominibus robustis ac plethoricis cum fructu locum obtinere potuerit. Alias enim virium summa jactura, haemorrhagiae effrenes et maculae cutis lividae sequebantur¹⁵⁾. Tutior erat usus *cucurbitularum scarificantium* et *hirudinum* circa thoracem. Item *nitri*, *salis ammoniaci*;

11) Cap. I. §. VI. No. 1.

12) Aërem liberum revera in epidemia a. 1675. conduxisse monet. L. c.

13) *Abhandlung, dass die Kälte und das kalte Wasser in Katarrhalkrankheiten die besten Hülfsmittel sind. Warschau 1776.*

14) *Vermischte medicinische Schriften. I. St. Frankfurt. 1778.*

15) SYDENHAM, GRANT, HAMILTON etc. Idem in epidemia a. 1803. observatum est.

moniaci; saltem donec morbus ad statum simplicitatis reductus, naturae committi potuerit.

5. In *febris catarrhalibus rheumaticis* eadem sane methodus medendi, quae affectioni catarrhali respondet, etiam rheumaticae convenit. Interea cum hisce in febribus plurima corporis humani systemata simul patiantur, utut symptomata caeterum mitiori modo decurrant, nihilominus ad *venaesectionem* libenter confugimus. Ea haud indicatâ, aut satis praemissa, *evacuationibus sanguinis localibus* tanto magis indulgendum, quanto propius rheuma ad partes, catarrho laborantes, accedit. Nitro hac sub rerum positione non solum ut auxilio antiphlogistico, sed quoque ad secretionem urinae promovendam indulgendum est. Maxime enim interest in adfectionibus rheumatico-catarrhalibus, ut effectibus secretionis seri morbosae, quam membranae serosae largiuntur, occurratur. Quamobrem etiam fracto impetu inflammatorio, citius quam in simplici febre catarrhali ad *vesicatorium*, prope locum praecipue affectum, confugimus, non omisis tunc et lenibus *diapnoieis* et *diureticis*.

6. Quamvis de cura *februm catarrhalium gastricarum* (et *nervosarum*) sermo alio loco¹⁶⁾ fiet, hic non reticendum, in illis, quae ad insolitas epidemias spectant, *emetica* maxime conducere¹⁷⁾.

16) Cap. IV. §. XXIII. No. 15. — Cap. V. §. XXIX. No. 6.

C. feb. catarrhal. rheumaticae.

Monitum respiciens emetica.

ducere¹⁷⁾. Verum etiam in febribus catarrhalibus gastricis, quae sporadice occurrunt, jucundum est observatu, morbum adpectu tam gravem, elicitu bis terve vomitu, characterem malignitatis (de quo testari videbantur virium jactura, anxietas, jactitatio) amittere, ac postea mitissime decurrere. Emetica praeterea bronchia a pituita liberant, ideoque tussi et respirationi prospiciunt. Juvant itaque quam maxime in infantibus, ad ~~puta~~ sponte ejicienda imparibus. Illis non minus quam adultis optime inservit *tartarus emeticus*¹⁸⁾. Cujus usum si forte diarrhoea impediret, ad *radicem ipecacuanhae* confugiendum¹⁹⁾. Sunt, qui infantibus ad excitandum vomitum *oxymel scilliticum*²⁰⁾ praescribant, — acre sane pharmacum! — *Purgantia* in febre catarrhali plerumque vires infringendo sputaque supprimendo nocere solent. *Eccoprotica* interdum excipi merentur.

7. Nil

17) GRANT, STOLL, WITTWER ll. co.

18) *Pro infante* unius anni. R. Tartari emetici granum unum. Solve in unica una aquae fontis destillatae. Cap. omni octava horae parte cochleare coffeanum, donec vomitus sequatur. *Pro adulto*. Grana tria tartari emetici in tribus aquae destillatae unciiis. Cap. mox dimidium, et post octavas horae partes binis vicibus, quod reliquum est.19) *Infanti* tot grana, quot annos aetatis numerat. Aut syrupi ipecacuanhae cochleare coffeanum ad vomitum usque. *Adultis* a scrupulo ad drachmam semis.

20) Cochleare coffeanum omni quarta horae parte.

7. Nil deterius in cura febrium catarrhalium, Monitum
respiciens
excitantia. quam virium vitalium lapsus genuinus, talis videlicet, qui neque vi diatheseos inflammatoriae, neque effectibus phlogoscos, neque colluviei gastricae primarum viarum adscribendus est. Debilitas videlicet usum *pharmacorum excitantium* exposcere videtur, quae, utut quandoque debilitati occurrant, fere semper pectoris adfectionem aggravant. Hic revera medicus inter Scyllam stat atque Charybdim! — Nimia festinatio ad viam tutam neutiquam ducit. Qua de caussa praemisso amplo *vesicatorio* ad pectus, exhibitoque interne *sero lactis leniter vinoso*²¹⁾, infusoque *salviae*, in reliquis morbum per nychthemera unum alterumve naturae committimus. Re ita non in pejus ruente, spes affulget, fore, ut illa sanationis opus, concesso necessario tempore, absolvere possit: quare eadem continuatur medendi ratio. Contra si in dies malum augetur, quin aucta simul in pulmonibus phlogosis incusari possit, quid regimen, quidque pharmaca pro re nata in cura febrium nervosarum commendanda valeant, experiendum. Ad haec ultima quod attinet, quaestio praesertim circa usum *camphorae*, *moschi* et *spiritus cornu cervi* versabitur. Praeterea ad sputorum rejectionem promovendam *vinum antimonii Huxhami*²²⁾, *sulphur auratum antimonii*²³⁾,

21) GRANT l. c.

22) Pro adulto. R. Aquae salviae unciae septem, Vini

*uli*²³⁾, *radix polygalae senegae*²⁴⁾ praesto sunt. Interdum *cataplasma emolliens* sterno impositum, — nec non *vapores* aquei ope spongiae vel machinae, a MUDGES²⁵⁾ detectae, attracti, adlato scopo respondent. Saepe vero huiusmodi vapores potius calefaciunt, tussimque exasperant.

Monita ad
aegrorum
peculiar-
rem condi-
tionem
respecien-
tia.

8. Difficultates, quae in cura morbi nostri obveniunt, haud raro *peculiari* potius *singulorum aegrotorum conditioni*, quam indoli ipsius febris catarrhalis adscribendae sunt. Illarum communissima est *conditio aegri scrophulosa*. Hoc enim in casu pulmones glandulis lymphaticis induratis ut plurimum referti sunt, quae glandulae irritationis inflammatoriae membranae pituitariae bronchiorum participes factae, felicem morbi exitum retardant, et saepe, proh dolor! orta phlogosi et inde suppuratione (*phthisi pulmonali*) in aeternum impediunt. Funestus iste eventus vix evitandus est, si medicus obstaculum, quod hic in febre catarrhali curanda invenit, pharmacis irritantibus, praecipue iis, quae, ut calomel, peculiarem vim in systema glandularum lymphaticarum exercent, vincere conatur. Contra multum
ab

antimoniati Huxhami drachmam unam. Syrupi rosarum unciam unam. M. D. S. Secunda quaque hora capiat unciam unam.

23) Pro adulto granum semis pro dosi omni tertia hora.

24) Drachmae duae pro colatura librae unius decocti.

25) *Treatise on the medical and expeditious cure for a recent catarrhus-cough.* London 1779.

ab emollientibus, a regimine, et tandem a methodo, quam contra stadium evolutionis acutae phthiseos scrophulosae commendamus ²⁶⁾, obtinetur. Altera communis difficultas metuenda, ubi febris catarrhalis in *hominibus haemorrhoidariis* decurrit. Irritatâ nimirum membrana pituitaria aut parium aut bronchiorum, quid mirum, si congestiones in venis, alioquin morbose dispositis, aut encephali aut pulmonum locum obtineant? Hoc ultimo in casu sub febrium catarrhalium solitarum decursu, pulsum irregularem, alias morientibus proprium, accessus suffocationis, interitum jam jam minantium observavimus. Attamen aegri convaluerunt, exhibitis eccoproticis, hirudinibusque vasis ani admotis ²⁷⁾. Interdum sputum cruentum spontaneum opem fert; at quid, si medicus illi frigore et adstringentibus obviam eat? Responsum in alio operis nostri loco ²⁸⁾, invenitur, ubi etiam effectus febrium catarrhalium in *arthricos, scorbuticos, syphiliticos*, aliosque valetudinarios, una cum cautelis therapeuticis, describuntur. Consolationi inserviet tractatus de *bronchitide chronica* ²⁹⁾, ex quo nimirum patet, *febres catarrhales* interdum

26) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. X. §. XLIV. No. 14.

27) Tali pacto Vilnae senem chirurgum (BiguŹki) febre catarrhali laborantem, et inopinate velut in agone constitutum, ab orci faucibus, socio professore MIANOWSKI eripuimus.

28) l. c. §. XLVII. No. 4. 29) l. c. §. LI. No. 13.

dum in morbum chronicum transire, ad spectu phthisi simillimum, quin tamen pulmonis fabrica laesa sit.

Convalescentia.

9. *Convalescentia* post febres catarrhales, interdum valde lenta³⁰⁾, haud raro superstita *tussi*, somnum ut plurimum impediens, perturbatur. Haec secundum praecepta, catarrho pulmonali apyretico medendi³¹⁾, curanda est. Alias convalescentes ex errore in diaeta aut frigore sat graves imprudentiae luere solent poenas.

CAPUT IV.

De febribus gastricis.

§. XIX.

De argumento generatim.

Definitio.

1. *Febres continuæ*, turbis canalibus alimentarii viscerumque chylopoieticorum insignitæ, exacerbationibus et remissionibus evidentissimis notatæ, ex primarum viarum sordibus, saburris videlicet, bile, pituita, vermibus, originem aut saltem pabulum trahentes, *gastricæ* dicuntur.

2. Prout

30) E. c. post epidemiam a. 1803.

31) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. XIV. §. LXV. 7.

2. Prout in *febris continuis gastricis* aut Divisio. *saburra*, aut *bilis*, aut *mucus*, aut *vermes* scenam ludunt, illae epitheto aut *saburrarium*, aut *biliosarum*, aut *mucosarum*, aut *vermicosarum* insigniuntur. Porro *febres continuas gastricas saburrales* dividuntur in *primarias* et in *secundarias*. Illae febres comprehendunt, ex alimentis, *copia* vel *qualitate* peccantibus, ortas; hae complectuntur febres, in quibus *saburrae* tanquam *effectus morbi* exstant.

3. Ut doctrinam tanti momenti, qualis illa ^{Rerum} febrium gastricarum est, debito ordine exponere ^{ordo.} possimus, de singulis istiusmodi febrium speciebus, ac si totidem distinctos morbos constituerent, locuturi sumus, et quidem primum:

§. XX.

De febre continua gastrica saburrari primaria, ex ingluvie.

1. *Febris continua gastrica* a cibis, vires ^{Definitio.} capacitatemque organorum processui digestionis inservientium copia excedentibus, orta, nobis est *saburrari primaria, ex ingluvie*¹⁾.

2. De hac febre, ab antecessoribus neglecta²⁾, ^{Scriptores.} ut

1) GALL. *Fièvre d'indigestion*. GERM. *Unverdaulichkeitsfeber*. ITAL. *Febbre d'indigestione*.

2) MÉRAT (*dictionnaire des sciences médicales. Articl. Indigestion. T. XXIV.*) ait: „Je n'ai trouvé nulle part réunis en corps de doctrine les différentes recherches, que ce sujet comporte et j'ai pensé qu'il y auroit

ut de peculiari gastricarum specie, jam pridem locuti sumus³⁾. Nuper ejus descriptionem etiam tradiderunt ABERNETHY⁴⁾, WILSON PHILIP⁵⁾, MÉRAT⁶⁾ et ZINK⁷⁾.

Sympto-
MALA.

3. Repleto ventriculo ciborum copia, illius vires et capacitatem excedentium, post horas tres, quatuor, vel quinque, regionis epigastricae tensio et oppressio non sine gravi molestia percipiuntur. Nox fit inquieta et insomniis perturbata. Accedunt nausea, ructus nidorosi, vomitatio, atque seges movet, sibi, dummodo vomere posset, molestiam mox omnem esse evanituram. Quod quidem ut plurimum pro parte contingit,

peut-être quelque utilité de le faire. . . Et: „SAUVAGES qui a classé deux mille quatre cent maladies, ne place en aucun endroit l'indigestion.“

3) In prima hujus operis editione a. 1811. evulgata. P. I. Vol. I. Cap. V. §. LVIII.

4) *Surgical observations on the constitutional origin and treatment of local diseases and on aneurismes. Edit. 5. Lond. 1820. p. 19.*

5) *A treatise on indigestion and its consequences, called nervous and bilious complaints; with some observations on the organic diseases, in which they sometimes terminate. 2. edit. Lond. 1822. (Versio Germanica cum notis M. HASPERO debetur. Lips. 1823).*

6) l. c.

7) *Reflexions sur l'indigestion lues à la société cantonale des sciences naturelles de Lausanne le 4. Février 1824. (Journal complémentaire du dict. des scienc. médicales. T. XVIII. Cahier 69. p. 81).*

tingit, insecuto ciborum corruptorum, in massam acidam, acerbam conversorum, vomitu, ter quaterve repetito. Obveniunt praeterea oris amarus, halitus foetens, lingua muco flavo, praesertim ad radicem obducta, sicca, anorexia, imo ciborum aversio, faciei color a sano recedens, pallidus, subflavus, capitis gravitas, sensusque frigoris, cui calor succedit cum pulsu concitato, pleno, duriusculo, haud raro intermittente, et potus aciduli desiderio. Quodsi aeger sponte non vomuerit, molestia in regione epigastrica in dolorem transit, versus hypochondria, praecipue dextrorsum, extensum. Respiratio fit brevior cum anxietate, lassitudine ac morositate. Nonnulli lipothymiam patiuntur, alii singultum. Abdomen tumet, tenditur. Borborygmi intestina percurrunt, saepe cum dolore. Flatus hydrosulphureti potassae redolentes per anum cum levamine secedunt. Subsequitur plerumque alvi profluvium faeculentum. Quae evacuatio si non accidat, cephalaea, interdum delirium, convulsiones et sopor comparent. Urina ab initio limpida, tandem jumentosa fit, saepeque sedimentum roseum deponit. Plerumque hic morbus spatio nychthemeri absolvitur, alias ad tres quatuorve dies extenditur, relictis haud raro virium et praecipue appetitus prostratione.

4. *Cadavera* hominum, culpâ ingluviei de- Necroscopia-
mortuorum, exhibent ventriculum admodum dis-

tensum,

tensum, hepar nigrescens, horumque viscerum aequae ac encephali vasa, sanguine referta⁸⁾.

Caus. prae-
disponen-
tes.

5. Licet sanissimus homo, ingluvie indulgens, in morbum, de quo agitur, incidere possit; in genere tamen aliqua ad illum requiritur *praedispositio*. Talem praedispositionem inducunt vitium hereditarium⁹⁾, pueritia, senium, graviditas, debilitas, vulnera¹⁰⁾, convalescentia, studia, meditatio, vigiliae, moestitia, ira, taedium, vita desidiosa, abusus liquorum fermentatorum, pharmaca narcotica, atmosphaerae vicissitudines, tempus vernale, aestivum, ventus meridionalis, vulgo *seirocco*, transpiratio suppressa, dentium defectus, neglecta masticatio ex pravo more festinanter edendi, nimis frequens potus cum cibis mixtio, jejunium, pastus inter se nimis dissiti, et hora inconsueta capessiti; vestes arctiores; motus vehemens post assumptos vix cibos; itinera, plethora praesertim abdominalis, alvi obstructio, repetitus emeticorum et purgantium usus; herniae aliique morbi viscerum abdominalium, maxime ventriculi et hepatis.

C. excitantes.

6. Ad cibos, quorum abusus frequentissime febres, de quibus hic sermo est, *excitare* solet, pertinent: carnes durae, pingues, frigidae comestae,

8) MÉNAT l. c.

9) Familiam novi, cujus singula membra indigestionis culpa interiere.

10) ABERNETHY l. c.

stae, praesertim suilla; caseus corruptus; anseres, potissimum illorum jecur; cochleae¹¹⁾, cammari, conghi asteriae, anguillae, arefactus gadus morrhua, aliique pisces sale conditi, fumoque indurati; ova dura; brassica, imprimis fermentata, pinguedine mixta, faseoli, lentes, et caetera hujus generis legumina; fungi, panis recenter coctus; cucumeres, melones.

7. *Caussam proximam* febris gastricae sabur-^{G. proxima.}alis ex ingluvie indagantibus, sese exhibent tum mechanica ventriculi a nimis ingestis distentio, cohibitaque inde reactio¹²⁾; — tum impedita obstaculis ambientibus ventriculi extensio; — tum languor seu inertia fibrarum muscularium hujus visceris ex denegata vi vitali, culpa praesertim paris pncumato-gastrici seu vagi et cerebri; — tum deleta vel perversa secretio succi gastrici; — tum status irritationis ad phlogosin accedens.

8. Quum alii aegrorum commissam intempe-^{Diagnosis.}rantiam celent, aliique, e. c. infantes, de diaetae errore rationem reddere nequeant, diagnosis febris nostrae saepe ardua est. Maxima occurrit difficultas, dum illa alii morbo superaccedit¹³⁾.

Gene-

11) Limaces narcolici quid habere contendit GUILLAUMONT. (FRORIEP's Notizen aus dem Gebiete d. Natur und Heilkunde. 1. B. No. 19. N. I.).

12) Comparari hic potest ventriculus cum vesica urinaria, per lotii retentionem paralytica reddita.

13) Sio a. 1823. Vilnae pro puero, scarlatina laborante, in consilium vocatus fui, qui inopinata vehementissi-

Generatim diagnosis illustratur respiciendo ad modum vivendi variorum civium ordinum, praesertim ad tempora quadragesimae, diesque festos. — Ne ingluvie morbos adscribamus febre quidem et vomitu stipatos, attamen alienae prorsus originis, e. c. encephalitidem, stadium invasionis variolarum, carditidem, gastritidem, enteritidem et hepatitidem! Accidit praeterea, ut diaetae errores paroxysmos latentis cujusdam morbi excitent, quin caeterum ipsi pro principali aegritudine haberi possint, quemadmodum saepius relate ad calculos tum bilis tum urinae experti sumus. Varia porro est febris gastrica saburralis ex ingluvie, pro varia aegroti constitutione. Recens atque in homine caeteroquin sano illa sistit effectum vitii localis ventriculi. Neglecta, praesertim in valetudinariis, vitium locale jam intestina attingit, non sine virium jactura et systematis nervosi turbis. Homines plethorici et haemorrhoidibus obnoxii, ex ingluvie in febrem cum notis inflammatoriis incidunt, socia affectione ventriculi a phlogosi haud aliena, sedemque praecipue circa pylorum figente; illius saltem regio attactum tunc maxime respuere solet.

9. Fe-

ma febre cum vomitu et convulsionibus correptus erat, mortique videbatur proximus. Tota haec scena, facile metastasi ad cerebrum adscribenda, errori in diaeta debebatur. Quippe absolutis indicatis evacuationibus, puer post nonnullas horas denuo ludis indulsit.

9. Febris gastrica saburralis ex ingluvie in ^{Prognosis.} hominibus, qui difficulter vomitum spontaneum patiuntur, aut quorum intestina inertia laborant, si negligatur, aut incongrue curetur, in *febrem nervosam* aut *putridam*, inque *viscerum abdominalium phlogoses* transire solet. Infantes et senes, ad morbos capitis praedispositi, saepius ex illa in *hydrocephalum acutum* et *apoplexiam* praecipitantur. Perseverante diu, aut repetita crebro irritatione gastrica ventriculi et intestinorum ex ingluvie, in pueris, praesertim scrophulosis, ad *mesenteritidem* sternitur via. In gravidis et puerperis, *peritonitis* praesto est. In genere repetiti febris, de qua agitur, accessus, universum corpus labefactant, arthritidi aliisque morbis chronicis, praesertim ventriculi, intestinorum et hepatis ansam praebent. Quodsi febris ex ingluvie morbo cuidam chronico conclamato, puta phthisi pulmonali, superveniat; aegrotus, qui alias vitam adhuc sat diu protrahere potuisset, saepe extemplo e medio tollitur.

10. *Prophylaxis* causas tam praedisponentes ^{Prophylaxis.} quam excitantes respicit. Ad istas enucleandas integer hic requireretur tractatus diaeteticus. Illas in capitibus de bulimo et dyspepsia¹⁴⁾ ad trutinam vocabimus. Sufficiat interea meminisse, infantum voracitatem saepe cum cerebri morbosa conditione nexum habere; alias a prava pendere educa-

14) Part. III. Vol. I. Sect. II.

Frank Prax. I. 1. 2.

educatione, quatenus cibi aut nimis frequenter et copiose, aut nimis raro et parce (quod esum clandestinum post se trahit¹⁵)) porriguntur. Senes (unicam fere, quae ipsis restat, voluptatem temperare nescientes) evitent adire convivia, domique sunt memores, primam ciborum digestionem fieri in patella, alteram in ore.

Cura. 11. Vomitus si sponte contingat, potione aquae tepidae promovendus est. Cui tamen non nimis indulgendum, ne ventriculus, alioqui nimis jam dilatatus, majore distentione prorsus imbecillis reddatur. Quodsi vomitus spontaneus desideraretur, conatus vero vomendi utgerent; ille excitandus foret, fauces aut digiti aut pennae ope irritando. Qui naturalis vomitum eliciendi modus nisi sufficeret, *emetica* tum ex *radice ipecacuanhae*, tum ex *tartaro emetico* praesto sunt. Libenter istis sic dicta *resolventia*¹⁶) praemittimus, quae saepe, una cum repetitis *clysteribus*,
absti-

15) Uxor Comitis d'Antragues (quondam celeberrimi Parisiensium cantatrix St. Huberty) proprium filium respectu diænetico severissime educaverat. — Accidit Vindobonae a. 1800. ut puer fame plus solito vexatus, duas cioccolatae libras invenerit, easque unica devoraverit vice. Potum analogum in stramento, cujus vasculum hansit, quæsit. Vehemens inde oborta est febris non sine vitæ discrimine decurrens.

16) R. Pulveris cremoris tartari drachmas duas, tartari emetici granum unum. M. et divide in sex partes æquales. D. S. capiat omni secunda hora pulverem.

abstinentia a cibis, et potu *limonadae* aut *solutionis cremoris tartari*¹⁷⁾, sola jam morbum debellare valent. Emeticis alioquin hic obstant impotentia absoluta vomendi, graviditas, hernia, haemoptysis praegressa, congestio ad caput aut ad viscera abdominalia, et maxima illorum ad phlogosin proclivitas. Talis proclivitas, nec non febris, notas inflammatorias prae se ferens, *hirudines* circa *regionem epigastricam*, quin imo ipsam *phlebotomiam* exposcerent. Verum aliud est tali pacto singulum quemdam et complicatum casum aggredi, et aliud est methodum antiphlogisticam pro universali auxilio febrium gastricarum ex ingluvie commendare¹⁸⁾.

12. Quam primum saburra deorsum pergit, neque satis evacuatur, *eccoproticis*, e. g. *electuario lenitivo*¹⁹⁾, *sali amaro*²⁰⁾, *tamarindis*, locus est. Nimia alvi evacuatio, praesertim in debilioribus, evitanda. Ubi sordes intestina tenuia

Continua-
tio argu-
menti.

G 2

ad.

17) R. Cremoris tartari, succi citri recentis, ana unciam semis. Sacchari albi uncias duas. Aquae fervidae libras tres. Frigefact. col. D. S. pro potu.

18) CHAUFFANT *observations d'indigestions guéries par traitement antiphlogistique*. (*Journal général de médecine*. Janvier 1824. p. 44).

19) Pro adulto uncia semis tertia quaque hora.

20) Pro adulto: R. Salis amari drachmas decem. Aquae fontis libram unam. Syrupi rubi idaei, vel cerasorum nigrorum sesquiunciam. M. Cap. sex vicibus, interposito semper bihorio.

adhuc occupant, ac febris sine notis inflammatorii est, remedium *radice rhei palmati*²¹⁾ nulum superius. In graviore malo, et quum aeger sedem mali juxta decursum intestini colon indicat, *radix convolvuli jalappae*²²⁾ princeps sistit medicamentum. *Calomel* pro infantibus, et casu, ubi vomitus rebellis usui aliorum eccopropticorum obstaret, reservamus; attamen tali dosi, ut effectus cito sequatur²³⁾. Repetita enim administratio parvarum mercurii dosium, praeter quam quod alvum non satis movent, universo corpori et maxime glandulis mesenterii infensa fit. Vomitus limites excedenti hoc in morbo cum successu quoque *potio* sic dicta *antiemetica* RIVERII²⁴⁾ opponitur. Periculum affectionis secundariae encephali ope *sinapismorum*, superficiei crurum internae appositorum, avertitur. Item *hirudinibus* pone aures et ad tempora admotis.

Monitum. 13. Peractis indicatis evacuationibus, febreque ad finem perductâ, turbac tubi intestinalis inter-

21) R. Tincturae rhei aquosae, aquae foeniculi àà uncias tres. M. D. S. cap. unciam unam omni biihorio.

22) Pro adulto ad grana quindecim pro dosi, tertia quaque hora.

23) Ad grana duo vel tria pro puero, ad grana sex, octo, pro adulto, sine vehiculo, et unica tantum vice.

24) R. Subcarbonatis potassae grana decem. D. ad chartam. R. Succu citri recentis unciam semis. D. ad vitrum. M. et capiat sub actu effervescentiae, idque secunda quaque hora (pro adulto).

interdum nihilominus perseverant. Saepe enim aegri adhuc de doloribus vagis intestinorum, de diarrhoea et de insomniis conqueri solent. Hac sub rerum positione, ast non prius²⁵⁾, *opium rheo* et *mucilaginis* nuptum²⁶⁾ egregie conducit. Quodsi per diarrhoeam revera vires exhaurirentur, *pulvis DOVERI*²⁷⁾ opitulatur.

14. *Convalescens* caute nutriendus, et qui-
dem jusculis avenaceis, hordeaceis. Debilioribus
et exhaustis vinum aqua dilutum, vitello ovi,
saccharo et floribus macis ignis ope nuptum, ex-
hibetur. Fere omnibus modicum corporis exer-
citium, aër rusticanus conducit. Nisi ita cibo-
rum desiderium restituatur, dummodo phlogoseos
indicia desint, apud adultos *vinum absinthii*,
Cypri, *Malacense*, aut *elixir viscerale* HOFF-
MANNI²⁸⁾, aut *decoctum* sive *ligni Quassiae*²⁹⁾,
sive

25) Ζῆνκ (l. c. p. 90.) opium ab initio indigestionis sua-
det scopo excitandae ventriculi inertiae, et restituen-
dae pylori libertatis!! —

26) R. Gummi arabici drachmas tres. Radicis rhei
scrupulum unum. Sacchari unciam semis. Ebulliant
per horae momentum. Colaturae unciam sex adde
laudani liquidi SYDENHAMI guttas decem. M. cap.
omni hora cochleare majus (pro adulto).

27) Ad grana duo pro dosi, cum granis octo pulveris
gummosi. Pro adulto omni tertia hora.

28) Cochleare coffeanum bis, ter de die.

29) Scrupulus ad colaturam unciam sex. Cap. tribus
vicibus.

sive *herbae menyanthis trifoliatae*³⁰⁾ juvat, concesso simul potu coffeae absque saccharo et lacte.

§. XXI.

De febribus gastrico-saburralibus ex alimentis pravae indolis.

Definitio. 1. Febres, ex cibis pravae indolis assumptis, natae, alteram gastricarum saburralium primariae constituent speciem.

Monitum. 2. Et istam doctrinae partem scriptores praeciosos medicae silentio praeterire solent. Praesto quidem est *toxicologia*; ast quam arduum, in illa notiones, huc spectantes, mox invenire, seligere, in ordinem disponere. Saltem hic doctrina, quae attinet ad *fungos, mel, mytilos, pisces, carnes, lac, caseum, farcimina seu botulos venenosos* (quatenus frequentissime febres gastricas gignunt) tradenda¹⁾.

3. Esum

30) Drachma pro colatura unciae sex.

1) De noxis alimenterum adulteratorum in genere legi merentur: J. P. FRANK *System einer vollständ. med. Polizey*. 3. Bd. Mannh. 1804. J. W. KNOBLAUCH *von den Mitteln u. Wegen, die mannigfaltigen Verfälschungen sämmtl. Lebensmittel, ausserhalb der gesetzl. Untersuchung, zu erkennen, zu verhüten und, wo möglich, wieder aufzuheben u. s. w.* Leipz. 1810. 2 Th. CH. H. TH. SCHNEGER *Handbuch zur Selbstprüfung unserer Speisen u. Getränke u. s. w.* Nürnberg. 1810. W. H. G. REMER *Lehrb. d. polizeylich-gerichtl. Chemie*. 2. Aufl. Helmsl. 1812. J. KERNER *das Fettgift u. d. Fettsäure*. Stuttg. u. Tüb. 1822. FA. ACCUM *von d. Verfälschung*

3. Esam *fungorum*, utut modicum, inter-Fungi. dum sequuntur repentina virium prostratio, motus febriles, vertigo, nausea, vomitus, alvi obstructio, abdominis inflatio, sanguinis stillicidium ex ano, sopor, convulsio, tremores et delirium. Haec symptomata non a sola fungorum quantitate, sed ab illorum qualitate venefica, eaque acri et narcotica, pullulare, demonstratu opus non est. Quum vero fungi in genere, quatenus cibum sistunt deliciosissimum, et permultis nationibus necessarium²⁾, ex alimentorum catalogo, uti vir cl. suasit³⁾, excludi nequeant; omnis cura in distinguendos fungos esculentos a venenosis impendi debet. *Suspecti* sunt fungi glabri et tenaces, colore ex livido nigrescente, viridi sive variegato instructi, odorem putridum exhalantes, aut cito putrescentes, per ebullitionem duri evadentes, nec non caule perforato praediti. Quum autem hae notae incertae sint⁴⁾, ad diagnosim,

d. Nahrungsmittel u. v. d. Küchengiften u. s. w. A. d. Engl. v. L. CERUTTI. Lips. 1822. C. G. KÜHN progr. de alimentor. adulterationib. investigand. et severe puniend. Lips. 1822. Ejusd. programmata de venenatis casei comesti effectis. Part. I—IV. Lips. 1824. Ejusd. progr. de venenatis botulorum comestor. effectis. I et II. Lips. 1824.

2) PALLAS *Reisen*. 1. B. p. 30. — *Acta mea clinica*. Annus I. p. 24.

3) TISSOT *traité de l'épilepsie*.

4) JOS. FRANK *Handbuch der Toxicologie*. 2. Ausg. Wien 1803. §. 139. Not. 119. p. 206.

gnosim, quam botanica suppeditat, confugiendum. Inter vulgatissimos fungos *venenosi* sunt: agaricus muscarius, agaricus picco, boletus elegans et phallus impudicus; *esculentis* agaricus deliciosus, boletus bovinus et phallus esculentus adnumerantur. *Pallas* in ea versabatur opinione, *easdem* prorsus fungorum species, pro vario climate, nunc venenosam, nunc innocuam exhibere indolem⁵⁾. — Supra recensita symptomata fungis venenosis ortum debere, ex habito ad anni tempus, repentem morbum, forte in plurimis hominibus ejusdem mensae originis, et conditionem materiae vomitu rejectae respectu intelligitur. Spes sanationis maxime a recta et *extemplo* adhibita medela pendet; neglecto enim parumper morbo, praecipue si aeger conspicuam fungorum venenosorum copiam comederit, parum aut nil vomuerit, raro quis salvatur. Quae quum ita sint, fungorum venditio nonnisi in publico foro, praevio examine expertorum, concedenda. Praeterea descriptiones fungorum tum venenosorum, tum esculentorum inter omnes civium ordines, librorum⁶⁾, inprimis calendariorum ope, propagandae sunt. Etiam extirpatio illorum (vix impetranda) proposita est⁷⁾. — Si vomitus spontaneus

5) l. c.

6) PAULLET *traité historique; graphique, culinaire et médical des champignons*.

7) J. P. FRANK *Syst. d. med. Poliz. 3. B. 1. Abtheil. 4. Abschnitt*.

taneus esum fungorum venenosorum⁸ sequatur, ille per aquam tepidam, melle acetato remixtam, promovendus. Alias emesis aut *pulvere radicle ipecacuanhae*⁹), aut *sulfate zinci*⁹), aut faucium vellicatione et compressione regionis epigastricae sollicitandus. Quodsi veneni jam ad intestina de-
 vecti suspicio haberetur, tunc *tartarus emeticus*, utpote deorsum quoque evacuans, locum obtinere posset. Vomitu autem non amplius indicato, *solutio salis amari* quadrat. Interea *clysteribus* ex aqua subfrigida et aceto non parcendum. Nonnunquam apud homines plethoricos fungi venenosi simul statum inflammatorium excitant, qui *venae sectionem*, *hirudines* circa tempora et regionem epigastricam apponendas, epithemata frigida super caput, et usum internum *acidorum vegetabilium* exposcit. Longe tamen saepius ex veneno, de quo agitur, virium lapsus et systematis nervosi imbecillitas observantur, quo in casu, ut alibi fusius docetur¹⁰), ad *aetherem sulphuricum*, *ammoniam*, et, praesentibus motibus

con-

8) A drachma semis ad scrupulos duos.

9) R. Vitrioli albi puri scrupulum unum. Solve in aquae destillatae uncis quatuor. M. D. S. Illico capiantur duo cochlearia majora, dein, si opus sit, sensim sensimque reliqua remedii pars, donec vomitus sequatur.

10) Part. II. Vol. I. Sect. I. Cap. XXV. de paraphrosyne a venenis. Cfr. Part. II. Vol. II. Sect. II. Cap. XXII. de animi deliquis nervosis.

convulsivis, ad ipsum *opium*, non neglectis frictionibus universi corporis et enematibus ex *nictotiana*¹¹⁾, confugiendum est.

Mel. 4. Jam PLINIUS¹²⁾ alique antiquiorum¹³⁾ animadverterunt, ab *apibus terrestribus* circa Caucasum certis anni temporibus *mel* parari, quod deglutitum effectus veneni exserit. Observatio hujusmodi nuper aliis in regionibus confirmata est a LÜSSER¹⁴⁾, A. DE SAINTE-HILAIRE¹⁵⁾, aliisque¹⁶⁾. *Symptomata* esum mellis hujus generis sequi solita sunt: dolor ventriculi, vomitus, diarrhoea, alia temulentia, vertigo, visiones, subsurditas, lacrymatio, risus convulsivus, delirium, convulsiones, cruciatus linguae, manus sinistrae, extremitatumque inferiorum. *Causa* mellis veneficas qualitates impertiens, in vegetabilibus, quae apibus ad illud colligendum inserviunt, haerere videtur. Hoc sub respectu maxime

11) R. Foliorum tabaci drachmam semis. Coque cum sufficienti quantitate aquae per aliquot horae momenta. Colaturam unciarum octo D. S. pro uno clystere.

12) Histor. mundi. Lib. XXI. cap. 13.

13) DIOSCORIDES, XENOPHON.

14) *Naturwissenschaftlicher Anzeiger der schweizerischen Gesellschaft für die gesamt. Naturwissenschaften.* 11. Jahrg. p. 48.

15) *Relation d'un empoisonnement causé par le miel de la Guêpe Lechequana.* (Bulletin de la société Philomatique. Mai. 1824. p. 74).

16) SMITH, BARTON, AZZARA etc.

xime adcurari solent: *azalea pontica*, *rhododendron ponticum*, *aconitum napellus* et *Lycactonum*, *paullinia australis*, *andromeda mariana*, *kalmia angustifolia*, *latifolia* et *hirsuta*. Morbus quandoque letalis¹⁷⁾; ut plurimum tamen vomitus ope debellatur, magna relicta debilitate. Potus aquae tepidae copiosus ut auxilium uno ore celebratur.

5. *Mytilorum* esum interdum excipiunt febris Mytili. pruritu intolerabili cutis, ejusdemque maculis et tuberculis¹⁸⁾ stipata, cum capitis tumore, nausea, vomitu et delirio. Ipsa *ostrea edulis* a mense Majo usque ad mensem Septembrem non sine febris, vomitus et diarrhoeae, atque colicae periculo comedi potest¹⁹⁾. Legantur de hoc argumento BEHRENS²⁰⁾, J. P. FRAKER²¹⁾, ZANDYCK²²⁾ et PASQUIER²³⁾. Mytili esculenti a no-

xiis

17) LÜSSER l. c. 18) Cfr. Caput X. De urticaria.

19) Plurimas circa hanc rem observationes in extraneis, Venetiis degentibus, atque ostreas anni tempore, publicae venditioni obstante, clam sibi procurantibus, mihi quondam retulit vir egregius, chirurgorumque Italiae decus, FRANCISCUS PAJOLA. —

20) De affectionibus a mytilis. (WERNHOFII opera. p. 491).

21) *System einer vollständigen medicinischen Polizey. Dritter Band. Erste Abtheil. Dritter Abschnitt.*

22) *Observations sur une perturbation aiguë dans les voies digestives occasionnée par l'indigestion des huîtres. (Journ. universel des sciences médicales. IV. année. No. 40. 1819. Août. p. 116).*

xilis nondum satis distincti. Quin immo dubium est, utrum mytili re ipsa venenosi existant, et utrum noxae ex illis non potius a propriis eorum morbis²⁴⁾, an ab animalculis, iis adhaerentibus²⁵⁾, repeti debeant. Saepe mytilorum, licet esculentorum, pernicies peculiari idiosyncrasiae innititur²⁶⁾. Suspectae sunt ostreae praetermodum virides²⁷⁾, in semet ipsas retractae, quarum aqua spurca et praetermodum salsa est²⁸⁾. Illarum venditio mensibus periculosis prohibenda²⁹⁾, et in genere polittiae oculo submittenda. Mytilis veneficis comestis praeter emetica et purgantia, potus *lactis* opponitur. Ostreae tamen in lacte non solvuntur, solvuntur autem in aceto et succo citri³⁰⁾. Alcohol ipsas duras reddit. Ast agitur hic de experimentis, extra corpus humanum factis, ideoque non nisi caute illi viventi applicandis.

6. Ex

23) *Essay médical sur les huitres. (Journ. de pharmacie et des sciences accessoires. Paris 1819. No. 1 — 5. p. 18).*

24) BERRENS l. c. ZANDYCK l. c. (Debilitas ostreae conversionem aquae marinae in substantiam animale[m] impediens!).

25) J. P. FRANK l. c. — (Ostreae continere solent *asteriatem*, *cancrum pinnotherem*).

26) JOS. FRANK *Toxicologie*. §. 146. p. 112. Not. 126.

27) In armamentariis nauticis color ostrearum viridis saepe pendet a *cupro*, quo fundus navium tegi solet. (Ex schedis Patris mei).

28) ZANDYCK l. c. 29) UNZER: *Der Arzt*. No. 90.

30) PASQUIER l. c.

6. Ex consumptione *piscium*, alimenti omni Pisces.
 aevo suspecti³¹⁾, observata sunt, testantibus praesertim CHISHOLM³²⁾ et W. FERGUSON³³⁾: febris, nausea, vomitus, diarrhoea, verbo, hypercatharsis; porro debilitas, vertigo, anxietas, dolores artuum, paralysis et mors. Qualitates venenosas praecipue exhibent: *parca major*, *coracinus fuscus*, *sparus chrysops*, *coryphaena*, *scomber maximus*, *muraena major* et *chepeathrysa*³⁴⁾. Ipsa caro *delphini*³⁵⁾, *percae*³⁶⁾ et *barbi vulgaris*³⁷⁾ pro suspecta habetur. Verum damna ex esu piscium non semper illorum qualitati veneficae directe adscribenda sunt. Saepe enim substantiae narcoticae, quibus pascuntur (e. g. cocculi orientales officinarum), vel lini sive cannabis in piscinis maceratio, vel minerae cupri, in nonnullis regionibus fundum maris occupantes³⁸⁾, accusari debent. Porro pisces morbis obnoxii fiunt, qui illos pro alimento minus reddunt idoneos.

Idem

31) PAW *recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois*. T. III. p. 130.

32) *The Edinburgh med. chirurg. Journal* 1808.

33) *Transactions of the R. society of Edinburgh*. Vol. IX. p. 65.

34) CHISHOLM l. c.

35) *WACHLY Regist.* 22. Aug. 1824.

36) FERGUSON l. c.

37) *Nouveau journal de médecine*. Fevrier 1822. et HUI-
 YLAND's *Journ. der pr. Heilk.* Junius 1824. p. 114.

38) FERGUSON l. c.

Idem accidit tempore, quo sperma emittunt. Alias qualitas nociva non in integro pisce, sed in illius ovis, aut hepate haeret, ut de *cyprino barbo* et de *esoce lucio* fertur³⁹⁾. E quibus singulis colligitur, venditionem piscium clandestinam interdicendam, illorumque mercatus publicos severis legibus esse submittendos. Cura maiorum ex piscibus pravae indolis illi plane similis est, quam in malis, a mytilorum consumptione enatis, proposuimus.

Carnes. 7. Homines, qui *carne*, et praesertim visceribus *animalium morbis contagiosis mortuorum*, atque maxime boum, vaccarum et caprarum, lenitide extinctarum, vescuntur, ut alibi fusius docebimus⁴⁰⁾, non quidem semper⁴¹⁾, sed saepissime in febres incidunt, cum magna virium jactura, pulsu debili, cephalaea, oris siccitate ac foetore, nausea, vomitu, diarrhoea et carbunculis. Carbunculi ejusmodi, uti in Lithuania plus vice simplici vidimus, praesertim ad ventrem, dorsum et extremitates, facie non semper excepta, contingunt, et quandoque ad palmae magnitudinem increscunt. Cavendum, ne cum anthracibus, pestem orientalem comitantibus, confunda-

39) SPIELMANN institutiones materiae medicae. p. 166.

HALLER elementa physiologiae. Tom. VI. p. 211.

40) Cap. XIII. de anthrace et carbunculo.

41) UNZER (*des Arts*) exempla collegit hominum, qui carnes animalium morbis contagiosis interemptorum, absque damno comederunt.

fundantur ⁴²⁾. Caeterum et febris gastrica, de qua agitur, periculo plena est. Nisi enim evacuationes spontaneae aut artificiales mox succurrant, plurimi, potissimum inter juniores, per-eunt. Leges, quae animalia aegrotantia intro-ducere vetant, quae efficiunt, ut ingruens inter pe-cudes lues illico regimini denuntiatur, quaeque macella severissimae inspectioni submittunt, mul-tum sane valent; — verum eminent illae, de quibus hoc sub respectu gens Judaica gloriari potest. Cura morbi supra descripti, nisi vomitus sponte urgeat, *emetico ex radice ipecacuanhae* inchoatur. Fomite mali ad intestina jam per-ducto, *tartaro emetico* locus est. Praeterea mul-tum prodest *decoctum tamarindorum*. Absolutis evacuationibus indicatis, *acidi sulphurici* usus proficiuus est ⁴³⁾. Quodsi morbus *febrem nervo-sam* referat, qua talis curandus ⁴⁴⁾. De peculiari cura anthracum et carbunculorum alio loco dis-cretur ⁴⁵⁾.

8. Narrant Americae medici LEA ⁴⁶⁾, M'CALL ⁴⁷⁾, Lac.

A. Co-

42) Cfr. Pars I. Vol. II. Sect. I. Cap. I.

43) R. Aque fontis libras duas. Acidi sulphurici diluti et mellis, sive syrupi violarum q. s. ad gratum usque saporem. D. S. omni hora vasculum semis.

44) Cap. V. §. XXX. No. 9.

45) Cap. XIII.

46) *The Philadelphia Journal for the medical and physical sciences*. By CHAPMAN. Vol. III.

47) *American Recorder*, No. 20. (FRORIEP Notizen aus

A. COLEMAN et HAINES⁴⁸⁾ de morbo, in provincia Carolina ab initio praesentis seculi obvio, qui ex usu *lactis*⁴⁹⁾ pullulat, stipaturque calore cutis, primum siccae, dein sudore frigido irroratae, pulsu frequente, jam pleno, jam duro, jam parvo et filiformi; siti, nausea, singultu, alvo tarda, inquietudine, sopore, interdum paralyse linguae, et odore cadaveroso. Morbus hic, nisi trium dierum spatio in sanitatem revertatur, morte terminatur. Caussam tum in herba venenosa a vaccis comesta⁴⁹⁾, tum in effluviis terrestribus⁵⁰⁾ quaerunt. Nobis equidem verisimilius esse videtur, morbum ex lienitide vacca^{rum} ortum ducere⁵¹⁾. *Emetica*, *purgantia* (e. gr. infusum *foliorum sen-nae*), *carbo vegetabilis*, *oleum terebinthinae*, et interdum *venaesectio*, qua potissima commendantur auxilia.

Casus. 9. Jam pridem in Germania querelae motae sunt de nociva *casei* indole, a cujus esu sympto-
mata

dem Gebiete der Natur- u. Heilkunde. 5. B. No. 15. p. 233).

48) Ibidem. Vol. IV. (*Rust Magazin für die gesammte Heilkunde. 18. B. 1. St. p. 176).*

49) Vulgo: *Indian Hachy*. (M'CALL, COLEMAN, HAINES).

50) LEA l. c.

51) Hanc ipsam opinionem fovet etiam J. D. BUSCH. (*System der theoretischen u. praktischen Thierheilkunde. 4. B. p. 165).*

mata febrilia⁵²), anorexia, nausea cum debilitate⁵³), vertigo, cephalaea⁵⁴), convulsiones⁵⁵), ventriculi ardor⁵⁶) et inflammatio⁵⁷) observata fuere. Culpa in vaccarum (ex quarum lacte casei nocivi parati sunt) morbis contagiosis⁵⁸), in pabulo venenoso⁵⁹); porro in seminibus narcoticis, loco cumini caseo admixtis⁶⁰), in caseorum putredine⁶¹) et mucore⁶²), in illorum confectione in

52) *Monatliche Zeitschrift für Mecklenburg.* 1793. p. 29.

53) HENNEMANN *Vergiftung durch Käse* (HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. August. 1823. p. 106).

54) A. F. BRÜCKE *Vergiftungsfälle durch den Genuss von Käse.* (HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 1825. July. p. 36).

55) KLOCKMANN *Analyse der Rogauer Käse.* (Mecklenb. Monatsschrift. p. 32 sq.).

56) RUST *Magazin für die gesammte Heilkunde.* 19. B. 2. Heft. p. 298.

57) LEMKE in HUFELAND's Journ. l. c. p. 116.

58) J. P. FRANK *System einer vollst. med. Polizey.* 3. Th. p. 149.

59) LORRY *des aliments.* T. II. p. 177. — GMELIN *Pflanzengifte.* p. 305. (Euphorbia cyparissias, helioscopia esula).

60) J. G. HOYER in Act. acad. nat. cur. Vol. V. obs. 69. p. 260.

61) K. BOERHAAVE *elem. chem.* T. II. p. 84. Lips. — REMER *polizeyliche Chemie.* p. 145. — WEIGEL et WILLICH in PYL's *Magazin für d. gerichtl. Arzneykunde.* 1. B. p. 10. — HENNEMANN l. c. p. 106 — 118.

62) *Fränkische Sammlung.* Nürnberg 1762. p. 40.

in vasis cupreis⁶³⁾, plumbeis⁶⁴⁾, et ligneis ex fago sylvatico⁶⁵⁾, nec non in evolutione acidī oxalici, caseis antiquioribus proprii⁶⁶⁾, locata est. Opiniones vero hujusmodi conjecturis potius, quam experimentis innituntur. Nosmet, reliquis non omnino exclusis, illi vel maxime adhaeremus, quae caseos ex lacte vaccarum, lie- nitide peremtarum, incusat. Methodus medendi generalis in usu *emeticorum* et *purgantium* consistit. Praeterea suspicio latentis veneni, aut narcotici⁶⁷⁾, aut metallici⁶⁸⁾, aut acidī⁶⁹⁾, peculiaria antidota, aliis locis indicanda, exposceret.

Farcimina
seu botuli.

10. Testantur J. KERNER⁷⁰⁾, WEISS⁷¹⁾, alii-
que⁷²⁾,

63) J. H. JÜGLER *Repertorium über das gesammte Medicinalwesen in dem Braunschweig-Lüneburg*. p. 138. — SCHERER's *Beiträge zur Critik der med. Polizey*. 3. B. 2. Samml. p. 109. — RUST l. c. — ORFILA *Toxicologie*. 4. B. vers. Germ. p. 316. — KLOCKMANN l. c. (non invenit).

64) EBELL *die Bleiglasur des irdenen Küchengeschirres*. Hannov. 1794.

65) *Allgemeiner Anzeiger*. 1795. 1. B. No. 26. p. 236.

66) *Versuche u. Beobachtungen über die Klebstäure, das Wurst- u. Käsegift*. A. d. E. von C. G. und O. B. KÜHN. Leipz. 1824.

67) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. de parasyprosyne a venenis. Cfr. P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. de morbo cereali.

68) P. III. Vol. I. Sect. II. Cap. de gastritide.

69) Ibidem.

70) *Neue Beobachtungen über die in Württemberg so häufig vorkommenden tödtlichen Vergiftungen durch den Genuss*

que⁷²⁾, intra breve temporis spatium, in Germania, praesertim in regno Württembergico, ultra ducentos homines ex consumptione *farciminum* seu *botulorum*, fumo induratorum, vehementer aegrotasse, eorumque amplius octoginta obiisse. Aegroti hujusmodi exhibuerunt nauseam, ructus, inquietudinem, pulsus frequentes, faciem rubram, palpebras, praesertim superiores, resolutas, pupillam dilatatam, siccitatem narium et oris, difficultatem deglutiendi, sensum constrictionis ad laryngem et pectus, vocem deletam, raucedinem, tussim, quemadmodum in croup, alvum tardam, et circa morbi finem extremitatum inferiorum rigiditatem. Decursus morbi a duobus ad tres dies. *Cadavera* plerumque rigida cum indicia putrefactionis, visui magis quam olfactui perceptibilibus. Nulla inflammationis indicia in ore et oesophago. Ventriculus quandoque ruber, ita et intestina, ut plurimum aëre distenta. Trachea

H 2

inter.*

geräucherter Würste. Tübing. 1820. — Ejusdem: Das Fettgift oder die Fettsäure u. ihre Wirkung auf den thierischen Organismus. 1822.

71) *Die neuesten Vergiftungen durch verdorbene Würste. Mit Vorrede u. Anhang von Dr. J. KERNER. Karlsru. 1824.*

72) In HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. Mai. 1822. p. 127. — *Allgem. deutsche Justiz-, Kammeral- u. Polizey-Fama. Mai. 1823. — J. H. G. SCHLEGEL Materialien für die Staatsarzneywissenschaft u. prakt. Heilk. 3. B. Meiningen 1824. No. 3.*

interdum pseudomembranam continet. — Causa morbi primum in pulvere piperis cum illo nucleorum cocculi officinarum mixto, e Germaniae septemtrionalis portubus advecto, atque ob minus pretium granorum piperis loco in confectionem farciminum adhibito⁷³⁾, quaerebatur. Dein evolutio *acidi sui generis, quod zooticum*⁷⁴⁾ appellant, ex putrefactione (culpâ confectionis et adervationis malae botulorum) incusata est. Item indoles deleteria pabuli porcorum⁷⁵⁾. Ast nullibi hae immundae bestiae victu selecto gaudent. Porro cur nemo unquam de botulorum Italico-
rum⁷⁶⁾ perniciæ audivit, utpote qui tamen, habita ratione calidioris climatis, corruptelae magis, quam Germanici, obnoxii esse deberent? — Quaecum ita sint, morbum, de quo agitur, aut a pipere, veneno narcotico contaminato, aut a sanguine et visceribus animalium aegrotantium, ad conficiendos botulos adhibitis, derivamus. Alioquin nemo per analysin chemicam vel acidi hydrocyanici vel veneni cujuscumque metallici praesentiam in illis detegere potuit. Dissecta in medio farcimina odorem acidum et caseo corrupto similem exhalant. Cura alia non est, quam quae
jam

73) *Oesterreichischer Beobachter*. 1821. No. 36.

74) *GERM. Fettsäure. Fettgift. Blutsäure. Leichensäure. Thiersäure.*

75) *BUCHNER Toxicologia. Nürnberg 1822.*

76) *Vulgo Salsiccie, Salami, luganighe, zampetti di Modena etc.*

jam supra in morbis ex esu carniū animalium aegrotantium exponebatur. Laudatur praeterea *hepar sulphuris*⁷⁷⁾.

§. XXII.

De febribus gastrico-saburralibus secundariis.

1. Febres continuae gastricae, saburris, qua-Definitio.
tenus morbi effectū, stipatae, *gastrico-saburra-*
les secundariae nuncupantur.

2. Febrium hujusmodi, variis nominibus, Literatu-
plus minus congruis⁷⁸⁾, mentionem praecipue in-
jecerunt: ALEXANDER TRALLIANUS²⁾, FIZESIUS³⁾,
LE ROY⁴⁾, BAGLIVIVS⁵⁾, BURCHARDUS⁶⁾, HEI-
STERUS⁷⁾, QUAESNEUS⁸⁾, RIEDELIUS⁹⁾, J. F. C.
GRIMM¹⁰⁾, S. A. TISSOTUS¹¹⁾, M. STOLL¹²⁾, J. J.

DOEM-

77) A granis quinque ad grana decem in libra aquae.

1) Febri a putredine. Febri mesenterica. Febri acuta
stomachica et intestinalis. Febri stercoralis. — GERM.
Gastrisches Fieber. Saburral-Fieber. GALL. *Fièvre*
gastrique. Fièvre méningo-gastrique. ITAL. *Febbre*
gastrica. Febbre saburratale.

2) Opp. L. XII. Cap. 12. 3) Tract. de febribus.

4) *Second mémoire sur les fièvres.* p. 243.

5) Prax. med. L. I. §. 3. 4.

6) Diss. de febre acuta mesent.

7) Compend. med. pract. Cap. V.

8) *Des fièvres.* Tom. 2. p. 367.

9) De febre intestinali.

10) *Von der Epidemie in Eisenach.* Hildb. 1765.

11) *Avis au peuple. Prem. Partie. chap. 16.*

12) Ratio med. T. II.

DOEMLING¹³⁾, G. A. RICHTER¹⁴⁾, C. A. CARGANICO¹⁵⁾, aliique mox citandi¹⁶⁾.

Sympto-
mata.

3. Febris evolutionem praecedere solent: ciborum desiderium deletum, praepremis aversatio alimentorum ex regno animali petitorum; sensus ponderis ad regionem epigastricam, illius tensio; oris amaror; ructus, nausea, vomituriatio; artuum gravitas, capitisque dolor obtusus. Serius ocus, horis plerumque vespertinis, aeger frigore corripitur, quod calor sat urens cum siti excipit. Pulsus frequens, saepe irregularis. Nox sequitur inquieta, somniis perturbata. Mane symptomata febrilia ita remittunt, ut aegrotus fere apyreticus videatur. Perstant tamen sapor depravatus et ventriculi incommoda. Lingua muco ex albo flavescente obducta. Halitus male olens. Interdum vomitus, reliquias ciborum, materiam acidam amaram, largiens, cum levamine contingit. Item praeviis borborygmis flatus nidorosi et alvus faeculenta secedunt. Nisi morbus accedente sudore, instar ephemeræ, jam solvatur, sub vesperam symptomata febrilia rursus invalescunt. Urget praeterea anxietas. Noctu quandoque leve delirium et epistaxis. Urina pauca, jumentosa, aut cum

13) Diss. sistens morborum gastricorum acutorum pathologiam. Wurceburgi 1797.

14) *Darstellung des Wesens, der Erkenntniss u. Behandlung der gastrischen Fieber.* Berlin, 1811.

15) Diss. de febre gastrica. Halae 1821.

16) §. sequente de febre biliosa.

cum sedimento roseo. Lingua arescit et nigro muco obducitur. Remissio horis matutinis minor quidem praecedente, sed nihilominus admodum conspicua. Eadem ratio est sequentis exacerbationis vespertinae. Sic morbus ad quartum aut septimum usque diem continuo invalescendo pergit; quo tempore, supervenientibus interdum maculis peticularibus, aut in gastritidem vel enteritidem, aut in febrem nervosam, praecipue putridam transit, aut, accedentibus evacuationibus salutaribus, declinare incipit. Remissiones enim fiunt longiores et magis perfectae, exacerbationes autem breviores ac mitiores. Praesertim lingua ad margines, muco globulorum sub forma secedente, purificatur, minusque siccescit. Somnus quietus aliquot horarum aegrotum recreat, et sic ad perfectam usque convalescentiam.

4. Praedisponunt ad febres hujusmodi: igno-
ta annua constitutio, sese imprimis tempore ac-
stivo et autumnali, in locis uliginosis humidis-
que, inter plebem male nutritam, leviter vestitam
laboribusque obrutam manifestans, attamen nec
reliquis civibus, potissimum qui studiis, vigiliis,
Veneri, Bacchoque indulgent, moeroreve con-
fecti sunt, parcens.

5. Causae vix commemoratae ad morbum
quoque *excitandum* sufficiunt. Is eo certius
evolvitur, si causae alias febres inflammatorias,
rheu-

Causae
praedispo-
nentes.

Causae
excitan-
tes.

rheumaticas, catarrhales et nervosas excitare solitae, item vulnera, concurrant.

CAUSAE
proxima.

6. Quibus singulis rite perpensis intelligitur, febrem, de qua sermo est, non directe, praecedentium instar, e saburris nasci, sed saburras praeviae universi corporis labefactioni ortum debere. Sistunt igitur hic saburrae effectum morbosum. Hoc autem non impedit, quominus rursus ut causa morbi agere febremque excitare aut illi pabulum saltem praebere possint. Quod quidem varia ratione fieri verisimile est. Etenim sordes primarum viarum, quae antea juxta sanitatis leges insontes latitabant, ingruente morbo, eoque vires vitales infringente, nocivae fiunt. En conversio illarum in massam fermentantem et putrescentem, ventriculi et intestinorum superficiem irritantem, universumque corpus, alioquin labefactatum, magis magisque laedentem. Alias suspicari licet, saburras maxima ex parte *effectum morbosae secretionis* sistere. Observavimus nimirum saepius, sub initio plurimarum febrium per purgantia, utut fortiora pluriesque repetita, nil nisi serum eliminatum esse; sub finem vero earundem febrium, licet hi ipsi aegrotantes per totum morbi decursum alimenta solida nequaquam sumserint, enormem plane saburrarum copiam sponte fuisse evacuatam. Quod si fontem istiusmodi secretionis saburrarum scisciteris, candide ignorantiam fatebimur. Fortassis ille,

ille, praeter bilem, in vasis sanguineis tubi alimentarii quaerendus? Id saltem in febribus inflammatoriis inque aegrotis, plethora abdominali laborantibus, contingere videtur. Alias (praecipue in febribus rheumaticis) interna tubi alimentarii superficies vices suppressae perspirationis cutaneae, sudorem intestinale largiendo, agere posset. In febribus catarrhalibus, ex irritatione membranae pituitariae secretio morbose mucii faeculenti expectanda est. Haec singula magis sane innotescerent, si *meconii* origo propius nota foret. Etenim meconium, quatenus in ipsis foetibus acephalis obvenit, originem extrinsecam agnoscere haud potest. Postremo si crassum sedimentum, quod urinae sub finem multarum febrium exhibent, perpenderit, materialium similium secretionem in tubo quoque intestinali locum habere posse, non miraberis. Forte istam ipsa purgantia et resolventia, sub febrium decursu porrecta, stimuli, quo agunt, ope eliciunt.

7. Ut ut sit, patet, febres gastricas saburrales *Diagnosis.* secundarias in dubium vocari nequaquam posse. Eo majori jure de *complications saburrali* multarum febrium non est dubitandum. Talis complicatio arguitur, febres inflammatoriae rheumaticae et catarrhales ubi a consueto decursu deflectunt, ubi debito tempore per crises non solvantur, ubi consuetis auxiliis minus cedunt, ubi insolita inquietudine stipantur, ubi exacerbationes
prae-

praeter modum conspicuas exhibent, ubi evacuationes alvi spontaneae magnum levamen adferunt, et ubi turbæ imi ventris obveniunt. Haec indicia longe securiora sunt, quam symptomata gastrica, quorum fallacitatem prae ceteris J. P. FRANK patefecit¹⁷⁾. Hoc ipsum argumentum in sequenti paragrapho ulterius prosecuturi sumus.

Prognosis
et cura.

8. Ab affectionibus gastricis saburralibus secundariis neglectis gravia mala timenda esse, e plurimis hujus tractatus locis sponte elucet. Maxima pericula imminet, dum naturae, salutare evacuationes sponte molienti, medicus incongruis pharmacis obstat. Interea etiam incauta artis molimina in saburris eliminandis sua adducunt discrimina. Quamobrem summa cum circumspeditione est incedendum, potissimum a morbi principio. Nisi enim de vitio saburrali evidentissimae adsint notae, evacuationes eo cautius instituendae, quo recentior febris. Non enim perperam veteres docuerunt humores, adhucdum crudos, non esse evacuandos. Hoc tamen praeceptum magis purgantia, quam emetica respiciebat. Interea utrumque evacuationis genus, quo usque viscera abdominalia phlogoseos periculum experiuntur, aut natura salutaria conamina per alias vias, puta epistaxin, urinam et sudorem, molitur, nocet, de quo argumento mox plura.

§. XXIII.

17) Prolus. academ. de larvis morborum biliosis (delectus opusc. medicor. T. I.).

§. XXIII.

De febribus gastrico-biliosis.

1. *Febris continua gastrica*, secretione mor- Definitio.
bosa bilis insignita, *biliosa* audit¹⁾.

2. Praeter auctores, supra allatos²⁾, de febre Literatu-
gastrico-biliosa scripserunt: BALLONIUS³⁾, J. POP-
FIL⁴⁾, STAHL⁵⁾, KOCKER⁶⁾, CARTHEUSER⁷⁾, J.
MOULTRIE⁸⁾, WILSON⁹⁾, J. WILLIAMS¹⁰⁾, JUCH¹¹⁾,
A. TILLET¹²⁾, S. A. TISSOT¹³⁾, ZIMMERMANN¹⁴⁾,
NUNN¹⁵⁾, STATHOUDES¹⁶⁾, W. N. A. LEUTH-
NER¹⁷⁾,

1) *Synon.* Synochus biliosa. Febris cholericæ. Febris hepatica. GALL. *Fièvre bilieuse.* GERM. *Gallenfieber.* ITAL. *Febbre biliosa.*

2) §. XXII. No. 2.

3) Opp. omn. Epidem. Lib. II.

4) *Giftige epidemische Hauptkrankheiten der pestilentialischen Gallenfieber.* Leipz. 1623.

5) Diss. de febribus biliosis. Hal. 1701.

6) Diss. de morbo epidemico a. 1719. Lugd. Bat. 1720.

7) Diss. de febre biliosa. Francof. 1746.

8) Diss. de febre maligna biliosa Americae. Edinb. 1749.

9) Diss. de febre biliosa Indiae orientalis incolae infestante. Edinb. 1750.

10) *Essay on the bilious fever.* Lond. 1752.

11) Diss. de febribus biliosis. Erford. 1753.

12) *Historia epidemiae biliosae Lausannensis a. 1755.* Lausan. 1758.

13) De febribus biliosis. Lausan. 1758. — *Lettres à Mr. ZIMMERMANN sur l'épidémie courante.* 1765.

14) In *Hannövr. Magazin.* 11. B. p. 305.

15) Diss. de febre biliosa putrida. Erf. 1765.

16) Diss. de febre biliosa. Lugd. Bat. 1765.

NER¹⁷⁾, PH. GEORG SCHROEDER¹⁸⁾, O. NERUCCI¹⁹⁾,
 OPIZ²⁰⁾, SCHMID & BELLIKON²¹⁾, REDER²²⁾,
 ELSACKER²³⁾, G. A. BENELLI²⁴⁾, MAATJES²⁵⁾,
 BEIREIS²⁶⁾, L. L. FINCKE²⁷⁾, J. J. PLANER²⁸⁾,
 A. L. SANTHESSON²⁹⁾, S. A. MORAAS³⁰⁾, MÜL-
 LER³¹⁾,

17) *Beobachtungen und General- sowohl als Special-Cur-
 methode hitziger Gall- u. Faulfieber. Nürnberg. 1766.*

18) *Diss. de amplitudine generis febrium biliosa. Got-
 tingen. 1766. V. ejusdem Opuscul. Nürnberg. edita 1778
 — 1779.*

19) *Historia febris epidemicae Senensis 1766 — 67. Sen.
 1767.*

20) *Geschichte einer Epidemie gallichter, faulender und
 bössartiger Fieber. Berlin und Leipz. 1772.*

21) *Von Gallenfiebern. Augsb. 1772.*

22) *Diss. epidem. febr. biliosae putridae Mellerstad. Erf.
 1773.*

23) *Specimen medicum primum febrem remittentem bi-
 lioso-putridam Antverpiae grassatam exhibens. Ant-
 verp. 1774. V. SCHLEGEL theses patholog. Vol. I.*

24) *Discorso apologetico delle febbri biliose. Bologna 1775.*

25) *Diss. de febre biliosa autumnali, maximo Zelandica.
 Groningae 1779.*

26) *Diss. de febribus biliosis tertianis continuis. Helmst.
 1780.*

27) *De morbis biliosis anomalis occasione epidemicae,
 cujus historia praemissa est ab ann. 1776 — 80 obser-
 vatis. Monast. 1780.*

28) *Febris biliosae putridae, cum dysenteria epidemica
 per partem territorii Erfurdensis a mens. Jun. usque
 Dec. 1775. grassantis, brevis historia. (Act. acad. Mo-
 gutinae 1777. p. 232).*

29) *Gallaktig feber, beskrioven, i anledning af en farsot*

LER³¹⁾, ROGERS³²⁾, TH. G. SCHROEDER³³⁾,
STRACK³⁴⁾, KNAUS³⁵⁾, ROERHARD³⁶⁾, BECKER³⁷⁾,
GESENIUS³⁸⁾, J. TH. GUIDET³⁹⁾, G. BLANE⁴⁰⁾,
BARFORTH⁴¹⁾, RUSH⁴²⁾, ECKNER⁴³⁾, J. C. FLACHS-
LAND⁴⁴⁾,

i Aby under Aug. och Sept. månader, År 1778.
Swenska Vetensk. Acad. Handl. 1779. p. 134.

30) *Kort Bericht van de . . epidemische Gal-Koortsen, benevens eene tienjaarige (1770—1780) lijst der gedoopten en gestorvenen binnen en onder de jurisdictie van Sommeldyk. — Verhandl. van de Correspondentie Soc. — in'e Hage. I. Deel. 2. Afdcel. a. p. 221. Cfr. ibid. p. 894.*

31) *Diss. de febre biliosa. Argent. 1782.*

32) *Diss. de febre biliosa Moldaviensi. Regiomontii 1784.*

33) *Historia febris bilioso-pituitoso-putridae a. 1783 et 1784. Güt. 1784.*

34) *Diss. de febre biliosa. Mogunt. 1784.*

35) *Diss. de morbo bilioso-mucoso a. 1783—84. Stuttg. 1785.*

36) *Diss. de febre biliosa putrida. Helmst. 1786.*

37) *Versuch eines Unterrichts in der im J. 1786 epidemisch herrschenden Krankheit. Heidelberg 1787.*

38) *Ueber das epidem. faulichte Gallenfieber 1785. Leipz. 1788.*

39) *Diss. de febribus biliosis. Lausan. 1788.*

40) *Beobachtungen über die Krankheit, der Seclente. A. d. E. Marb. 1788.*

41) *Diss. de febre biliosa nautas affligente. Lundiae 1790.*

42) *Inquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting fevers in Pennsylvania. (Transact. of the society of Philadelphia et Med. Comm. von Edinb. II. Dec. 1. B. p. 295). Remarks upon bilious fevers. (Med. observ. by a society of physicians in London. Vol. V.*

LAND⁴⁴), BREHMER⁴⁵), G. CH. BONHARD⁴⁶),
 BUEL⁴⁷), SPALDING⁴⁸), W. CURRIE⁴⁹), R. PEAR-
 SON⁵⁰), J. SCHNIEG⁵¹), W. WHITE⁵²), JANSEN⁵³),
 RICHERAND⁵⁴), MACÉ⁵⁵), BOURGUENOD⁵⁶), BA-
 BAD⁵⁷),

p. 32). Cfr. HUTELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 22. B.
 4. St. p. 214.

43) *Beiträge zur Geschichte epidem. Gallenfieber.* Leipz.
 1790.

44) *Ueber eine gallicht-faule Epidemie.* Frankf. 1792.

45) *Diss. de febre biliosa.* Jenae 1794.

46) *Ueber ein epidem. Fieber gallichter Art, in und um
 Darmstadt 1794 herrschend.* Frankf. 1795.

47) *Account of the bilious fever and Dysentery in Mas-
 sachusetts* 1796. (*Medical repertory.* Vol. I. No. 4.
 art. 1.).

48) *On the bilious malignant fever which prevailed in the
 country and adjacent to Dartmouth college* 1798. (*Me-
 dical repository.* Vol. III. No. 1. Art. 2.).

49) *Observations on the causes and cure of remitting or
 bilious fever.* Philadelphia 1798.

50) *Some observations on the bilious fever of 1797—99.*
 London 1799.

51) *De febribus biliosis.* Norimb. 1801.

52) *Account of the bilious fever as it appeared in Bath.*
 Lond. 1802.

53) *Diss. de febre biliosa.* Erford. 1804.

54) *Nouvelles recherches sur la fièvre bilieuse (meningo-
 gastrique).* (*Mém. de la soc. médic. d'émulation.* an
 VI. p. 22).

55) *Sur les fièvres meningo-gastriques.* (*Journ. de méd.*
continué. T. 17. p. 163).

56) *Diss. de febribus biliosis.* Montpel. 1808.

BAD⁵⁷), WENDELSTADT⁵⁸), A. DENMARK⁵⁹), BURNETT⁶⁰), MELI⁶¹), aliique⁶²).

3. Feruntur homines sanissimi derepente in Symptomata.
febres biliosas incidisse⁶³). In genere vero, quibus imminet hic morbus, cibum fastidiunt, screatores fiunt (salivam interdum amaram spuantes⁶⁴)),
animo

57) *Epidémie des fièvres bilieuses, qui ont régné dans la ville de Roanne (Loire) et dans les environs, pendant l'année 1811. (Partie 1. 2. Anal. de la soc. de méd. pratique de Montpellier. T. 28. p. 267. 339).*

58) In HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1812. October.

59) *Observations on the mediterranean fever. (Medico-chirurgical transactions. Vol. 6. p. 296).*

60) *A practical account of the fever commonly called the bilious remittent . . . : Comprehending the history of fever in the mediterranean fleet during the year 1810 — 1813. Lond. 1814.*

61) *Sulle febbri biliose. Milano 1822. Et: Su la condizione patologica delle febbri biliose. Nuovi fatti. Milano 1824.*

62) *Breslauer Sammlung 1717. II. p. 36. 1720. I. p. 86. II. p. 378. — Von den Gallenfiebern, die im Monat Julius, August und bis in die Mitte Septembers des J. 1775 (in Schlesien) geherrscht haben. V. Oekonom. Nachricht. der Gesellschaft in Schlesien. 4. B. p. 112. — Comment. Bonon. T. VI. p. 67. — FR. G. SCHWEIGER-SEIDEL disp. de febrium aestivarum origine atque natura. Hal. 1824.*

63) MELI (Sulle febbri biliose p. 29.) epidemiam describens, quae anno 1819—20 grassabatur in pago Castello sopra Ticino.

64) Idem ibidem.

animo et corpore languent, et, licet somnolenti sint, noctes tamen, agrypnia, somniis terrificis, ac faucium constrictione⁶⁵⁾ vexati, transigunt. Post unum alterumve nycthemerum, horis ut plurimum pomeridianis, praeviisque crebris oscillationibus *frigus*, plus minus intensum, quandoque socio tremore⁶⁶⁾, ingruit: sequitur *calor* ardens, cum inquietudine, anxietate et respiratione anhelosa. *Pulsus* modo frequens, plenus, durus; modo obscurus⁶⁷⁾, intermittens⁶⁸⁾; modo lentus et profundus⁶⁹⁾. *Sitis* inexplebilis, cum potus aciduli desiderio. Qui plus, quam par est, bibunt, graves non solum ventriculi molestias, sed et ipsum interdum animi deliquium⁷⁰⁾ experiuntur. Caput plerumque acute dolet, oculi lacrymis, quandoque flavescentibus⁷¹⁾, innatant, splendentque; genae rubore profundo circumscripto notatae; cutis ad latera nasi et oris pallida, ex flavo viridescens. Plurimis aegrotis sanguis e nare, praesertim dextra, jam guttatim, jam largiori flumine manat. Haud paucis labium inferius et lingua tremunt. Sapor oris valde amarus; halitus foetens; lingua muco albo, flavo, nigrescente obducta, saepe, saltem in medio, sicca,

⁶⁵⁾ Idem ibidem. ⁶⁶⁾ Idem ibidem.

⁶⁷⁾ GALEN. method. medend. Lib. II. c. 3.

⁶⁸⁾ FERREIN *histoire de l'académie de Paris*.

⁶⁹⁾ MELI ibid. ⁷⁰⁾ Idem ibid. p. 37.

⁷¹⁾ Idem ibid. (Aegrotus iste simul objecta, quot quot erant, quasi flavo colore tincta essent, cernebat).

sicca, scabra, cum sulcis longitudinalibus. Regiones, epigastrica, hypochondriacae, praesertim dextra, tensae, saepeque attactum non ferentes. Nausea, ructus, vomituritio, vomitus. Materies rejecta biliosa, herbacea, aeruginosa, vel nigrescens, acerrima, et faucium ardorem relinquens. Haud raro universum abdomen expansum est. Adsunt praeterea borborygmi, dolores vagi ventris. Alvus modo segnis, modo laxa, biliosa, stercoracea, foetidissima. Urina jumentosa, crassa, flava crocea. Permulti artuum persentiunt dolores. Cutis modo sicca, modo sudore irrorata, nunc universali flavedine obducitur, nunc maculis flavis⁷²⁾ notatur. Interdum flavedo solum ad faciem aut ad manus circumscripta est. Nonnunquam cutis peticulis morbillos aemulantibus, aut urticaria, aut erysipellate obsidetur. Sunt, qui sensum formicationis experiantur⁷³⁾. Morbus horis matutinis mitius affligens, versus solis occasum valdopere exacerbatur, imo noctu deliriis aut sopore stipari solet. Plerumque is protrahitur ad septimum, decimum, decimum quartum diem. Crisis absolvitur sudore universali, vomitu (cruento non excepto⁷⁴⁾) diarrhoea, epistaxi, metrorrhagia, fluxu haemorrhoidali. Alias malum transit in hepatitidem, dysenteriam, febres tam intermittentes, quam nervosas, atque in phle-

72) Idem ibid. p. 49.

73) Idem ibid. 74) Idem ibid.

Frank Prax. I. 1. 2.

phlebitidem, quibus binis ultimis in casibus aegroti haud raro, saevientibus meteorismo, singultu et deglutionis difficultate, succumbunt.

• Necroscopia.

4. Cadavera, post istiusmodi morbos quondam a nobis perlustrata, offerebant: inconsuetam capillorum flacciditatem, cutim universam flavam, hepatis volumen auctum, illius colorem et substantiam modo pallidiorem et flaccidiorem, modo magis rubram magisque compactam, vasa jecinoris sanguinea et bilifera dilatata, cystidem felleam turgidam et intestina flatibus expansa, interdum gangraenosa. Recentiores cadaverum sectiones majori cum industria susceptae, et, ni fallimur, aequali ingenuitate descriptae, patefecerunt: *textum adiposum cutis* tumidulum a sero flavescente ⁷⁵⁾; — *hepar* magnum, vasa illius lymphatica plurima ob acquisitam flavedinem solito evidentiora ⁷⁶⁾; ductus biliferos bile tenaci repletos ⁷⁷⁾; — *vesicam felleam* volumine auctam, membranis ejus incrassatis ⁷⁸⁾; — *systema venarum abdominalium*, praesertim meseraicarum, cruore

75) „L'apparato adiposo della pelle tumefatto da un siero giallognolo.“ (MELI l. c. p. 109).

76) „Erano rendute in parte visibili (i vasi linfatici) per l'umor croceo, da cui si trovavano iniettati.“ (MELI l. c. p. 110).

77) „I condotti biliari ravvisavansi zeppi di tenace bile.“ (MELI l. c.).

78) MELI l. c.

cruore admodum turgidum⁷⁹⁾, et inflammatum⁸⁰⁾; — *venam portarum*⁸¹⁾ voluminis duplo majoris⁸²⁾, parietibus illius incrassatis⁸³⁾, partim

I 2

ex-

79) „Non può ridirsi come turgido apparisse a primo aspetto il sistema dei capillari venosi alla superficie di tutti gli involucri e di tutte le viscere di questa cavità; e molto maggiormente poi il turgore e l'ingrossamento dei più conspicui ramoscelli venosi che si vedevano scorrere increspati e serpeggianti, massime pel mesenterio; in alcuni luoghi dir si potevano varicosi a segno da essere presso a scoppiar.“ (MELI l. c. p. 29).

80) „... apriamo or questo or quello dei vasi venosi del mesenterio, o degli altri spettanti ai diversi visceri del basso ventre e tutti ci presentarono in vario grado orme di flogosi; cosicchè non fu dubbio di ammettere l'universale flebite del sistema addominale de' vasi a sangue nero.“ (MELI l. c. p. 31). Et: „La splenica, la grande e picciola mesenterica, i vasi brevi, la coronaria stomatica, le gastro-epiploiche, le pancreatiche, e che so io, notevolmente accresciute di volume ed indurate sì, che a prima giunta scambiavansi con le arterie. Aperta or questa or quella, ed esaminate la interna membrana, trovossi dappertutto un manifesto stato di flogosi.“ (l. c. p. 33. 34).

81) „A molta più profonda flogosi dimostrò aver soggiaciuto il tronco della vena porta ventrale.“ (MELI l. c. p. 34).

82) PROST médecine éclairée par l'observation et l'ouverture des corps. Articl. 63. p. 190. — „Cresceva cotale stato delle vene addominali coll' incrassare dei rami, cosicchè giunti ad iscoprire la porta ventrale, ci si presentò essa al di là del doppio del naturale suo calibro.“ (MELI l. c. p. 29).

exulceratis⁸⁴⁾, tunicà internà rugosà⁸⁵⁾, cum vestigiis pseudomembranarum⁸⁶⁾, et cavitate sanie⁸⁷⁾ atque coagulo⁸⁸⁾ repletis; — *venas hepaticas*

83) „*Ne questo dumento di volume era dovuto alla copia del sangue che vi era accorso di nero colore, ma sì bene al notevolissimo ingrossamento della membrana cellulosa e della fibrosa, come pur dello stato lamelloso che fra loro le unisce.*“ (Idem, ibid.).

84) „*E non solamente la membrana interna della porta ventrale era corrosa in più luoghi e distrutta, ma sì bene la fibrosa ulcerata in vari suoi punti.*“ (Idem, ibid.).

85) „*La vena porta ventrale straordinariamente ingrossata mostrava nel suo interno delle rilevanti rughe frangiate di morbosa generazione, i cui intervalli riempiti erano da una specie di albumina concreta.*“ (MELLI l. c. p. 39. Cfr. p. 34).

86) „*Uno stato pseudo-membranoso emergeva dall'interno contorno del seno della porta epatica.*“ (Idem, ibid.).

87) „*... Dappertutto gemeva dalle boccucce de' rami della vena porta putrescente sanie.*“ (MELLI l. c. p. 30).

88) „*Vi avevano poi per entro a questo tronco venoso tenaci concrezioni di crassamento sanguigno a foggia di polipi.*“ (MELLI l. c. p. 29). — „Dissecto venae portarum systemate, magna animi nostri admiratione, alium conspeximus polypum, qui ipsius venosi systematis vel minimas ramificationes mirum in modum comitabat; parietes vero venosi rubescabant valde, et praegressae in ipsis phlogosi fidem satis amplam faciebant, quod jam a sagaci praecel. pro-

ticas phlogosi correptas⁸⁹); arterias ejusdem nominis normales⁹⁰); — *venam cavam* striis rubris insignitam⁹¹), et concrementis refertam⁹²); — *cordis auriculam dextram* cum concremento polypo⁹³), et *cerebri* vasa sanguine distenta⁹⁴).

5. Quamvis febrium biliosarum epidemiae visae sint, quae omnibus civium ordinibus aequali ratione infensae erant⁹⁵), hominesque fortes prae debilibus eligebant⁹⁶); nihilominus fateri oportet, febres illas praesertim plebi egenae, militibus, rusticis, aliisque hominibus labore exhaustis insidiari. Grassantur maxime in regionibus tropicis et paludosis, aestateque praefervida.

6. Epi-

fessoris mente vatcinatum erat.⁹⁷ (Hist. morbi ex inst. clinico cl. BRERA. Vid. MELI l. c. p. 21).

89) „*Le vene epatiche apparvero infiammate, e nell' interno alcun poco rossegianti.*“ (MELI l. c. p. 31). Et: „*pure rosseggiante se ne vide la comune membrana loro.*“ (l. c. p. 39).

90) „*Niente di alterato all' opposto compariva nella tessitura delle arterie del medesimo nome.*“ (Idem, ibid.).

91) „*Cava ascendente con striscie prolungate e con areole rosse nella sua comune interna membrana.*“ (MELI l. c. p. 33).

92) „*Ipsam etiam cavam inferiorem cultro diligenter secuimus, et hic quoque loci rudimenta valde conspicua massae polyposae deteximus.*“ (BRERA l. c. p. 21).

93) BRERA ibid. 94) MELI l. c. p. 33.

95) MELI *delle febbri biliose* p. 44.

96) Idem, ibid., p. 42.

Causae
praedispo-
nentes.

Causae
excitantes.

6. Epidemica seu annua constitutione febribus biliosis favente, hae excitantur potissimum curis, moerore, ira, violentiis externis, praecipue capiti illatis; aura frigidiuscula nocturna, corpori a diurnis caloribus aestuanti, ob vestium debitarum defectum, admissa; corporis motu et potu aquarum corruptarum⁹⁷⁾, eoque nimio liquorum fermentatorum, nec non erroribus in diaeta. Victu animali prae vegetabili, aut fructuum horaeorum defectu, maxime febres biliosae excitari, vi hypothesis creditum est. Quodsi enim res revera sic sese haberet, cur divites, quorum mensae carnosae ferculis abundant, prae pauperibus, qui potissimum vegetabilibus vescuntur, ab isto morbo longe minus corripitur? Cur in regionibus septentrionalibus, quae fructibus horaeis fere orbatae sunt, istae febres rarius affligunt? — Contagii febres biliosae videntur esse expertes.

Causa
proxima.

7. Multum disceptatum est, utrum *causa proxima* febrium biliosarum in bile, quae in sanguine praesto est (*Polycholia*), an solum in illius nimia secretionem aut absorptionem locata sit. Bilem qua talem in sanguine praexistere, experimen-

97) „Dum aestivis sub caloribus movere saepe coguntur belli duces, et imprimis, si simul adsit aquae penuria, integri aliquando exercitus his febribus affliguntur.“ (SWIXTEN comment. T. III.).

rimenta, a PARMENTIER et DEVEUX⁹⁸), ROOSE⁹⁹), DOEMLING¹⁰⁰), aliisque instituta, negant; eandem vero absorberi, exemplum icteri probabile reddit. Quum autem icterus saepissime sine febre obveniat, illius exemplum aequo pacto docet, ex bilis absorptione febrem necessario non aequi. Verisimile igitur est, febrem biliosam nec a polycholia, nec a resorptione bilis originem trahere, bilisque in ea febre proventum nil aliud esse, quam effectum morbosae secretionis. Hoc posito, altera accedit quaestio, scilicet: *quaenam sit ipsius bilis morbosae secretionis causa?* Recentissimus de febribus biliosis auctor¹⁰¹) illam in inflammatione systematis venarum abdominalium, praesertim portarum, quaerendam esse existimat, quae opinio per anatomiam pathologicam confirmari utique videtur. Interea re probe perpensa, apparet, necroscopiam duntaxat docere, homines, qui ex febribus biliosis male curatis moriuntur, inflammationem venarum abdominalium exhibere. Transitus vero istiusmodi febrium biliosarum in phlebitidem neutiquam probat, jam ipsas febres biliosas phlebitidis abdominalis progeniem esse. Et cur demum unius bilis aucta copia statum inflam-

98) REIL's *Archiv f. Physiologie*. 1. B. 2. Hft. p. 101.

99) *Physiologische Untersuchungen*, Braunschweig 1796.

100) *Diss. sistens morborum gastricorum acutorum pathologiam*. Würceb. 1797.

101) MEHL opp. c.

inflammatorium partium secretioni illius dicatarum exposceret; quum secretio sudoris, urinae, salivae, absque cutis, renum et parotidum phlogosi locum habere possit? Statum autem inflammatorium hepatis aliorumque viscerum abdominalium *interdum* conspicuam in febribus biliosis aliisque gastricis scenam ludere, nova non est observatio¹⁰²⁾.

Diagnos. 8. Priusquam vero ad istam diagnoseos partem devenimus, de cautelis in admittenda febrium gastrico-biliosarum praesentia, quaedam in medium proferenda sunt. Sciendum enim est, STOLLER de febribus biliosis doctrinam a medicis coaevis nimis extensam fuisse, cui vitio J. P. FRANK obviam eundo¹⁰¹⁾, alius generis abusui fortuito ansam praebuit.

**Fallacia
sympto-
maticum.**

9. Nullum sane signum datur, quod febribus biliosis pathognomonicum dici posset. Genarum

102) Jam BAOLIVIVS edixit: „quae nobis videntur malignae, a viscerum phlegmone et erysipellate fiunt.“... „A duabus potissimum causis malignas has febres pendere observavi, inflammatione viscerum et ab apparatu pravorum crudorumque humorum in primis viis vel in massa sanguinis.“ Cfr. WIENHOLT diss. de occultis viscerum hypochondriacorum inflammationibus in febribus bilioso-putridis. Göttingae 1772. Ipse jam dudum in clinico instituto Vilmensi demonstravi hepatitides saepe sub larva febrium biliosarum obvenire.

103) De larvis morborum biliosis. Prolus. academ. (Deductus opusculorum. Vol. I.).

rum rubor circumscriptus non solum hujusmodi in febris, sed et in aliis morbis observatur, v. c. in peripneumonia, in phthisi pulmonali. Vel color flavus cutis non semper a bile. Detegitur nempe et post magnas haemorrhagias, et post morsum viperæ, et in recens natis, primum scilicet cancri cocti instar rubentibus, paulo vero post plerumque flavescentibus. Flavent tandem maculae scorbuticae, flaventque ecchymoses, dum cruor, in telam cellulosa effusus, magna ex parte absorptus est. Ita a cruore potius quam a bile, flavedo sputorum in peripneumonia et in pneumonorrhagia derivanda ¹⁰⁴). In genere infidum signum color ¹⁰⁵). Labii inferioris tremor saepe a nervosa passione oritur, e. c. vel in sano homine, quando fletus prorupturus est. Sapor oris depravatus, amarus, multis in morbis licet non biliosis occurrit, e. c. in coryza, ita post jejunium; sensus enim saporis, aliorum instar sensuum saepe depravatur, ac cerebro falsas impressiones committit. Lingua muco denso flavoque obducitur, e. c. in cynanche faucium, quam-

104) Sic jam a. 1797. docui. (J. FRANK ratio instituti clinici Ticinensis).

105) Mutationes colorum in animalibus cum circuitu cruoris et temperatura corporis nexum habere, pulbre per experimenta, ope thermometri in chamaeleonte suscepta, probavit J. MURRAY. (FRORIEP's Notizen aus dem Gebiete der Natur- u. Heilkunde. 8. B. No. 9. Septemb. 1824).

quamvis non biliosa; item a dente carioso, a mercurii usu. Hystericæ et hypochondriaci, sine latentis bilis indiciis, ructus experiuntur, interdum nidorosos. Scretio a solo intuitu vel a reminiscencia rei ingratae. Ita nausea et vomitus, cui præterea ansam porrigere solent motus rotatorius sive inconsuetus corporis, contagium variolarum, læsiones cranii, vitia renum, uteri, vesicæ urinariæ, herniæ etc.

Distinctio
ab aliis
morbis. 10. Itaque non ex uno symptomate, sed ex plurimis, habitaque simul ratione causarum, ad præsentiam febrium gastrico-biliosarum concludendum est. Præterea morborum cum istis febribus similitudinem alentium memores esse iuvabit. Loquimur de febribus *intermittentibus*, de *stadio invasionis variolarum*, de *encephalitide*, *gastritide*, *hepatitide* et *mesenteritide*.

Distinctio
a febre in-
termitten-
te. 11. *Febris continua biliosa* a febre *intermittente* ejusdem indolis distinguitur, habitâ ratione morborum regnantium eorumque quos aegrotus forte prius perpessus erat; item frigoris et sudoris, vix unquam in febribus continuis ita urgentium ac in febribus intermittens; et tandem urinae, ibi magis puriformis, hic potius lateritiæ.

Varia in-
doles. 12. Stabilis febris continuæ gastrico-biliosæ præsentia, eruendum est utrum ea sit *simplex*, an *inflammatoria*, an *rheumatica*, an *nervosa*?

13. Sim-

13. *Simplex* nobis est febris continua gastrico-biliosa, quae sub mitissima forma, sine indiciis sive inflammatoriis, sive rheumaticis, sive nervosis decurrit. Deprehendes aegrum sub exploratione abdominis nullum doloris sensum manifestare et videbis febrem jam ab ipsis evacuationibus spontaneis decrescere. Praeterea et saburrae adsunt indicia. Imo verisimile est, quod sicuti cibus acris, ore detentus, uberiores salivae secretionem in propinqua parotide elicit; ita saburrae in intestinis, uberiores in propinquo hepate eliciunt bilis secretionem.

14. Febris *biliosa inflammatoria* longe aliter constituta est. Licet enim in ea evidenter signa jecinatoris inflammati expectanda non sint (quum morbus hoc in casu non ad febres biliosas, sed ad hepatitisdem spectaret ¹⁰⁶), attamen symptomata, ex quibus *irritationem inflammatoriam* systematis hepatici arguere licet, praesto sunt. Spectant huc febris cum pulsu vibrante, cephalaea, sopore, delirio et epistaxi; flavedo cutis, evacuationes spontaneae vix levamen afferentes, urina sedimento puriformi instructa, ardor epigastrii et hypochondrii dextri, *attactum respuentis*. Quod ultimum signum (inprimis si hypochondrii exploratio suscepta fuerit trunco prorsum et quidpiam

sini-

106) MELIO facile sane erit febres biliosas a phlogosi repetere, si evidentes hepatitisdem huc revocat (l. c. p. 114).

sinistrorsum incurvato¹⁰⁷⁾), magni facimus, quippe reliqua etiam ex sola bilis praesentia, absente conditione inflammatoria ventriculi aut hepatis, oriri possunt. Hujus autem conditionis inflammationis praesentia eo securius arguitur, quo robustior aegrotus, quo magis iste ad haemorrhagias, praesertim haemorrhoides praedispositus, et potui liquorum fermentatorum addictus est; quoque calidior atmosphaerae temperies. Caeterum eadem inter febrem biliosam inflammatoriam et hepatidem intercedit ratio, uti inter febrem inflammatoriam et angiotitidem; inter febrem rheumaticam et rheumatismum acutum, inter febrem catarrhalem et bronchitidem etc.

Feb. biliosa rheumatica; catarrhalis.

15. *Febres biliosae rheumaticae saepe ophthalmiâ, cynanche faucium, coryzâ, catarrho, ordiuntur. Maxime gignuntur per vicissitudines atmosphaerae in hominibus, insidiarum climatis calidioris ignaris, atque somno supra solum humidum indulgentibus. Conjicimus cohibitam perspirationem rheumati, rheuma vero (systema hepaticum irritando vel inflammaudo) uberiori bilis secretioni ortum dare. - Febri biliosae rheumatico - inflammatoriae saepe socia est affectio catarrhalis membranae pituitariae intestinorum, dysenteriae gignens symptomata.*

16. Fe-

107) Omni jure MELI (l. c. p. 320.) monet, in morbis hepatis abdomen esse explorandum: „col tronco ricurvo in avanti ed un pò a sinistra.“

16. Febres biliosae *simplices*, rite curatae, Prognostico periculo carent: imo illas interdum salutes ^{sic.} observavimus ¹⁰⁸⁾. Secus *complicatae*, praecipue in hominibus morbis chronicis detentis ¹⁰⁹⁾, et in *puerperis* ¹¹⁰⁾. Febres gastrico-biliosae cum complicatione rheumatica, inflammatoria, nervosa, crescentes exhibent periculum. Praeter consuetos phlogoseos exitus gangraena ante portas. Tandem transitus febrium biliosarum in *phlebitidem* a FIZEAU ¹¹¹⁾ conjectus, et a MELI ¹¹²⁾ extra dubitationis alcem positus, memoratu dignus est. Quoad semeioticam, in febribus biliosis, *linguae conditio* maxime significat. Accedunt signa ex *vultu*, *cute* et *abdomine* deprompta.

17. Aqua, succo vegetabili acidulo (citri, Cura febr. biliosae simplici. aurantiorum, berberis, vaccinii oxycocci) et saccharo mixta, parvis haustibus, nec non repetitis vicibus subfrigide epota, una cum abstinencia a victu,

108) Per multos novi homines, diu affectionibus hypochondriacis ventris vexatos, qui per rite curatam febrem biliosam, quam perpassi sunt, perfectam denuo sanitatem adipiscebantur: nonnulli eorum, qui antea haec nimiam ad obesitatem manifestaverant proclivitatatem, absoluta tali febre, ventrem, ut vulgo ajunt, amiserunt.

109) MAENDLER diss. de febris biliosae complicatione cum aliis morbis. Lugd. Batav. 1790.

110) SACHTLEBEN in STARK's *Archiv.* 2. B. 2. St. No. 1.

111) Cfr. P. II. Vol. II. Sect. II. Cap. XVIII. De phlebitide. §. LXXV. 7. (68).

112) Op. cit.

victu, ad curandas febres gastrico-biliosas *simplices* sufficiunt, dum ipsa natura evacuationem bilis per vomitum et diarrhoeam spontaneam absolvit. Alias hujusmodi evacuationes per artem excitandae. Prius tamen diluenda est tenax bilis et ad eliminationem praeparanda (quod *saburras mobiles reddere* vocant). Huic scopo sic dicta *remedia resolventia* inserviunt; e. c. *tartarus emeticus*, aut per se aut *cremore tartari* mixtus¹¹³). Alvus clausa *clystere* emolliente movetur. Elapso uno alterove nychthemero ad bilis formalem evacuationem devenitur. *Emetico* locus est, si generales hujus auxilii contraindicationes desint, si os sit amarum, lingua spurca, si ructus nidorosi, nausea, vomituritio obveniant, sique forte vomitus spontaneus antea cum levamine contigerit. *Tartarus emeticus*, aut, dum praesens illi obstaret diarrhoea, radix *ipecacuanhae* ad vomitum eliciendum maxime idonea sunt medicamenta. Peracta emesi aegroto ad futurum usque nychthemerum pax conceditur. Tunc, vel etiam prius, si vomitorium non fuerit indicatum, ad *lenia purgantia* properandum¹¹⁴). *Lenia*, inquam, nam vehemens purgatio valdopere nocet. Quam ipsam ob causam vix unquam hoc in morbo

113) P. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXX. No. 9.

114) Si tamarindi per se effectum optatum non praestarent, adde illis drachmam unam alteramve salis cujusdam purgantis.

morbo *emetò-catharticum* locum invenit. In genere hîc ab omni tumultuaria medendi ratione abstinendum, et peractis jam jam indicatis evacuationibus, quid nunc ultro natura valeat, expectandum. Interea ne aegrotus absque pharmaco relinquatur, ipsi potio nobis carissima praescribitur¹¹⁵⁾.

18. In *febre biliosa inflammatoria* quo re- Cura febr. biliosae inflammator.
centior morbus, quo floridior aeger, et quo majores regionis epigastricae et hypochondriacae dextrae ardor, dolor et tensio; eo magis *venae-sectionis* indicata est¹¹⁶⁾. Homini adulto novem circiter cruoris uncias, easque e brachio dextro detrudere solemus. Talis phlebotomiae unicus scopus in eo consistit, ut transitus morbi in phlogosin systematis hepatici aliorumque viscerum praepediatur, utque complicatio inflammatoria auferatur. Quam ob rem si detracto sanguine febris et affectio regionis epigastricae et hypochondriacae dextrae decreverint, a novis venaesectionibus abstinendum. Contra si symptomata, quae primum
cruoris

115) R. Subcarbonatia potassae drachmam unam. Saturatur cum suff. quant. succi citri recenter pressi. Adde aquae cerasorum nigrorum uncias septem. Syrupi ejusdem unciam unam. M. Cap. secunda quaque hora cochlearia duo majora.

116) APPAZ de phlebotomiae, imprimis in febribus biliosis recta administratione. Helmstadii 1779. — BODE de recto usu sanguinis detractionis in morbis biliosis. Gotting. 1702.

crucoris detractionem exposcebant, perseverarent, nullumque a phlebotomia detrimentum visum sit, illa reiteranda¹¹⁷⁾. Peractis indicatis phlebotomiis, neque ablata omnino epigastrii et hypochondrii dextri passione, sanguinis evacuationibus localibus ope cucurbitularum scarificantium et hirudinum est occurrendum. Earumdem adminiculo etiam ingruentem morbum adgredimur, si affectio epigastrii et hypochondrii dextri plus quam febris vigeant, sique aeger alioquin ad venaesectionem minus aptus sit. Sunt enim hoc in morbo evacuationes crucoris locales longe tutiores, quam universales, nisi evidenter indicatae. Utraeque tamen limites agnoscunt. Si enim crucoris detractio licet repetita nec hilum proficiat, dubium, an symptomata ardoris, doloris, tensionis epigastrii non alium, quam inflammationis, agnoscere possint fontem, medico, systematum ignibus fatuis non obcaecato, sponte sese obtrudere debet. Ac re quidem vera, ea ortum ab uno bilis stimulo duxisse, plus vice simplici observavimus. Interea donec dubium illud confirmatum haud fuerit, in cura febris biliosae inflammatoriae non solum crucoris evacuationes minime negligere, sed praeter illas pharmaca quoque mucilaginosa et oleosa¹¹⁸⁾ propinare oportebit. Purum

117) BURNET ad 200 crucoris uncias detrahebat! (l. c.)—

MELI de venaesectionibus ait: „Mai (!) meno di tre, e in casi gravissimi si giunse a sette.“ (l. c.).

118) l. c. No. 12.

rum etiam *oleum ex nucleis recentibus amygdali communis* recenter expressum hic jure commendatur¹¹⁹⁾. Indicatur potissimum vigente irritatione phlogistica in ipso ventriculo aut in intestinis. Morbo maxime hepar detinente, praemissis jam indicatis evacuationibus cruentis, imprimis si vomitus administrationem aliorum catharticorum impediret, ad *calomel*¹²⁰⁾ confugiendum. In hujus tamen usu (ob ptyalismum periculum, symptomata hic aggravare soliti) haud diu perseverandum. Effrenem vomitum nostro in morbo compescere quoque solet *haustus anti-emeticus* RIVERII, sub actu effervescentiae adhibitus¹²¹⁾. Ad eundem effectum nec non ad febris impetum frenandum multum quoque contribuit *potus aquae frigidae*, quem GALENUS¹²²⁾, CELSUS¹²³⁾, CRE-

GEN-

419) J. B. MARTII *istoria delle pleuritidi biliose di Samminiato*. 1775. p. 160. — BURSERII *institut. med. pract.* Vol. I. §. CCCXCV. et HUYELAND *Journ. der prakt. Heilk.* X. B. 4. St. p. 135. (Dosis unciae semis sexies, octies intra nycthemeri spatium).

120) Omni quarta hora grana duo, pro adulto.

121) R. Subcarbonatis potassae grana decem. D. ad chartam. R. Succu citri recenter expressi unc. semis. D. ad vitrum. Misce dein et capiat sub actu effervescentiae. Repetatur secunda seu tertia quaque hora.

122) Meth. med. Lib. IX. cap. 5. („Maxime vero continentiarum febrium remedia, haec duo sunt: detractio sanguinis et *potio frigida*“).

123) De re medica. Lib. III. cap. 7. („Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante diem

Frank Prax. I. 1. 2.

K

CENCIO ¹²⁴⁾, CIRILLO ¹²⁵⁾, A. FRÖHLICH ¹²⁶⁾ et MELI ¹²⁷⁾ inculcant. BURNETT aliique etiam *af-fusionem* seu *lotionem* corporis aegroti ope aquae frigidae, atque (praesente meteorismo) *applicationem glaciei* super abdomen commendant, id.que omni jure praecipue in regionibus calidis, et sub rerum positionibus, quas alibi adcuratissime indicabimus ¹²⁸⁾. Hic satius erit meminisse, febrem biliosam, fugatâ complicatione inflammatoriâ, illico ut *simplicem* esse tractandam. Naturae enim viribus quidpiam fidendum. Interea aestum febrilem (et in graviori morbo statum inflammatorium in systemate venarum abdominalium) temperant *nitrum* ¹²⁹⁾, et *acida vegetabilia*, vide-

quartam magna siti antecedente; *frigida aqua* copiose praestanda est, ut bibat etiam ultra satietatem¹³⁰⁾. Cfr. E. F. CHN. OERTELIUS de aquae frigidae usu Celsiano. Monach. 1826.

124) *Ragionamenti intorno alla nuova medicina dell' acqua.*

125) In *Philosophical transactions*. Vol. XXXVI. p. 142.

126) *Abhandl. von dem auffallenden Nutzen d. kalten u. lauen Wassers in Fieberkrankheiten u. d. Scharlach.* Wien 1818. Et: *Abhandl. über die Kräfte, sichere und schnelle Wirkung des kalten u. lauwarmen Wassers in Paul-, Nerven-, Gallen-, Brenn- und Scharlachfieber u. s. w.* Wien 1820.

127) l. c. p. 83. 128) Cap. V. §. XXXI. No. 22.

129) In parca tamen dosi, quoniam illud hoc in morbo segre ferri solet.

videlicet *oxymel simplex*, *acidum tartari*¹³⁰⁾ aut simile, aqua vel decocto mucilaginoso¹³¹⁾ dilutum, et saccharo edulcatum. *Acidum sulphuricum* et *nitricum*, non nisi valde diluta, conveniunt.

19. Cura *febris biliosae rheumaticae*, notas C. febr. bil. rheumaticae. simul inflammatorias exhibentis, *venesectione* inchoatur. In leviori morbo *cucurbitulae scarificantes* vel *hirudines* ad epigastrium et hypochondrium dextrum applicitae sufficiunt. Succedunt evacuationes bilis juxta rerum conditiones jam indicatas¹³²⁾, modo *emetiis* modo *purgantibus* impetrandae. Hisce tamen pharmacis diu nimis insistere periculosum est. Febris enim, utpote caractere rheumatico insignita, crisin libentius ope cutaneae perspirationis absolvit, cui, evacuationes tubi intestinalis, nimis crebro repetitae, obstant. Devicto itaque statu irritationis circa hepar, ac eliminata bile, quo citius id fieri potest, ad pharmaca *leniter diapnoica*, videlicet ad *spiritum Mindereri* et potissimum ad *tartarum emeticum*, refracta dosi porrectum, ut-

K 2

pote

130) R. Aquae rubi idaei uncias octo. Acidi tartari, q. s. ad lenem aciditatem. Syrupi rubi idaei unciam unam. D. S. uncia una pro dosi, secunda quaque hora repetenda.

131) R. Decocti salep libram unam. Syrupi acetositatis citri unciam unam. M. S. Cap. vasculum coffeanum semis omni secunda hora.

132) No. 18.

pote alvinae simul libertati studentem, confugimus. Praeterea in toto hujus febris biliosae speciei decursu tum propinatio tum adplicatio rerum frigidarum evitari debent. Conducunt potius *fomenta abdominis tepida, emollientia*. Tandem si evacuationes regionibus dolentibus non prospicerent, istis, senescente morbo, *vesicatorium* imponendum foret.

§. XXIV.

De febribus gastrico-pituitosis.

Definitio. 1. Febris continua gastrica, secretione morbose pituitae primarum viarum stipata, *pituitosa* nuncupatur¹⁾.

Literatura. 2. Febrem hujusmodi descripserunt: SCRETA²⁾, J. G. ROEDERER et C. TH. WAGLER³⁾, C. STRACK⁴⁾, M. STOLL⁵⁾, PH. G. KNAUS⁶⁾, C. F. ELS-

1) *Synon.* Febris glutinosa, lymphatica, humoralis. Morbus mucosus. Phlegmapyra. GERMAN. *Schleimfieber*. GALL. *Fièvre adéno-méningée*. ITAL. *Febbre mucosa*.

2) Diss. de febribus pituitosis. Basil. 1650.

3) De morbo mucoso liber singularis. Gotting. 1762.—
Denuo recusus annexaque praefat. edit. a WRISBERGIO.
Gotting. 1783.

4) Diss. de febre pituitosa. Mogunt. 1781.

5) Ratio medendi. Tom. III.

6) Diss. annotationes quaedam circa morbum bilioso-mucosum annis 1783 et 84. Stuttgartiae grassatum. Stuttg. 1786.

ELSNER ⁷⁾, G. F. CONSBRUCH ⁸⁾, WIEDERS ⁹⁾, JACOBI ¹⁰⁾, G. E. F. CANZ ¹¹⁾, J. P. FRANK ¹²⁾, REIL ¹³⁾ et J. L. DOUSSIN - DUBREUIL ¹⁴⁾.

3. Morbus languore universali et incommo-^{Sympto-}
dis ventriculi annuntiari solet. Evolvitur horri-^{mala.}
pilatione, intercurrente calore, cum cute sicca et
pulsu frequente. Horis vespertinis cuncta haec
symptomata exasperantur. Mane cutis sudoribus
partialibus, acidum spirantibus, cooperitur. Ac-
cedentibus repetitis exacerbationibus, aeger ma-
gis magisque de capitis gravitate, deque aurium
susurru conqueritur, aut veluti stupidus decum-
bit.

7) Diss. animadversiones in febres pituitosas. Regiom.
1789.

8) Diss. historia febris mucosae billosae annis 1783 et 84.
Stuttgardiae grassatae. Stuttg. 1790.

9) Diss. sistens discrimen inter febrem pituitosam et bi-
liosam. Gotting. 1790.

10) Diss. de febre pituitoso-nervosa Stuttgardiae 1792.
grassante. Stuttg. 1793.

11) Beschreibung einer Schleim-, Faul- u. Nervenfieber-
Epidemie, die 1793—94. in den Rheingegenden und auf
dem Schwarzwalde unter dem Landvolke gewüthet hat.
Tübing. 1795.

12) Ept. de curand. hom. morbis. Vol. I. p. 148.

13) Memorabilia clinica. Fascicul. I. p. 6. — Fieber-
lehre. 3. B. p. 578.

14) Ausführliche Darstellung der Ursachen, Wirkungen u.
Heilmittel der in unsern Tagen so häufigen Verschlei-
mungen. A. d. Fr. Mit Vorrede u. Anmerkungen von
Dr. J. H. G. SCHLEGEL. Ilmenau 1823.

bft. Maxime is continua screatione mucī, in fila ductilis, molestatur. Sapor oris vel nullus, vel salsus et nauseosus. Fauces rubent, ac pituita, interdum suffocationem minitante, saepeque vomitum et tussim excitante, vellicantur. Plerumque ardoris sensus a ventriculo per oesophagum ad fauces ascendit. Multi anxietatem, morsum stomachi, flatum et singultum patiuntur. Interdum regio epigastrica attactum non fert. Nec desunt apud plurimos tormina abdominis, et diarrhoea, sub cujus decursu, mucus, materiae vitreae similis, deponitur. Urina jumentosa, saepe cum sedimento cinereo, haud raro cum ardore excernitur. Aegroti juniores et feminae praeterea vermes evacuare solent. Aetate provectiones et mares saepe haemorrhoidibus exercentur. Quodsi morbus, uti saepe fieri solet, ultra septimum diem ad decimum quartum aut vigesimum primum usque protrahatur, plerumque miliaria, aphthae circa os, anum, proveniunt. Denegata tunc per sudorem universalem, per diarrhoeam foeculentam, perque largam epistaxin, crisi, turbae systematis nervosi, viriumque jactura, meteorismus et mors timenda sunt.

Neuroscopia.

4. In *cadaveribus* inflammatio ventriculi et intestinorum tenuium reperitur¹⁵⁾. Illorum superficies interna muco tenaci, flavescente aut cinereo

15) WAGNER L. c. oper. recent. p. 244.

reo obducta est¹⁶). Substantia intestinorum crassior. Glandulae ad illa spectantes tumidae, halone rubro circumdatae, ductibus excretoriis dilatatis. Hepatis parenchyma acinosum.

5. Febribus gastrico-pituitosis potissimum ^{Causae praedisponentes.} obnoxii sunt homines graciles, laxi, infantes, feminae, praeterea qui vitam sedentariam agunt, loca uliginosa inhabitant, cibis crudis vescuntur, aut fame ac animi pathematibus deprimentibus vexantur, nec non, qui scrophulis laborant.

6. Excitantur febres pituitosae vicissitudinis ^{Causae excitantes.} atmosphaerae, frigore humido et ignota annua seu epidemica constitutione.

7. Illarum *causa proxima* quondam a pituita sanguinis repetebatur. Nos eam, cum recentioribus¹⁷), a secretione morbose pituitae, cui affectio catarrhalis membranae mucosae ventriculi et intestinorum ansam praebuit, repetimus. ^{Causa proxima.}

8. Itaque febris gastrico-pituitosa re ipsa nil ^{Diagnosis.} aliud est, quam febris catarrhalis, in qua affectio, alias membranae pituitosae narium et bronchiorum infensa, illam faucium oesophagi, reliquique tubi alimentarii detinet. Nihilominus haecce differentia tanti est momenti, ut doctrina febris catarrhalis vix cum illa febris pituitosae simul tradi possit. Nequaquam febris pituitosa pro sic dicta *influenza* habenda¹⁸). Interea posse causam

16) REIL loc. cit. p. 584. 17) REIL L. c. p. 570.

18) Has febres ut morbos ejusdem generis describit J.

sam februm catarrhalium tum sporadicarum tum epidemicarum interdum simul tubum alimentarium adficere, non negabimus.

Feb. pituitosa sim-plex.

9. Febrem gastrico-pituitosam, quae ut catarrhus membranae mucosae tubi alimentarii, siue indicia manifestis aut phlogoscos, aut saburrarum aut bilis, et sine turbis nervorum decurrit, *simplicem* vocabimus.

Feb. gastrico-pituitosa inflammata.

10. *Inflammatoria* nobis erit febris gastrico-pituitosa, quae cum tanta tubi alimentarii irritatione incedit, ut ad constituendam genuinam enteritidem unus dumtaxat requireretur gressus. De complicationis inflammatoriae praesentia calor cutis magnus, pulsus plenus, durus, ardor ventriculi, tormina abdominis, maxime autem aegroti constitutio, morbis inflammatoriis favens testantur.

Feb. pituitosa gastrico-saburralis.

11. Causa catarrhali in tubum intestinale, sordibus et vermibus alioquin onustum, irruente, *complicatio morbi saburralis et verminosa* facile intelligitur. Neo arduum erit de *complicatione biliosa* febris pituitosae rationem reddere, perpendendo, omnem fere irritationem, tubo alimentario illatam, copiosorem bilis secretionem elicere.

Feb. pituitosa nervosa.

12. *Complicationem nervosam* febris gastrico-pituitosae alio in loco¹⁹⁾ illustrabimus.

13. Fe-

H. G. SCHLÖTZ, *Handwörterbuch der medic. Klinik.*
4. B. 2. Th. p. 407.

¹⁹⁾ Csp. V. §. XXX. No. 8.

13. Febris gastrico-pituitosa *simplex*, in ho-
minibus antehac nulla viscerum labe adfectis,
vix periculum portendit. Secus autem in valetu-
dinaris, praesertim scrophulosis. Sicuti enim
febres catarrhales in hominibus, quorum pulmo-
nes tuberculis referti erant, phthisin pulmonalem
excitare valent; ita febres pituitosae in homini-
bus, quorum mesenterium tuberculis notatum
est, phthisin meseraicam saepe producunt. Ubi
hae febres complicationem inflammatoriam aut
rheumaticam ineunt, periculum phlogoseos visce-
rum, in peritonaei sacco inclusorum, imminet,
una cum sequelis. Febre pituitosa in inflamma-
tionem viscerum transiente, imminutio secretio-
nis pituitae sequi solet. Quamobrem etiamsi ni-
mia pituitae secretio aegrotum exhaustum possit,
illam tamen melioris ominis habemus. Compli-
catio biliosa et saburralis febrem pituitosam non
graviorem reddere non potest. Id quod majori
adhuc in gradu de complicatione nervosa, in-
primis aphthis stipata, valet.

14. Febrem gastrico-pituitosam *simplicem*,
necnon febrim catarrhalem simplicem instar
proprium decursum absolventem, eo magis natu-
rae committimus, quum status irritationis tubi
alimentarii alioquin usum internum pharmacorum
excludat. Remedia solum *emollientia* (e. gr. de-
coctum *salep*, *althaeae*, *seminum lini*, *solutio*
gummi arabici) excipi merentur, et quidem tum
in

Cura febr.
pituitos.
simplicis.

in morbi *principio*, tum versus illius *finem*. Utroque nempe in casu tubi alimentarii irritationem temperare non nocebit; ibi, antequam pituita copiose secreta id per se praestet; hic, postquam pituita praeter modum evacuata partes affectas, muco obducente spoliatae, reliquærit. Pharmacis mucilaginosæ tunc etiam lenia *narcotica*²⁰⁾ copulari possunt. In morbi quoque *medio*, ubi interna tubi alimentarii superficies tenaci pituita obducta est, ideoque illius a pharmacis irritatio vix timenda, *remedia ex resolventium classe* petita, ad incidendam diluendamque pituitam ejusque evacuationem spontaneam praeparandam, exhiberi queunt. Illorum duo nobis hic prae reliquis familiaria sunt, nimirum *tartarus emeticus*²¹⁾ et *sal ammoniacus*²²⁾. Aegro acidis primarum viarum molestato, *subcarbonas* sive *sodae*, sive *potassae*²³⁾ conducit. *Calomel* hic cum damno adhibemus. Quodsi natura a pituita sese ipsa liberare haud valeat, illius eliminationi brevissima, qua fieri potest, via est prospiciendum. *Emeticum* indicatur, ubi ex pituitae collectione nausea, conatus vomendi cum suffocationis periculo urgent; *catharticum*, ubi borborygmi, abdomi-

20) e. c. syrupus diacodii.

21) Part. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II. §. XXX. No. 9.

22) Ibidem. No. 12.

23) e. c. grana viginti in uncis sex aquae fontis, addita syrupi violarum uncia una. D. S. capiat cochlearim.

dominæque tensio cum alvo clausa conjuncti sunt. Inter emetica radix *ipecacuanhæ* hic excellit; inter cathartica illa *rhei*, addita tamen mucilagine²⁴⁾. Dieta esto severa. Pro petu decoctum hordei, aqua cum pane decocta, eaque pura, dummodo non frigida.

15. Febris gastrico-pituitosa *inflammatoria* O. febr. pituit. inflamm. et rheumatica. aut *rheumatica*, si vehemens fuerit, *phlebotomiam* exposcit. Hac non omnino indicata, aut jam absoluta, quin morbus mitescat, *cucurbitulae scarificantes* et *hirudines* super abdomen adplicantur, ita ut quatuor aut quinque cruoris unciae adulto homini detrahantur. Per totum hujus curae curriculum, interne nonnisi *decocta mucilaginosæ* propinanda sunt. Morbo ad simplicitatem perducto, uti antehac curandus, sed semper cum circumspectione, ne minimus tubo intestinali praepostere admotus stimulus idem rursus provocet incendium. Dum complicatio *rheumatica* latet, ad finem vergente morbo transpirationis operi prospiciendum. Ubi dolor adhuc abdomen torquet, ibi amplum *vesicatorium* adplicitum prodest.

16. Quum saburrae et bilis irritationem tubi alimentarii in febre pituitosa necessario augere C. febris pituitosae gastr. saburralis. debe-

24) Pro adulto: R. „Radice *rhei* drachmam semis, gummi arabici drachmas duas, mellis puri unciam unam. Ebulliant per horæ momentum c. s. quantitate aquae fontanae. Celatura unciarum octo d. s. Capiat secunda quaque hora cochlearia duo.

debeant, nisi natura ipsa jam satis illarum eliminationi provideat, aut status inflammatorius obstet, citius, quam alias, ad *emetica* et *purgantia* deveniendum est.

Monitum. 17. Curam febris pituitoso-nervosae in alium locum reservamus. Monemus tandem neminem praecepta, febribus pituitosis medendi, ad unguem tenere, nisi qui illis alia, in therapia enteritidis, diarrhoeae, et dysenteriae exponenda, jungit.

§. XXV.

De febre gastrico-verminosa.

Definitio. 1. Febris continua gastrica, vermium intestinalium proventu insignita, *verminosa*¹⁾ appellatur.

Literatura. 2. Hujus morbi doctrina cum generali illa de vermibus intestinalibus humani corporis²⁾, arctissimum nexum habens, illustrata est a: JENISCH³⁾, J. B. MOREALIS⁴⁾, VELSCH⁵⁾, SCHACHT⁶⁾, SICKEL⁷⁾,

1) *Synon.* Synochus puerorum. Febris ardens continua infantum, hectica infantilis, haetica febris infantum, febris lenta infantum. *ITAL.* Febbre verminosa. *HISPAN.* La calentura verminosa. *GALL.* Fièvre vermineuse, fièvre ardente des enfans. *ANGL.* Worm-fever. *GERM.* Warmfieber.

2) P. III. Vol. I. Sect. II.

3) Quaestiones No. 4.: an febris verminosa purgatio. Montepes. 1605.

4) *Delle febbri maligne e contagiose prodotte dai vermi.* Modena 1739.

CKEL⁷⁾, DÜRR⁸⁾, VAN DEN BOSCH⁹⁾, HÜNER-
WOLFF¹⁰⁾, HAEN¹¹⁾, STOLL¹²⁾, MUSGRAVE¹³⁾,
HUFELAND¹⁴⁾, BEIREIS¹⁵⁾, LEPEQUE DE LA CLO-
TURE¹⁶⁾, WALLICH¹⁷⁾, JAHN¹⁸⁾, PHILITES¹⁹⁾,
LUTHER²⁰⁾, OSIANDER²¹⁾, JUNGÉ²²⁾, RODRIGUEZ

DE

5) *Hecatost.* II. observat. 59.

6) *Diss. aeger febre continua a vermibus exorta laborans.*
Gies. 1703.

7) *Acta acad. nat. curios.* Vol. VII. p. 261.

8) *Miscell. acad. nat. cur.* Dec. III. a. 5 et 6.

9) *Historia constitutionis epidemicae verminosae, quas*
annis 1760. 1761. 1762. et initio 1763. regnavit.

10) *Miscell. acad. nat. cur.* Dec. III. a. 2.

11) *Rat. medendi.* Pars XIV. p. 139.

12) *Rat. med.* Tom. VII. p. 115. et prael. I. p. 256.

13) *Essay on the nature and cure of so called Worm-*
fever. Lond. 1776. V. *Sammlung auserles. Abhandl. f.*
prakt. Aerzte. 3. B. p. 529.

14) *Bemerkungen über die natürlichen u. künstlichen Blat-*
tern, verschiedene Kinderkrankheiten. 3. vermehrte Aufl.
Berlin 1799. p. 324 sq.

15) *Diss. de febribus et variolis verminosis.* Helmst.
1780.

16) *Observations sur les épidémies.* p. 9. (febris putrido-
verminosa anni 1770).

17) *Diss. de febre verminosa.* Gies.

18) *Diss. febrium verminosarum examen.* Halae.

19) *Diss. febrium verminosarum pathologia.* Gotting.
1785.

20) *Diss. de febre verminosa.* Erford. 1787.

21) *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde u. Geburtshülfe.*
Götting. 1794. 1. B. 1. St.

22) *Soc. med. Hafniensis collectanea.* Vol. II. p. 322.

DE VERA²³⁾, FOURNIER²⁴⁾, VIVENS²⁵⁾, MARIE²⁶⁾,
PENADA²⁷⁾ et MOLL²⁸⁾.

Sympto-
mata.

3. Febris verminosa fere aliarum gastricarum instar incipit. Stipatur remissionibus, saltem ab initio morbi, conspicuis. Somnus tamen eorum sub decursu valde inquietus est, praecipue pavoribus, stridore dentium, motibusque convulsivis faciei et extremitatum perturbatus. Infantes obdormientes ita se gerunt, acsi aliquid deglutire vellent. Horis matutinis moeror, pusillanimitas, oris foetor, lingua albo muco obducta, ptyalismus, nausea, interdum vomitus, apparent. Nisi morbus, uti saepe contingit, decursum ephemerac absolvat, remissiones febris sensim sensimque evanescent, atque aegri viribus magis magisque fracti, adspectum offerunt luridum, oculos circulis lividis circumdatos, genas alternatim rubentes, pallescentes. Plurimi de aurium susurru conquiescunt. Saepius sternutatio et stillicidium sanguinis

23) *Mem. acad. de la real soc. de Sevilla. T. 7. p. 76.*

24) *Mém. de Dijon. T. 2. hist. p. 69.*

25) In CORVISART *journal de médecine. An X. V. HUYELAND'S, SCHREGER'S u. HANLESS'S Journ. der ausländ. med. Literatur. 1802. 2. B. p. 315.*

26) In SEDILLOT *rec. périodique de la société des médecins de Paris. Tom. 21. p. 250. 257.*

27) In *nuovi commentarj di medicina e di chirurgia pubblicati dai Sig.^{ri} BERRA, Ruggieri e Caldani. 1813. Tom. IV. p. 373.*

28) *Practisch Tydschrift voor de Geneeskunde. 1822. p. 374.*

nis e naribus (quibus aegroti digitos scalpendi causa continuo admovent), observantur. In nonnullis vermes per nares et os exeunt. Urgent interea insensibilis sicca, cum doloribus pectoris, quasi pleuriticis, aliisque artuum. Multi cordis et carotidum vibrationes experiuntur. Tenditur abdomen, praecipue circa umbilicum dolens, caeterum attactum vix respiciens. Alvus jam clausa, jam aperta: plerumque diarrhoea vel mucosa, vel mucoso-cruenta, vermes vivos, mortuos, putridos exhibens, saepe tenesmo juncta. Faeces foetidissimae, non raro lactis coagulati instar, vel filamentis obscure viridibus, veluti confervae, obvolutae. Quandoque vermium congeries, tali materia obducta, tanquam nidum constituit. In summo morbi gradu animi deliquia, transitoria caecitas, delirium, convulsiones, paralyses partiales, aphonia, aphthae comparent. Res ita ad septimum, decimum quartum, vicesimum primum diem protrahi potest, donec febris vel diarrhoea faeculenta, urina jumentosa, sudore universalis, aut alio phaenomeno critico terminetur; vel in alios morbos, infra definiendos, transeat.

4. Ex anatomia pathologica, in tractatu ver-Necrosco-
mium intestinalium, fusius tradenda, hic dum-Pia.
taxat, quae stricte ad *febrem verminosam* spectant, in medium proferimus; videlicet in ventriculo et intestinis tennibus — *ascarides lumbricoides*; in caeco — *trichuridem* seu *trichocephalum*,

lum, et in recto — *oxyuridem vermicularem* obvenire, quorum vermium primi, perforatis interdum intestinis, in peritoneaei ambitu in conspectum veniunt. Longe autem saepius post febres *dictas* verminosas cadavera exhibent serum in encephalo aut columna vertebrali, inflammationes peritoneaei, hepatis, mesenterii et intestinorum.

Causae. 5. Febris verminosis praecipue obnoxii sunt infantes et pueri post secundum²⁹) natiuitatis annum usque ad duodecimum (et quidem quam maxime circa tempus novilunii³⁰); item cupediarum amantes; qui victu crudo, saccharo, aliisque cibis et pharmacis dulcibus utuntur, condimento salis culinaris orbatii sunt; qui scrophulis laborant, quique clysteribus abutuntur. Genio epidemico evolutioni vermium intestinalium favente, etiam adulti, praesertim feminae, febres gastrico-verminosas exhibent. Interdum haec febres praeposteras et insufficienti remedium anthelminthicorum administrationi originem debent.

6. In

29) Observavi (Vilnae die 22. Jun. 1845) tamen et *primo vitae anno* in infante lactante febrem verminosam, sub cuius decursu praevia sternutatione ascaris lumbricoides per nares exiit, cessantibus illico febris symptomatibus.

30) Observationem istiusmodi millenis observationibus habeo comprobata, atque pro illa, saltem in Lithuania, spondeo.

6. In *diagnosi* febrium verminosarum insti-Diagnosis.

tuenda aequae a muliercularum more, omnes fere infantum ac puerorum morbos a vermibus repetendi, atque a medicorum nonnullorum opinione, illos e catalogo causarum febrium excludi debere, alienos esse oportet. Veritas enim et hic in medio latet. Caeterum cur mulierculae *encephalitidem* et *rhachialgitidem*, *hydrocephalum* et *hydrorachitidem*, *carditidem* et *arteritidem*, *peritonitidem* (praecipue *mesenteritidem*) et *hepatitidem*, *gastritidem* et *enteritidem* saepe pro febribus verminosis habeant, facile intelligitur (est enim illis inflammationibus magna cum hisce febribus similitudo): ast quomodo *medici* existentiam febrium verminosarum in dubium vocare possint, animo concipi vix potest; nil enim intellectu facilius, quam febrium ex vermibus origo. Possunt nimirum vermes jam per irritationem, quam membranae internae tubi intestinalis inferunt, febrem mucosam generare. Similiter propagata irritatione ad hepar, febrem biliosam. Ast brevior adhuc via ad febriles motus excitandos, praeter illam morbosae secretionis muci et bilis, patet. Lacessitis nimirum a vermium reptatu morsuque nervis ventriculi et intestinorum, irritatio illico plexibus nervorum mesentericis et solari communicatur. Hi autem plexus quum ex pari nervorum vago et intercostali componantur, qui nervi *cordi* imperant, aliter fieri nequit, quin pulsus concitetur, calor augeatur, verbo, febris

in conspectum veuiat. Fateamur vero oportet huiusmodi tumultum, a vermibus excitat plerumque esse brevis durationis, *verasque et simplices* febres verminosas ut plurimum sub *foe phemerae* sive simplicis sive protractae occurr quae id peculiare habet, quod circa noviluni derepente tanta cum vi ingruat, ut mox acce attingat. Quod si aegrotanti corpus fuerit pleu ricum, febris verminosa signa *complicationis flammatoriae* exhibet. Debiliores contra, qui systema nervosum admodum excitabile habet facile febrem verminosam cum *complicatione ver vosa* nanciscuntur. Praeter febrem autem, proprie verminosam dictam, saepe accidit, ut multus verminosus vigentibus aliis morbis acce e. c. febribus inflammatoriis, rheumaticis, cat rhalibus, nervosis, viscerum inflammationib exanthematibus, concitetur. Complicatione l *verminosa* contingente, morbum primum : opinat exasperatum videbis. Advertes praeter nova plane symptomata, praesertim nervosa, quae si in morbo, de quo agitur, vix alias expectan sint, diagnosin *scenae verminosae* faciliorem reddunt, quam in casu contrario, ubi scilicet ipso morbo primario similia symptomata exspectanda sunt. Ut ut sit, scena verminosa maxime probabilis erit: si nulla alia causa praegressa fuerit, quae de morbi augmento aut mutata farrationem contineret; si aegrotulus alioquin affectio

ctionibus verminosis obnoxius vixerit; si ille sub decursu praesentis morbi plurimis pharmacis dulcibus usus sit; si clysteres frequenter adhibiti fuerint; si novilunium aut immineat, aut vix locum obtinuerit; sique symptomata accessoria cum illis, quae alias a vermibus accidere solent, multum convenient.

7. Febris verminosa simplex in corpore ante-Prognosis. hac sano vix periculum portendit. Secus autem, ubi illa cum notis inflammatoriis aut nervosis in aegrotulis, ad morbos alios dispositis et scrophulosis, incedit. Maxime timemus consensuales encephali affectiones; item enteritidem et mesenteritidem, de quo morbo, cum febris verminosis magnum nexum habente, debito loco³¹⁾ plura dicentur.

8. In primo febris verminosae limine in aegrotulo³²⁾, alioquin sano, *mixturam oleosam*³³⁾, et (nisi clysteres jam ad morbum excitandum contulerint) *enema* ex lacte et saccharo praescribimus, exhibita aqua subfrigida pro potu, prohibitoque omni victu. Dum aegrotuli nec admodum sensiles sunt, nec dolores ventris manifestant,

L 2 mix-

31) P. III. Vol. II. Sect. I.

32) Supponitur aetatis annorum trium respectu formularum sequentium.

33) R. Olei amygdalarum dulcium recentis unciam unam, mucilaginis gummi arabici drachmas duas, aquae fontis uncias tres. M. D. S. Capiat omni hora unciam semis.

mixturam illam cum *oleo ricini* (si id bonae notae ac ranciditatis expers haberi possit) copulamus³⁴). Quodsi hac sub methodo morbus nychthemeri unius alteriusve spatio, ut in febre verminosa simplici plerumque fieri solet, evanescat; convalescenti, aegre jejunium ferenti, primum jussula avenacea, dein olera facilis digestionis, et tandem carnes juniorum animalium concedimus. Primo adpropinquante novilunio, id est, ultima lunae phasi ad finem vergente, *scopo prophylactico* praemisso ad vespertas enemate superius descripto simili, altero mane *pulverem anthelminticum*³⁵) exhibemus, illumque, nisi effectus (saltem alvi purgatio) sequatur, postridie repetimus. —

Continuatio argu-
menti.

9. Febre verminosâ *symptomatibus inflammationis* stipatâ, praeter mixturam oleosam et enema ex lacte saccharato, si abdomen doleat, illi *hirudines*³⁶) admovemus. Sanguine simul caput majori, quam par est, vi allidente, cruribus aut suris

34) R. Olei amygdalarum dulcium recentis unciam semis. Olei ricini, mucilaginis gummi arabici 2â drachmas duas. Aquae fontis uncias tres. M. D. S. cap. ut supra.

35) R. Pulveris artemisiae judaeae grana octo, radicis convolvuli jalappae grana sex. (Semel et calomel ad grana duo addi potest, imminuta tunc jalappae dosi ad grana quatuor).

36) Tot., quot requiruntur ad extrahendam cruoris unciam unam et semis circiter.

suris fermentum panis aut *sinapismos* ad lenem usque rubedinem adplicamus. Quae methodus nisi intra nychthemeri spatium febrem maxima ex parte temperaverit, *hirudinum* usue repetendus, simulque *calomel*³⁷⁾ porrigendum. — Alvo sic aliquoties aperta, postea ad *mixturam oleosam* redeundum. Imo si febris dein sine notis inflammatoriis continuaret, illiusque continuatio (propter absentiam signorum, alias pituitam vel bilem indicantium) a solis vermibus repeti posset, nil usui *infusi seminum artemisiae judaicae*³⁸⁾ obstaret. Contra praesentibus symptomatibus, quae pro accumulata pituita aut bile loquuntur, ad parcas saepeque repetitas *tartari emetici* doses³⁹⁾, quibus etiam vis anthelmintica inest, confugiendum.

10. Febre verminosa nulla status inflammationis indicia exhibente, praeter vermium muci-
bilisque evacuationem simul curanda. Continua-
tio argu-
menti. ut systema nervosam refocilletur, ejusque nimia sentiendi facultas imminuatur. Quam ob rem praemissa

37) Bis terve de die ad granum unum, cum tribus granis gummi arabici. (A saccharo enim abstinendum).

38) R. Seminum cinnae drachmam unam. Infunde in s. quantitate aquae fontanae fervidae per quartam horae partem ad colaturam unciae trium. D. S. capiat secunda quaque hora cochleare majus.

39) R. Tartari emetici granum unum. Aquae destillatae uncias tres. M. D. S. Capiat omni hora cochleare coffeanum.

missa mixtura cum vel sine oleo ricini, praemissaque, si opus fuerit, grano uno alterove calomelanos, ad remedia sic dicta nervina confugere oportet. Quorum duo prae ceteris sese commendant, radix scilicet *valerianae sylvestris* et gummiresina *asa foetida*. Quum infantes hanc, utpote sensibus ingratam, respuere soleant, illiusque administratio sub forma clysterum dumtaxat adversus oxyuridem vermicularem conducat, turbas autem a reliquis vermibus concitatas potius augeat, *valerianae* ⁴⁰⁾ standum, dummodo febris inde non invalescat. Haec si fuerit minima, sique aegrotuli caeterum absque notis inflammatoriis per dolores abdominis excruciantur, et evacuationes tubi intestinalis fuerint absolutae, interdum quidquam *hyoscyami* ⁴¹⁾ aut *opii* ⁴²⁾ conducit. Praeterea res nervis amicae et cuti, imprimis abdominis, adplicandae. Egregios effectus a *fomento calido* ex herbis *artemisiae absinthii* et

40) R. Radicis valerianae sylvestris drachmam semis vel integram. Infunde in s. q. aquae fervidae per quadrantem horae vase clauso. Colat. unciae trium D. S.

41) R. Extracti hyoscyami granum unum, mucilaginis gummi arabici drachmas duas, aquae fontis uncias duas. M. D. S. capiat omni hora drachmas duas.

42) R. Pulveris Doveri grana duo, pulveris gummi arabici grana duodecim. Misco assidue et divide in quatuor partes aequales. D. S. Omni tertia hora pulverem capiat, si primus conduxerit.

et rutae graveolentis ad partes aequales parato, ventrique consilio MUSGRAVII⁴³⁾ imposito, obtinuimus. Profuit alias illinitio abdominis ope olei hyoscyami cocti et camphorae⁴⁴⁾, aut succi recenter expressi radicis allii sativi. Vulgus in Lithuania cum successu ventri inungunt axungiam, quae rotis vehicularibus inservit.

11. Caeterum in cura februm verminosarum <sup>Finis argu-
menti.</sup> sicuti in aliis, postquam urgentibus indicationibus satisfactum jam est, etiam naturae tempus, ut operi coronam imponere possit, concedendum. Quod monitum eo majoris est momenti, quo minus febrem unice ex vermibus pullulare, constat. Tumultus verminosi, variis in morbis obvii, saepe remotis pharmacis dulcibus et clysteribus sedantur. Alias illis inter recensita anthelmintica ea, quae genio morbi aliisque rerum positionibus magis respondent, opponenda sunt.

CAPUT

43) l. c.

44) R. Olei hyoscyami unciam unam, camphor. r. drachmam semis.

CAPUT V.

De febribus nervosis.

§. XXVI.

De argumento in genera

Definitio. 1. *Febres continuas*, quae virium conspicuâ jacturâ, labefactione systematis nervosi et contradictione symptomatum stipantur, *nervosas* adpellamus.

Monita. 2. *Virium jactura* a vera illa debilitate, quae in omnibus fere morbis febrilibus occurrit, distinguenda est. Agitur nimirum hîc de virium jactura praegrandi, constante et reali, quae aegrum plus minus impotem reddit, motus voluntarios exercendi. Per *labefactionem systematis nervosi* etiam non intelligimus turbas illas transitorias nervorum, quae hominibus valde excitabilibus (e. gr. infantibus, feminis, hypochondriacis), dum qualicumque demum morbo febrili corripiuntur, communes sunt; sed affectionem constantem, quâ functiones sensuum, cerebri, medullae spinalis singulorumque nervorum, quin necessario phlogosi aut alio palpabili morbo tentati sint, conditionem abnormem sive exaltationis sive

sive stuporis prae se ferunt; *Contradictio symptomatum* in defectu nexus phaenomenorum morbi, quae alias in febribus animadvertuntur, consistit. Dum scilicet in reliquis febribus calor et oris conditio cum pulsum vi et siti rectam rationem servare solet; in febribus nervosis saepe cutis ardorem orisque siccitatem sine potus desiderio cumque pulsu debilissimo observabis. Observabis itidem aegrum mox in una corporis sui parte calentem, in altera frigescentem, moxque ita viribus exhaustum, ut poculum ori admoveere nequeat, et nihilominus sub delirii impetu per plures homines vix coercendum. Sub deterrima rerum positione suscitatus, et, quomodo se habeat, interrogatus, „bene“ respondebit.

3. Characteres gentilitii febrium nervosarum Distinctio
cardinalis.
modo sub decursu aliorum morborum ingruunt, modo immediate scenam aperiant. Dividimus hoc sub respectu febres nervosas in *secundarias* et *primarias*. Febres nervosae secundariae evolvuntur aut ex reliquis febribus, aut ex inflammationibus, exanthematibus, aliisque morbis. De his occasione datâ, de illis vero mox sermonem faciemus. Quum autem, characteres febris nervosae priusquam aliis in febribus ita evolvantur, ut earumdem formam deleant novamque ipsis imprimant, ut plurimum fieri soleat, ut utrarumque febrium symptomata societatem ineant; ratio patet, cur doctrinam febrium nervosarum, quas
secun-

secundarias compellavimus, una cum illa *complicationum* tradituri simus.

Aliae distinctiones.

4. Praeter divisionem febrium nervosarum in secundarias et primarias (quam propterea essentialem censemus, quod illarum quaevis peculiare quid ex morbo praevio retinet), aliae adhuc exstant etiam haud ignorandae divisiones. Loquimur de febrium nervosarum divisionibus in *acutissimas*, *acutas* et *lentas* (prout decursum aut unius alteriusve nychthemeri, aut nonnullorum dierum, aut plurium hebdomadum spatio absolvunt); in *nervosas proprie dictas* et in *putridas* (prout partes corpus humanum constituentes nexum conservant, ita, ut morbus *dynamicus* esse videatur, aut amittunt, ita, ut morbus solutionis vestigia offerat); et in *versatiles* et *stupidas* (prout systema nervosum statum aut exaltationis aut stuporis exhibet).

§. XXVII.

De febre nervosa ex inflammatoria.

Symptomata.

1. *Pronitas febris inflammatoriae ad transitum in nervosam*¹⁾ ut plurimum jam a morbi initio proditur. Talis enim febris prae omni alia symptomatibus prodromis²⁾ insigniri solet. Inter haec

1) MÉOLIN *mémoires sur les fièvres inflammatoires putrides* in SÉDILLOT *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*. T. 53. p. 329.

2) Cap. I. §. II. No. 1.

haec maxime dolor lumborum valet. Porro aspectus aegri quid peculiare, verbis vix designandum, exhibet. Physiognomia inprimis aut insolitam serenitatem, aut tristitiam manifestat. Sub illa aeger plerumque praeter consuetudinem loquax et impatiens est; sub hac taciturnus et mansuetus. Methodus antiphlogistica, quae alias morbi impetum saltem frangit, multum abest, ut solitum effectum praestet. Imo pulsus in febre inflammatoria simplici facta venaesectione, plerumque sese expandere solitus, hic potius contrahitur et variabilis fit. Pulsum enim, quem paulo ante durum tetigisti, elapsis aliquot horae momentis facillime comprimendum reperies. In nova febris exacerbatione calor cutis (licet nitro minime parcitum sit) major est, et quidpiam ingrati in manu explorantis relinquit. Morbo progrediente sub pulsuum exploratione motus aliquis involuntarius manus animadvertetur. Hunc plerumque tendinum subsultus secuturi sunt. Nec deerit passim profundum quoddam suspirium. Evacuationes, quae crisin absolvere deberent, potius cum detrimento accident. Quo magis sic aegritudo a tramite consueto deflectit, eo magis symptomata febris inflammatoriae evanescere, illaque febris nervosae caput extollere videbis. Jam facies ex rubro pallescit; jam sub majori licet oris siccitate potus non amplius expetitur; jam delirium soporque permanent. Haud paucis glandulae

dulae parotides alterutro in latere aut utrinque tumescunt. Haemorrhagiae e naribus, ano, visceribus uropoëticis accedunt, et cutis ecchymomatibus notatur. Alias praegressis copiosissimis sudoribus, anxietate et spasmis, pustulae miliformes ad regionem epigastricam, pectus et extremitates in conspectum veniunt. Haud raro decubitus ad nates dorsumque observatur, ad gangraenam pronus. Sphincteres officium recusant. Nisi crises febribus nervosis communes³⁾ contingant, interitus inevitabilis est.

Necroscopia.

2. Cadavera praeter citam putredinem, ecchymoses internas locaque sphacelosa praecipue tubi intestinalis, et congestiones cruoris in encephalo, nullum phaenomenon conctans exhibent.

Causae.

3. Ad complicationem nervosam febris inflammatoriae, adque transitum hujus in febrem nervosam prae ceteris *disponunt*: temperamentum sanguineum valdeque sensile, aetas juvenilis, maxime circa pubertatis epocham; onania, Venus, animi pathemata, zelotypia, abusus potuum spirituosorum. Causas *excitantes* sistunt: perversa medendi ratio, qua aut incendium, quod extingui deberet, calefacientibus augetur, aut vires methodo antiphlogistica justo severiori adhibita nimis deprimuntur⁴⁾. Etenim quid mirum, si primo

3) §. XXXI. No. 10.

4) J. B. TH. BAUMEZ *considérations sur les causes, qui font dégénérer en malignes les fièvres simples et bénignes.*

primo in casu chorda, quae ultro amplius tendi nequit, tandem rumpatur; aut in altero, si repetita sanguinis aliorumque humorum factura unacum jejunió vim vitae frangant? — Ad intelligendum transitum febrium inflammatoriarum in febres nervosas potissimum nexus perpendendus est, qui inter systema vasorum sanguiferorum et nervorum intercedit⁵⁾.

4. Ex ipso autem hoc nexu intelligitur, cur ^{Diagnosis.} transitorii nervorum tumultus, qui febribus inflammatoriis prae caeteris familiares sunt, non illico pro signo complicationis realis diatheseos inflammatoriae cum nervosa aut pro indicio transitus alterius in alteram haberi debeant. Ad complicationem aut transitum hujusmodi admittendum requiritur, ut symptomata nervosa permanentia sint, ut auxiliis antiphlogisticis resistent, utque cum aliis febris nervosae signis societatem in-
cant. Cavendum praeterea, ne tremores, potatoribus strenuis familiares, nec non affectio inflammatoria cerebri, medullae spinalis et singulorum nervorum, ejusque affectionis exitus in errorem ducant. Postremo non ignorandum, febres nervosas, de quibus agitur, plerumque decursum *acutum* absolvere.

5. Pro-

Mém. I. (De la saignée). Mém. II. (Des évacuans et de l'opium) in annales de la soc. de médecine de Montpellier. T. 21.

5) P. II. Vol. I. Sect. I. cap. I. §. III. No. 27.

Prognosis. 5. *Prognosis* illae febres habent admodum anxiam, et ex semiotica, infra tradenda⁶⁾, propius eruendam. Nisi enim aetas bonaque aegroti constitutio succurrant, ab artis conaminibus, hucusque notis, parum expectandum.

Cura. 6. Quae cum ita sint, a tumultuaria medendi ratione abstinendum, et quousque de curanda *complicatione* agitur, evitandum est, ne auxiliis antiphlogisticis vires vitales pessumdentur, neque excitantium ope incendium alatur. Illarum serie jam exbausta, inprimis praesentibus haemorrhagiis effrenibus et calore urente, ad *acida*⁷⁾ confugiendum. Sub rerum positionibus determinandis⁸⁾ interdum *lotioni corporis ope aquae frigidae* locus foret. Quodsi symptomata nervosa invalescant, pulsusque mollis sit; nil virtuti *aurae camphoratae cum nitro*⁹⁾, aut connubii *camphorae cum acidis vegetabilibus*¹⁰⁾ comparandum. Dieta juxta praecepta generalia¹¹⁾.

§. XXVIII.

6) §. XXXI. No. 10. 7) §. c. No. 30. 8) §. c. No. 22.

9) R. Camphorae granum unum. Nitri puri scrupulos duos. Amygdalarum dulcium decorticatarum drachmas duas. Sacchari albi unciam unam. Misce, sub continua trituratione affundendo aquae fontis q. s. ut fiat emulsio ad colaturam librae unius. S. Cap. omni hora cochleare majus.

10) R. Camphorae granum unum. Subige in uncia semis succi citri recensiter expressi, adde aquae fontis uncias septem. Syrupi citri unciam unam. S. Cap. ut supra.

11) §. cit. No. 17 sq.

§. XXVIII.

De febre nervosa ex rheumatica.

1. Febres rheumaticae *complicationem* nervo-Sympto-
sam dumtaxat circa tempus, quo alias solvi de-^{mata.}
berent, manifestare solent. Quod dum contingit,
ipse in febrem nervosam *transitus* praesto est.
Evolvuntur autem symptomata nervosa non nisi
lente. Primum inconsueta apparet virium jactura.
Dein lenia deliria et singuli tendinum subsultus
succedunt. Porro quamvis morbus in dies auctus
appareat, aeger tamen minus de doloribus, de
siti et vigiliis conqueritur. Diffluit ille plerum-
que sudoribus et diarrhoea. Primo in casu prae-
viis anxietate, crampis, praecipue surarum, ali-
quando singultu, miliare exanthema prodit. Hoc
nisi levamen repetitis eruptionibus saltem asserat,
febris nervosa omnibus numeris absoluta exspe-
ctanda est.

2. *Cadavera* modo serum in encephalo, et Necrosco-
specu vertebrali effusum, modo nihil morborum^{pia.}
exhibent.

3. Praeterquam quod symptomata nervosa sub Causae,
februm rheumaticarum decursu ex processu phlo-
gistico involucrorum pulpa nerveae oriri que-
unt¹⁾; alia adhuc illorum exstat ratio, nimirum
vis nerveae depressio per causas minus palpabi-
les. Loquimur de dolore, de vigiliis, de animi
pathematibus, de stricta nimis diaeta, de negle-
cta

1) Cap. II. §. XI. No. 2.

cta complicatione gastrica, de abusu methodi antiphlogisticae, diaphnoicae et vesicantium; de decubitu, deque defectu criseos, praecipue si aeger alioquin systemate nervoso debiliori instructus, aut in pubertatis epocha constitutus sit, sique annua constitutio regnans generatim febribus nervosis faveat.

Diagnosis. 4. Ut symptomata nervosa, quae ex processu rheumatico-phlogistico ortum ducunt, a reliquis, ex fonte minus materiali natis, distinguantur, potissimum ad morbi stadia et adspectum est respiciendum. Illa enim symptomata utplurimum vel sub primo morbi vigore, vel fugata praepostere quadam adfectione, antehac partes externas detinente, adparent, ac cum symptomatibus aut encephalitidi, rhachialgitidi, nevritidi aut hujusmodi inflammationum reliquiis conveniunt: haec contra (ut monuimus) in morbo propecto evolvuntur, cum denegata potius crisi, quam cum metastasi cohaerent, atque universi systematis nervosi labefactionem indicant. Interea ambas morbi condiciones invicem complicari posse, non inficiabimur.

Prognosis. 5. Casu hoc excepto, febres nervosae ex rheumaticis evolutae, minus ac reliquae periculum portendunt, dummodo aegrotantis constitutio, aetas, et positio domestica non obstept.

Cura. 6. Dum febris rheumatica transitum in nervosam minatur, causae hujus periculi, quousque in

in nostra est potestate, removendae sunt. Dolor rebellis aut animi pathema si excrucient aegrum somnumque arceant (dummodo complicatio gastrica desit); quidquam *pulveris Doveri*²⁾, aut *theriacae Venetae*³⁾ exhibetur. Diaeta severa cum pleniore commutatur. Latens adhuc affectio gastrica *tartaro emetico* in minima dosi abstergitur. Evacuationibus cruentis nimis debitus statuitur terminus, atque nitro, interdum nervis abdominalibus et forte sanguinis compagini inimico, valedicitur. Sudores inanes non amplius vi promoventur. Plagae, per adplicita vesicatoria, pretibai seri jacturam promoventia, aegrumque adhuc excruciantia, laesae, unguento saturnino sanantur. Quodsi illa, turpiter neglecta, ulcera gangraenosa excitaverint, haec ipsa illico ad artis regulas curanda⁴⁾. Item decubitus neglectus. Ubi debita per cutem crisia nondum obtineri potuerit, in usu *spiritus Mindereri*⁵⁾ continuandum. Et *vinum antimonii Huxhami*⁶⁾ tunc praec-

2) Grana duo bis, ter, spatio nycthemeri.

3) Adulto scrupulus dimidius et ultra vesperi.

4) §. XXXI. No. 27.

5) MASSUET *esprit de Minderer dans les fièvres adynamiques*. (*Annales de la soc. de méd. pratique de Montpellier*. L. XXVIII. p. 91).

6) R. Vini antimoniati Huxhami drachmae duas (quantenus granum unum tartari emetici continent). Aquae salviae uncias septem. Syrupi simplicis unciam unam. M. D. S. omni secunda hora cochleare majus.

Frank Prax. I. 1. 2.

praesto est. Arida cutis etiam ope spongiae aqua tepida imbutae lavari posset. Balnei tepidi administratione universi corporis debilitas praepediri solet. Partibus systematis nervosi praecipue labefactatis, quo propius id fieri potest, *sinapismi* aut *vesicantia* (saltem ad rubedinem usque) admoventur. Febre nervosâ magis magisque evolutâ, *radix angelicae archangelicae*⁷⁾ sese proprio nomine omnino dignam praestitit. Crescente adhuc morbo cum signis exaltationis — *radix valerianae sylvestris*⁸⁾: urgente stupore, *flores arnicae montanae*⁹⁾.

§. XXIX.

De febre nervosa ex catarrhali.

Symptomata.

1. *Febres catarrhales nervosae acutae*, sporadice cum symptomatibus epidemicarum insolitarum¹⁾ decurrere solent. Magna quoque inter symptomata illarum et typhi contagiosi²⁾, nec non pneumoniae nervosae³⁾ similitudo animadvertitur. Saepissime vero febrium catarrhalium nervosarum decursus lentus est, aut aliis verbis, saepissime febris catarrhalis in febrem *lentam nervosam* transit. Denegata nimirum illius circa septi-

7) Drachmae duae tresve pro infuso ad colaturam librae.

8) Drachmae duae pro libra infusi.

9) A drachma dimidia ad integram pro libra decocti.

1) Cap. III. §. XIV. No. 2.

2) P. I. Vol. II. Sect. II. Cap. I.

3) Pars II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXIV. No. 23.

septimum aut decimum quartum diem crisi, vires aegri in dies decrescunt, faciesque, in alterutro latere vicissim mox rubens, mox pallescens, collabitur, noctes sensim sensimque inquietae fiunt, tacitoque delirio stipantur, quae singula tendinum subsultus, tremores, diarrhoea serosa, aut sudores profusi, exanthema miliare, peticuloideum, et decubitus concomitantur, donec post tres, quatuor, imo, uti vidimus, sex hebdomades repetita criseos conamina ad convalescentiam, aut ad mortem ducant.

2. *Cadavera* mucum puriformem bronchia ^{Neeroscopia.} opplentem, ruborem membranae eorundem internae, saepe ad pleuram tum costalem tum pulmonalem propagatum, serum in cavitate thoracis (interdum etiam in encephalo) extravasatum, et haud raro exulcerationes tunicae mucosae intestinorum, praesertim ilei et coeci, glandulis mesenterii simul volumine auctis⁴⁾, exhibent.

3. Febres catarrhales nervosam indolem ac ^{Causam}quirere solent sub perversa curatione (methodo videlicet diapnoica aut antiphlogistica imprudenter adhibitâ, neglectaque complicatione gastrica), tempore autumnali et hiemali, annuâ constitutione alioquin febribus nervosis favente, et in hominibus gracilioribus, male nutritis, venere

M 2

ex-

4) J. C. WAGNER diss. sistens mutationes membranae intestinorum villosae in phthial tuberculosa et febre nervosa. Viennae 1824. p. 19.

exhaustis, animi pathematibus vexatis, inque aëro impuro degentibus.

Diagnosis. 4. In diagnosi febrium catarrhalium nervosarum instituenda, cavendum; ne cum illis confundamus 1° stadium invasionis *typhi contagiosi*⁵⁾; 2° *bronchitidem*⁶⁾; 3° febrem hecticam *ex vomica pulmonali*⁷⁾; 4° *turbas nervorum accidentales*, de quibus aurea verba protulit FRIDERICUS HOFFMANNUS⁸⁾; et 5° *hydrocephalum accessorium*⁹⁾, videlicet collectionem seri in encephalo, quae ex impedito reditu sanguinis a capite ob saepe repetitos conatus tussendi et muci in bronchiis collectionem oritur, quaeque febribus catarrhalibus fortioribus, aliisque pulmonum morbis¹⁰⁾ haud raro supervenit. Suspectae de isto morbo nobis erunt praesertim febres catarrhales, quae symptomata nervosa in infantibus aliis-

5) l. c.

6) Cfr. P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXIV. No. 13

7) A. 1807. Vilnae ad puerum duodecim annorum in consilium vocatus fui, qui ex febre catarrhali in phthisin ex vomica incidisse tradebatur. Quum vero tunc temporis alioquin grassarentur febres nervosae lentae, quum totus morbus vix tres hebdomades perduraverit, quum virum prostrationem magnam et delirium observarem, febris catarrhalis transitum in nervosam lentam, atque prognosin feliciorē, per eventum posthac omnino confirmatam, statui.

8) Med. rat. syst. P. I. Sect. I. Cap. VI. p. 135.

9) P. II. Vol. I. Cap. IV. §. XXIII.

10) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. X. §. LII. No. 7. (16)

aliisque hominibus, ad morbos capitis praedispositis, hepato praegrandi et systemate lymphatico labefactato instructis, exhibent, praecipue, ubi cephalaea gravis et vomitus praegressi fuerint, nec non pulsus lentior evaserit. Contra de legitima febre catarrhali nervosa testantur, systematis nervosi *universi* affectio, sub rerum conditionibus allatis¹¹⁾, una cum symptomatum contradictione atque maculis seu pustulis cutis, lente, uti descripsimus¹²⁾, evoluta.

6. Praeter periculum febribus nervosis in Prognosis. genere proprium, febres catarrhales nervosae et febres nervosae e catarrhalibus evolutae illud quoque, ex affecto pulmone pullulans, commune habent. Tale connubium prognosin (ex febrium nervosarum et reliquorum morborum pulmonalium¹³⁾ doctrina desumendam) efficit gravissimam.

6. In curando tam gravi morbo magna requiritur perspicacia. Duo continuo ante medentis oculos versari debent objecta: *febris* et *affectio bronchiorum*. Medendi ratio utrisque haud respondens, quousque licet, evitanda. Quodsi venaesectiones systema nervosum jam labefactarint, affectio autem bronchiorum cruoris missionem adhuc postulare videatur; ad *hirudines* inter

11) No. 8. 12) No. 2.

13) P. II. Vol. II. Sect. I. Cap. VIII. §. XXXIV. No.

14. 15. §. XXXV. No. 3. 12.

ter costas apponendas aut ad *cucurbitulas scarificantes* confugere oportet. Interea pectoris affectio hac sub rerum positione saepissime aut a muco, bronchia opplente, aut a sero, in pleurae cavis extravasato, pendet. Primo tunc in casu *tartarus emeticus*¹⁴⁾, aut, si diarrhoea obstaret, *radix ipécacuanhas*¹⁵⁾, exhibenda forent, eum in scopum, ut per stimulum nervis ventriculi illatum, etiam nervi pulmonum et universi corporis excitentur. Si vomitus alioquin non fuerit indicatus, loco tartari emetici *sulphur auratum antimonii* aut *kermes*¹⁶⁾ eligenda. In casu latentis extravasati, quid *stipites dulcamarae*, quid *radix ononidis spinosae*¹⁷⁾ in urina, hio segniter procedente, promovenda valeant, experiendum. *Radix polygalae senegae*¹⁸⁾ saepe utrique scopo respondet. Ubi vero ex constitutione aegroti atque ex morbis praegressis simul affectionem chronicam pulmonis arguere liceret, omnia pharmaca, pulmonibus specificam irritationem inferentia, evitanda sunt, et emollientibus standum. Interdum hic nihil aliud, quam *lae vaccinum* cum successu ad-

14) Drachma una vini antimoniatl Huxhami in libra decocti althaeae.

15) Quarta grani pars secunda quaque hora.

16) Tertia pars grani pro dosi, sexies nyctihemeris spatium repetenda.

17) Uncia semis cum drachmis duabus radicis althaeae ad colaturam librae.

18) Drachmae duae ad librae colaturam.

adhibemus. — Febre nervosa jam omnibus numeris absoluta, *Moschus*, inprimis *sulphuri aurato* antimonii junctus¹⁹⁾, optimos praestat effectus. Nec *aura camphorata* spernenda. Quodsi rerum positiones, quae *opii* usum in genere admittunt, hic locum obtineant, parvae doses *pulveris Doveri*²⁰⁾ indicantur. Regimen idem, ac in febribus nervosis lentis.

§. XXX.

De febribus nervosis ex gastricis.

1. *Febres continuas gastricas* (non exceptis Notis. iis, quae ex febribus intermittentibus nascuntur) prae ceteris omnibus saepissime aut *nervosam* ineunt *complicationem*, aut in ipsas *febres nervosas transeunt*. Quoniam febribus hisce vigentibus, partes corporis humani constitutivae plerumque nexum amittere et solutionis indicia (videlicet nisi genuinam putredinem, saltem proclivitatem ad illam) exhibere solent, illis potissimum nomen *putridarum*¹⁾ impertitum fuit.

2. Ecce

19) Pro adulto: R. Moschi boni grana tria, sulphuris aurati antimonii granum unum. Mucilaginis gummi arabici, syrupi simplicis aa unciam unam. Aquae fontis uncias quatuor. M. S. Cap. vase prius agitato unciam semis qualibet hora.

20) A grano uno ad grana duo pro dosi quarta quaque hora.

1) GERM. *Faul-Fieber*. ANGLO. *Putrid fever*. GALL. *Fièvre putride, fièvre adynamique*. ITAL. *Febbre pu-*

Literatura. 2. Ecce febres, circa quas (non semper absque confusione cum typho contagioso aliisque morbis) versati sunt: GALENUS²⁾, AETIUS³⁾, AVICENNA⁴⁾, PAULUS AEGINETA⁵⁾, ORIBASII⁶⁾, — FR. EMERICIUS⁷⁾, MOCK⁸⁾, ERASTUS⁹⁾, P. AE. CAPRILIUS¹⁰⁾, FR. AGUILLAR¹¹⁾, J. ZECCHIUS¹²⁾, ROMANUS¹³⁾, MINADOI¹⁴⁾, H. SAXONIA¹⁵⁾, LIDDELIUS¹⁶⁾, SENNERTUS¹⁷⁾, J. POMA¹⁸⁾, J. SCHY-
RO-

trida. HISPAN, Fiebre putrida; calentura putrida. LUSIT. Febre podre.

2) De febrium differentiis. L. II.

3) Tetrabibl. II. Serm. II. C. 74. 75.

4) Canon. L. IV. Gen. I. Tract. I. cap. I.

5) Lib. II. c. 16.

6) Synops. Lib. VI. c. 7. 8.

7) Febrium putridarum expositio et cura. Viennae 1552.

8) Diss. de febre sanguinis putrida. Basil. 1579.

9) Disputatio de febribus putridis. Basil. 1580.

10) Lib. III. de febribus putridis in genere et specie. Ferrariae 1591.

11) De febrium putridarum curatione. Valent. 1593.

12) De ratione curandi praesertim febres ex putri ortas. Rom. 1596.

13) Diss. de febre putrida et febre pestilenti. Würceb. 1597.

14) Diss. de febre ex sanguine putrescente. Patav. 1599.

15) De febrium putridarum signis et symptomatibus. Francof. 1600.

16) Diss. de febribus putridis. Helmstad. 1602.

17) De febribus Lib. II. c. I. — Diss. de febrium putridarum natura et differentiis. Vitebergae 1606. — Disp. No. III. de febrium putridarum natura. Viteb.

RONIUS¹⁹), DOERING²⁰), P. CAIMI²¹), REHE-
FELD²²), PH. JUSTI²³), ROLFINK²⁴), SCHUL-
TETUS²⁵), H. OCCHI²⁶), SALZMANN²⁷), BUS-
SOLI²⁸), BYFIELD²⁹), KLOECKHOF³⁰), REY-
NAL³¹), NAUHEIMER³²), PENROSE³³), CARGER³⁴),

SCHROE-

1628. — Disp. No. V. de febre synocha putrida et
ardente. Viteb. 1628.

18) De curandis febribus putridis. Panorm. 1603 et 1608.
— Quando in febribus putr. medicandum? Ibidem
1605.

19) Curatio febrium putridorum. Monspel. 1609.

20) Diss. putridarum febrium examen generale. Giess.
1612.

21) De febribus putridis judicationes. Patav. 1623.

22) Diss. de synocha putri vera. Erf. 1834.

23) Disputatio adversus Galenum de fomite putredinis in
febribus continuis putridis. Utini 1635.

24) Diss. de febre putrida in genera. Jen. 1638. —
Diss. de synocha putrida. Jen. 1666.

25) Diss. de febribus putridis in genere. Rost. 1646.

26) De pestilentibus et venenosis morbis. Lib. IV. Brix.
1650.

27) Diss. de febribus putridis continuis. Argent. 1654.

28) Praelectiones de recto praesidiorum usu in febribus
putridis. Papiae 1627.

29) *Management of small pox, and all putrid fevers.*
Lond. 1695.

30) *Histor. febris epidem.* 1742. V. opuscul. p. 1 sq.

31) *Essai sur la méthode de guérir les fièvres putrides,*
malignes etc. Paris 1763.

32) Diss. de febre putrida epidemica. Mogunt. 1765.

33) *Dissertation on the sore-throat, also on the putrid*
fever. Oxford 1766.

SCHROEDER³⁵⁾, LUTHER³⁶⁾, HOPPMANN³⁷⁾, POHLIUS³⁸⁾, WEICKARD³⁹⁾, X. FAUKEN⁴⁰⁾, S. HEYMEYER⁴¹⁾, GREGORY⁴²⁾, FORDYCE⁴³⁾, J. N. PEZOLD⁴⁴⁾, HALLER⁴⁵⁾, STAHLMANN⁴⁶⁾, C. H. SCHOBELT⁴⁷⁾, H. F. SETTEGAST⁴⁸⁾, OPIZ⁴⁹⁾, J. DACQUIN⁵⁰⁾,

- 34) Diss. curationem febrium continuarum putridarum spectans. Gryphiswald. 1766.
- 35) Diss. de febrium putridarum differentiis. Goett. 1768. Opuscul. T. II.
- 36) Diss. de febrium putridarum ortu ex humorum motu aut nimio aut tardiori deducendo. Erford. 1770.
- 37) Diss. de febre continua putrida. Lugd. Bat. 1771.
- 38) Diss. de febribus continuis putridis. Lipsiae 1772.
- 39) *Medicinisches Bedenken über das in Deutschland sich äussernde Faulfieber.* Fulda 1772.
- 40) *Das in Wien 1771 u. 1772 sehr viele Menschen anfallende Fäulungsfieber.* Wien 1772.
- 41) *Beschreibung der epidemischen faulen Fieber.* Augsb. 1772.
- 42) *Diss. on the putrid and remitting Marsh Fevers.*
- 43) *A new Inquiry into the causes, symptoms and cure of putrid and inflammatory fevers.* Lond. 1773.
- 44) *Abhandl. von Faulfiebern.* Leipzig 1773.
- 45) *Beschreibung einer im Canton Bern im J. 1762 beobachteten Epidemie von galligten und faulen Fiebern.* (Hannöver. Magazin. 1773. 20. St.).
- 46) Diss. examen remediorum in febribus putridis adhiberi solitorum. Gott. 1773.
- 47) *Beschreibung der Epidemie in der Altmark 1772.* Berlin 1773.
- 48) *Epitome historiae febrium putridarum a. 1754. nascentium.* Bonnae 1774.

QUIN⁵⁰⁾, WENZESLAI⁵¹⁾, FRITSCH⁵²⁾, OBERKAMP⁵³⁾, FOURNIER⁵⁴⁾, T. KIRBY⁵⁵⁾, J. J. PLANNER⁵⁶⁾, GRANT⁵⁷⁾, H. CALLISEN⁵⁸⁾, FR. VACCÀ BERLINGHIERI⁵⁹⁾, BILGUER⁶⁰⁾, VAN DER BELEN⁶¹⁾,
FR.

49) *Geschichte einer Epidemie gallichter, faulender u. böserartiger Fieber von 1771—72. Berlin 1775.*

50) *Mémoire sur la recherche des causes, qui entretiennent les fièvres putrides à Chambéry. Chamber. 1775.*

51) *Historia morbi epidemici seu febris putridae 1771 et 72. Pragae 1775.*

52) *De febre putrida in dioecesi Ripensi epidemico grassante ab a. 1770 ad 1774. (Soc. med. Havniensis collectanea. Vol. II. p. 213).*

53) *Diss. de febribus putridis. Hal. 1775. — Diss. de molestiis a febre putrida sanata relictis iisque pedisequis. Heidelbergae 1778. — Diss. de prophylaxi februm putridarum. Heidelb. 1780.*

54) *Observations sur les fièvres putrides et malignes. Dijon 1775.*

55) *De febre putrida libellus. Berolini 1775.*

56) *Febris biliosae putridae cum dysenteria per partem territorii Erfurtensis a mense Junio ad Decemb. anni 1775. usque grassantis brevis historia. (Act. acad. Mogunt. 1777. p. 232).*

57) *Von Fiebern. p. 288. 483.*

58) *Observata quaedam circa febre putridam a. 1779 et 1780. cum adjunctis monitis circa inefficaciam corticis peruviani et efficacissimam vim pulveris sinapis Anglicani. Acta R. soc. med. Havniaensis. Vol. I. p. 353.*

59) *Sulla febre detta putrida. Lucca 1781.*

60) *Ueber Faulfieber und Ruhren. Berlin 1782.*

61) *Diss. de febre putrida. V. Collect. diss. Lovan.*

FR. MILMAN⁶²), VIRY⁶³), PLOUCQUET⁶⁴), BORN⁶⁵), BANAU⁶⁶), HARTMANN⁶⁷), AASHEIM⁶⁸), GEMEINER⁶⁹), WERNISCHECK⁷⁰), HANLO⁷¹), C. MERTENS⁷²), TODE⁷³), W. GESENIUS⁷⁴), FR. A. ROEBER⁷⁵), EVANS⁷⁶), DOBER⁷⁷), A. OLM⁷⁸), M.

DE

- 62) *Enquiry into the Source, from whence the symptoms of the Scurvy and of putrid fevers arise.* Lond. 1782.
- 63) *Diss. de febre putrida.* Monspel. 1783.
- 64) *Diss. an febris putrida sit contagiosa?* Tub. 1783.
- 65) *Diss. de febre gastrica putrida.* Goett. 1784.
- 66) *Observations sur differens moyens propres à combattre les fièvres putrides et malignes.* Amst. 1784.
- 67) *Diss. de apothepia ex syncho putrida convalescentium.* Francof. ad Viadrum 1784.
- 68) *Diss. sistens febrem putridam nervosam.* Hafn. 1786.
- 69) *Diss. de vera febris putridae notione.* Erlang. 1786.
- 70) *Frage, woher entstehen so viele Faulfieber?* Wien 1786.
- 71) *Diss. de febribus in genere, et de putridis in specie.* Duisburgi 1787.
- 72) *Obs. de febribus putridis, de peste etc.* Vindob. 1778.
- 73) *Diss. de febre putrida genuina.* Havn. 1788.
- 74) *Ueber die Epidemien gallichter Faulfieber 1785—86.* Leipz. 1788.
- 75) *Beschreibung eines epidem. Faulfiebers, welches vom Ausgange des Jahres 1787 bis 88 in Dresden herrschte.* Dresden 1790.
- 76) *Diss. de febre putrida.* Edinb. 1790.
- 77) *Diss. de febre putrida malignitatis aliarum febrium causa frequentissima.* Lips. 1791.
- 78) *De febribus syncho putrido biliosis, quae epidemice in nosocomio Florentino annis 1791 et 92 grassatae sunt.* Florent. 1792.

DE MAN⁷⁹), MELBER⁸⁰), J. HALLIDAY⁸¹), J. S. SAUME⁸²), GERTR⁸³), G. E. CANZ⁸⁴), J. S. VAUME⁸⁵), A. STAUR⁸⁶), W. ROWLEY⁸⁷), DAUME⁸⁸), AYGOBERE⁸⁹), A. FR. HECKER⁹⁰), C. J. KILIAN⁹¹), RUETTE⁹²), MONFALCON⁹³) etc.

3. Fe-

- 79) *Abhandl. über das böartige Faulfieber. Leipzig 1794.*
- 80) *Diss. de febre putrida ex principiis Brunonianis explicata. Jen. 1794.*
- 81) *A short account of the origin, symptoms and — method of treating the putrid fever, commonly called the black vomit. Lond. 1795.*
- 82) *Traité de la fièvre putride. Paris 1796.*
- 83) *Diss. de febris putridae nervosae historia cum episcrisi. Jen. 1796.*
- 84) *Beschreibung einer Sch'eim-, Faul- u. Nervenfieber-Epidemie. Tübing. 1796.*
- 85) *Traité de médecine pratique sur les remèdes généraux et sur la fièvre putride. Paris 1798.*
- 86) *Sichere Heilart der faulartigen Fieber. Strassb. 1802.*
- 87) *Treatise on putrid and infection fevers. Lond. 1805.*
- 88) *Traité de la fièvre putride. Paris l'an VI.*
- 89) *Diss. de febre adynamica seu putrida. Paris. 1808.*
- 90) *Ueber die Natur u. Heilart der Faulfieber. Berlin 1809.*
- 91) *Das Faul- u. Nervenfieber. Bamberg 1809.*
- 92) *Observations cliniques sur une maladie épidémique, qui a régné à l'hospice du Nord. Paris 1811.*
- 93) *Mémoire sur la question: déterminer le caractère de l'adynamie dans les fièvres putrides avec des considérations sur les fièvres ataxiques. (Journ. complément. etc. T. XVI. 61. cah. p. 1. T. XVII. 67. cah. p. 193. 68. cah. p. 289).*

Sympto-
mata.
Compli-
cat. 3. Febres gastricae nervosae virium incon-
suetâ jacturâ potius per impotentiam ad motus
voluntarios, quam per sensum ipsius aegroti co-
gnoscentâ insigniuntur: sensus enim iste omni
sub respectu jam obtusus est. Sic caput dolore
obtuso, sedem praecipue ad basin cranii habente,
tentatur. Oculi, utut subrubri, lucem nihilomi-
nus saepe ferunt. Intuitus a statu consueto re-
cedens, dejectus est. Aures plerumque tinnunt.
Nasus siccus. Lingua arida. Abdomen inflatum,
tensum, percussum resonat. Calor cutis crescente
morbo magis magisque mordax fit; pulsus autem
debilior et crebrior. Evacuationes alvinae leva-
men vix asserunt.

Sympto-
mata
transitus. 4. Evoluta jamjam febre nervosa *gastrica*,
symptomata allata invalescunt. Praeterea subsul-
tus tendinum, tremores, deliria, modo taciturna,
modo furiosa, superveniunt. Item maculae cutis
rubrae, lividae, nigrae, variae magnitudinis et
figurae, rotundae videlicet et longitudinales (vi-
bices). Cutis loca, quae decumbendo compri-
muntur, mox rubedine et paulo post gangraena
notantur. Haec quandoque sponte ad aures, na-
res, aliasque corporis regiones comparet. Cutis
sudoribus, iisque interdum olentibus⁹⁴⁾, coope-
ritur. Faeces quandoque foetidissimae, relaxatis
plerumque sphincteribus, cum virium decremento
et meteorismi augmento, crebro evacuantur. San-
guis

94) DE MAN L. c. p. 28.

guis e naribus, ore, ano, vagina manat, modo nihil morborum offerens, modo alteratus, cum crusta scilicet, uti vidimus, inflammatoria, alias solutus brevique putrescens. Interdum urina (in genere profundius tincta, brunea, cum sedimento coloris lateritii, aut plumbei) cruenta. Aeger gravissimo in casu sopore detentus, secum obmurmurans, ore aperto, dentibus et naribus nigris, cute flavescente, resoluta alterutra palpebra superiore, interdum cum tumoribus glandularum et emphysemate, nec non aphthis, devolutoque ad fundum lecti corpore, cruribus divaricatis decumbere, floccos capere, stragula colligere, rhonchos ducere, lipothymias, convulsiones, et singultum experiri solet. Quae singula symptomata usque ad solutionem morbi (circa decimum aut decimum quartum, rarius vigesimum primum diem contingere solitam) perseverant, quo scilicet tempore aegritudo sub rerum positionibus mox infra fusius indicandis, aut in sanitatem, aut in alios morbos, aut in mortem terminatur.

5. *Cadavera* sic defunctorum calorem, vi-
 tali paululo minorem, sat diu retinere⁹⁵⁾, raro
 rigiditatem, cadaveribus alias propriam acquirere
 et cito putredinis indicia prae se ferre solent.
 Praeter easdem nimirum maculas, quae sub mor-
 bi decursu animadversae fuere, ecchymomata ni-
 gra, livida, subviridescencia, flavescentia passim
 in

95) HALLER element. physiolog. Lib. VI.

in corporis superficie cernuntur. Praecipue iisdem notatur abdomen, admodum inflatum. Intestinorum, potissimum ilei et coeci, superficies externa ulceribus obsita⁹⁶⁾. *Cerebri* vasa interdum turgida, pia mater inflammata, non sine indicibus vel liquoris serosi, et cruoris in encephalo extravasati⁹⁷⁾, vel suppurationis⁹⁸⁾. Saepissime pulmones, ventriculus et intestina corrupta⁹⁹⁾.

CAUSSAE. 6. Ad *causas*, quae aut complicationem nervosam febrium gastricarum, aut earum in nervosas transitum gignunt, spectant (ne amplius dicamus de peculiari epidemica constitutione) vis saburrarum, bilis, pituitae et vermium tum in universum systema nervosum tum in massam humorum. Neglecta nempe, aut impedita per incongrua pharmaca, in febribus gastricis primarum viarum debita evacuatione, et quidem praesertim in climate calido, inque regionibus uliginosis; quid mirum, si corruptae hic materies (instar

96) WAGNER diss. citata p. 18 sq.

97) BANG in Act. R. soc. med. Havniens. Vol. I. p. 113. 260. 275. 289. Vol. II. p. 89. 252. 279. Vol. III. p. 124 sqq. MAN l. c. p. 112.

98) DE MAN l. c. — GUETTARD in *Mém. de l'Académie des sciences* 1754. p. 304.

99) LIEUTAUD *hist. anat. med.* Lib. II. observ. 297. — FORLANI observ. Dec. I. No. 1. — FERRO *med. Ephemerides.* p. III. — HOPTENGÄRTNER in *HUFELAND's Journ. der prakt. Heilkunde.* 1. B. p. 490.

(instar placentae relictæ¹⁰⁰⁾, foetus putrescentis¹⁰¹⁾ etc.¹⁰²⁾) simul et nervos afficiant, et sanguinem contaminent? Nervorum talis affectio multum cum illa, a venenis narcoticis et a typhi contagio excitata, convenit. Quoad sanguinis contaminationem, haec primum a GALENO, *putredo* nuncupata fuit. A magno autem viro per *putredinis* nomen minime consuetam putredinem, cui substantiae animales demortuae subjiciuntur, intellectam fuisse, sed dumtaxat *specificam* illarum *depravationem*, ut propria ejusdem¹⁰³⁾, ita classicorum auctorum¹⁰⁴⁾ verba abunde testantur. Interea permultos medicos *putredinis* vocabulum ad literam sumsisse, illorum conamina, virtutem *remediorum antisepticorum* in corpus humanum vivum per experimenta cum carnibus demortuis determinandi¹⁰⁵⁾, probant. Grati itaque animi tribu-

100) STARCK *Archiv.* 1. B. 4. St. p. 7. — GEXSON in Act. R. soc. med. Havniensis. Vol. 2. p. 204.

101) STARCK l. c. 2. B. 1. St. No. 8. p. 78.

102) KIRKLAND *on child-bed fevers.* p. 129. (Sanguis in vulnere relictus et putrescens).

103) „Putredo autem humorum, quae fit in vasis, similis (putredini), quae in inflammationibus fit, et abscessibus et aliis phymatibus. . .“ (l. c.).

104) ALEX. TRALLIANUS Lib. XII. p. 696 sq. — SWIETEN comment. in aph. Boerhaavii §. 730. — LUDWIG institut. med. clin. P. I. Cap. I. §. 241. in not. — LIEBTAUD synops. univers. prax. med. Lib. I. Sect. I. — BURSERIUS institut. T. I. §. 260.

105) W. ALEXANDER *experimental essays on the external* Frank Prax. I. 1. 2.

tributus absolvendus est viris, qui insanam istam putredinis doctrinam impugnarunt, quique putredinis in morbis signa, quatenus ex *foetore*, ex *conditione sanguinis*, ex *antisepticorum virtute et e cita putredine* derivantur, severae disquisitioni subjecerunt¹⁰⁶). Ex ista elucet: 1° evacuationes corporis humani caeteroquin sanissimi (e. c. halitus oris, pedum sudor), atque vegetabilia et animalia incolumia (e. c. *mustela erminea* L.) intollerabilem aliquando foetorem manare¹⁰⁷); 2° sanguinem in febribus sic dictis putridis non semper fluidiorem esse, sed imo ad coagulum interdum

¹⁰⁶ application of antiseptics in putrid diseases. Lond. 1768. (Vers. german. Lips. 1773). Cfr. opus: Ueber die Kenntniss lebender und todter thierischer Körper, über Faulkrankheiten u. fäulnißwidrige Mittel. Hildburgh. 1795.

106) FR. VACCA BERLINOHERI l. c. — BURSERIUS l. c. — J. P. FRANK delectus opusc. med. T. VIII. — A. SEIBERT über die Fäulniß des Blutes im thierischen Körper. A. d. B. Berlin 1798. — PARMENTIER et DEJEUX in Journ. de physique. T. I. P. I. p. 435. Vid. REIL's Archiv für die Physiologie. I. B. 3. H. p. 1.

107) „Foetet interdum vel sanissimus oris halitus, foetent sudores, alvi excrementa vehementer foetent, foetent etiam urinae, foetent ulcera cum exteriori aëre communicantis; imo animalis quaedam putridissimam undique mephitim exhalant. An inde colliges, in istis corruptum esse sanguinem per vasa clausa decurrentem, verique putredine jam affectum?“ — BURSERIUS l. c. §. 259.

dum promptum; 3^o remedia antiseptica modo quidem antiseptico in materiam mortuam agere, longe vero aliter in corpus humanum vivens, ut quod ex ipsa frigoris actione, ibi putredinem arcente, hic autem (uti tot aurium nariumque gangraena sub rigidissima hieme testatur), provocante, patet; et 4^o cadaverum corruptione *dispositionem* quidem ad putredinem, ceu morbi effectum, neutiquam vero *ipsam putredinem*, ceu morbi *causam* indicari. Haec enim vitae adeo opposita est, ut putredine certius non detur mortis signum, utque vel guttula putridi ichoris massae sanguinis admixta mortem producat. Altera vero ex parte constat, ichore putrido absorpto in animalibus febres excitari, symptomatibus, quae vix recensitis sat similia sunt, stipatas¹⁰⁸⁾. Quodsi contra talem absorptionem obijciatur, exstare animalia et homines, qui putridis cibis sine damno vescuntur, respondetur ista tubum intestinale breviorē habere¹⁰⁹⁾, hūque in statu sano aliis, quam durante morbo, legibus vitae regi. — Licet itaque *febrium putridarum* nomen, saltem pro specie febrium nervosarum, quae ex gastricis evolvuntur, retinere, idque eo magis, quum medici aevi nostri veram

N 2

VOCA-

108) *Second mémoire physiologique et médical sur les maladies putrides* par B. GASPARD Doct. med. a St. Etienne (*Journ. de physiologie experiment.* Janvier 1824).

109) GASPARD l. c.

vocabuli „*putredinis*“ significationem unanimi consensu acceperint, ideoque nil amplius mali ex illius falsa interpretatione timendum sit.

Diagnosis. 7. Quoniam ex immediata et locali saburrarum, bilis et vermium actione in tum intestinalem, *virium* quoque *jactura* oriri potest, haec probe ab illa, quae sequelam affectionis universi systematis nervosi et humorum sistit, distinguenda. Distinguitur habita ratione effectus emeticorum et purgantium, quae ibi vires vitales illico restaurant, hic vero potius prosternunt. Praeterea ad *phlogoses occultas*¹¹⁰⁾, neutiquam in dubium vocandas¹¹¹⁾, respiciendum est, ne videlicet symptomata, ex illis nascentia, statui febris nervoso adscribantur. Verum et contrarius error, temporibus nostris familiaris, evitandus. Neque phlogosis statui nervoso semper opposita censenda est; ipsae etenim ophthalmiae aperte docent, dari phlogoses, quae loco methodi antiphlogisticae pharmaca exposcunt, pro re nata jam excitantia, jam narcotica. Phlogoses hujus generis quammaxime ad *ecchymomata* accedunt. Sicuti ista obvenire solent in scorbuto, ita quoque in febre

110) WEINHOLT diss. de occultis viscerum hypochondriacorum inflammationibus in febribus bilioso-putridis. Goett. 1772. REYLAND tract. med. pract. de inflammationibus latentibus. Ingolst. 1787. (Vera. Germ. Vindobon. 1790).

111) MECKEL, dubia quaedam circa inflammationes occultas in putridis. Hal. 1788.

febre putrida, quam jam pridem pro specie *scorbuti acuti* declarare ausi sumus¹¹²). Utut sit, ecchymomata, febribus putridis communia, non praepostere pro peticulis habenda sunt¹¹³). Maxime vero interest, ut ab illa febre *typhus contagiosus* distinguatur¹¹⁴).

8. Nil magis *diagnosin* febrium nervosarum Continuatio argu-
mento et
prognosis. ex gastricis evolutarum adjuvat, illarumque naturam et prognosin dilucidat, quam respectus ad peculiarem illarum originem et indolem. Sic in febre putrida post gastricam *ex ingluvie* dijudicanda¹¹⁵) ad facilem cum phlogosi mesenterii et peritonaei confusionem cogitandum, hacque absente, prognosis vix atro carbone notanda erit. Contrarium de periculosissima febre nervosa valebit, quae *ex alimentis pravae indolis* ortum ducit¹¹⁶). Nomen *putridae* illi praesertim tunc conveniet, si de carnibus animalium, morbie contagiosis necatorum, agitur¹¹⁷). *Saburrae secundariae* potissimum in febribus nervosis scenam ludunt,

112) In prima hujus operis editione, P. I. Vol. I. §. LI. No. 7. — Cfr. F. M. MERCIER *observations du scorbut aigu et du scorbut chronique compliqués de fièvre adynamique*, p. SEDILLOT. *Rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*. T. 49. p. 135.

113) Cfr. Cap. VII. de peticulis et P. I. Vol. II. Sect. III. Cap. de ecchymomate.

114) Cfr. P. I. Vol. II. Sect. II. Cap. I.

115) Cap. IV. §. XX. No. 8. 116) Ibid. §. XXI.

117) Ibid. No. 7.

ludunt, quae sub finem aliorum morborum febrillum evolvuntur ¹¹⁸), quaeque saepissime lente decurrunt. Ubi febris *gastrico-biliosa* in nervosam transit, plurima perpendi debent, primo videlicet similitudo morbi cum *phlebitide* et *hepatitide* ¹¹⁹); deinde *consensus jecinoris cum cerebro*. Ex hoc etenim consensu (praesertim in hominibus alioquin chronica hepatis labe notatis, et maxime in strenuis potatoribus, nec non in hominibus obesis) symptomata saepe oriuntur nervosa, neutiquam labefactioni universi systematis nervosi tribuenda. Atque hic non solum de consensu loquimur, qui inter indicata viscera *nervorum* ope existit, sed et de alio *mechanico*, quatenus hepar morbose turgens, pulmonem dextrum sursum pellit, quo fit, ut, compressa venâ cavâ descendente, impeditaque in illam evacuatione jugularis dextrae, cerebri ejusdem lateris hemisphaerium (plethorae localis causa) comprimitur, sicque torporis excitentur phaenomena. Haec ab illis, quae e febribus nervosis pullulant, discernimus eo, quod accedente epistaxi cruor solum ex nare dextra manat, nervorumque affectio maxime in latere opposito apparet, quum in febribus nervosis stillicidium sanguinis indiscriminatim ex utraque nare fieri, et systema nervosum utriusque lateris adfici soleat. Quoniam autem febres continuae gastrico-biliosae, quae

in

118) Ibid. §. XXII. No. 6. 119) §. XXIII. No. 16.

in nervosas transeunt, haud raro prius ad classem *februm intermittentium* pertinuerunt¹²⁰⁾, et haec numquam praetervidenda est origo, siquidem tunc febris, utut continua reddita, nihilominus remissiones solito majores prae se ferre solet. In *febre nervosa ex gastrico-pituitosa*¹²¹⁾ eadem circiter phaenomena, quae sub febribus catarrhalibus nervosis in bronchiis obveniunt, tubus intestinalis offert. Patet hinc, cur multum quoque ad inflammationes, quae hic latere possent, respiciendum sit. *Febres verminosae* dum aut complicationem nervosam ineunt, aut in febres nervosas transeunt (cujus multa vidimus exempla, videruntque alii¹²²⁾), praeter universi systematis ner-

120) SYLVIVS DE LA BOË tractatus de affectu epidemico, qui ab Aug. 1669 ad Jan. 1670 in Leidensis urbis ci-
ves saevit. — GUIDO FANON diss. med. de morbo
epidemico aestate a. 1669. Lugduni Batavorum vicin-
isque locis grassante 1671. — P. I. Vol. I. Sect. I.
Cap. II. §. XXIX. No. 7. Cfr. VAN HOVEN *Versuch*
über das Wechselfieber. 1. B. p. 116. — LOUIS *fièvre*
intermittente-gastrique du type tierce, suivie d'une fièvre
adynamique continue. GRAPPEON *Bulletin des sciences*
médicales. T. III. p. 230.

121) TH. G. SCHROEDER historia febris bilioso-pitui-
toso-putridae, quae ab initio Decembris 1783. ad finem
Augusti 1784. in Hassiae regionibus grassata est. GOETT.
1784.

122) EYSEL diss. de febre infantum putrida, ex putre-
dinali vermium seminario orta. Erford. 1693. — BON-
NEVAULT in HAUTZSIECK *recueil*. T. II. p. 228. —

nervosi labefactionem (effectum repetitae irritationis, quem nervi abdominales a vermibus experti sunt) etiam de sanguinis possibili infectione ex putredine istorum hospitum, cogitare oportet. Febris putrida, sub hac rerum positione nata, admodum periculosa est.

Cura. 9. In febre tam nervosa gastrica, quam nervosa ex gastrica, curanda, *peculiaris illius speciei* ratio haberi debet. In genere quo magis vomitoria et purgantia jam adhibita fuerunt; tanto cautius eadem ulterius praescribenda sunt. Altera vero ex parte omnia, quae evacuationibus spontaneis vel minimum opponere possent obstaculum, sedulo fugienda. Quodsi evacuationes alvinæ, praesertim in morbo primam originem *ex saburris* trahente, desiderentur, et calor cutis non fuerit nimis ardens, *radix rhei palmati*¹²³⁾, ita porrecta ut alvus nychthemeri spatio bis moveatur,

COLIN in *Journ. de médecine*. T. XIX. p. 214. — DE LABROUSSE ibid. T. XXIX. p. 498. — MARIE *observation sur une fièvre putride vermineuse, qui a régné à Ravenne*. ibid. T. XXI. p. 250. — PENAN *observation d'une fièvre adynamique compliquée d'affection vermineuse avec perforation de l'intestin ileum*. Vid. GRAPERON *Bulletin des sciences médicales*. T. III. p. 105. — DU CLOU ibid. T. LXF. p. 204. — DUFOUR ibid. T. LXVI. p. 430.

123) R. Radicis rhei drachmam semis. Ebull. per horae momentum c. s. q. a. aquae colat. unciarum septem.
D. S. omni secunda hora cochleare majus.

veatur, conducit. Si opus fuerit, simul *clysteres* injiciuntur. Auctae per alvinas evacuationes debilitati, *vino*, aut puro, aut aquae nupto ¹²⁴⁾ occurritur. Calore cutis usum rhei et vini impediēte, alvinas evacuationes si langueant, *tamarindis* sollicitandae, aestus, *nitro* temperandus; ac vires (dummodo pulsus molles sint), *camphora* sustinendae ¹²⁵⁾. Praeterea parvae *tartari emetici* doses uno eodemque tempore et alvum sollicitant et systematis nervosi energiam erigunt. — Haec ipsa methodus *febris* quoque *bilioso-nervosis*, et *putridis ex biliosis* convenit. Evacuatione alvi per se rite procedente, pulsu adhuc irritato, praesentibus ecchymomatibus, inprimis si haemorrhagiae ingruerent, ad *acida mineralia* deveniendum ¹²⁶⁾, eaque, si tubus intestinalis praeter modum irritabilis sit, in vehiculo mucilaginoso ¹²⁷⁾ porrigenda. Ubi vires magis magisque

124) Cyathus vini pro cantharo aquae addito saccharo gratum hic potum constituit; item limonada cum syrupo taphiae.

125) Videlicet omni sesquihora alternatim tenue decoctum tamarindorum, et pulveres cum nitro et camphora, de quibus supra. Potest camphora quoque ipsis tamarindis jungi, vel in aceto soluta exhiberi. (JAEGERSCHMIDT diss. de aceti camphorati usu tam interno, quam externo in morbis putridis salubri. Marburgi 1792).

126) §. XXXI. No. 30.

127) R. Decocti salep libram, acidi sulfurici diluti et syrapi rubi idaei q. s. ad gratum saporem acidulum.

que collabuntur, turbaeque nervorum una cum meteorismo urgent, quantocius ad *semina sinapis Anglicanae*, utpote remedium hic e caeteris praestantissimum, confugere oportet¹²⁸). Ista in hocce casu virtuti *corticis peruviani* omni jure anteponuntur¹²⁹). *Corticem* generatim febribus putridis neutiquam convenire experti sumus, tribus dumtaxat casibus exceptis, ubi scilicet aut morbus (conspicuis adhuc insignitus remissionibus) primam originem ex febre intermittente neglecta traxit, aut gangraena stipatus apparet, aut praetermodum in longum trahitur¹³⁰). Decocti forma hucusque usi sumus¹³¹). *Sinapis* virtutem aemulantur radix *serpentariae Virginianae*¹³²),
et

128) R. *Seminum sinapis Anglicanae* drachmas duas. Ebulliant per horae momentum c. s. q. aquae ad colaturam librae unius. Adde: syrupi acetositatis citri unciam unam. S. Cap. omni secunda hora unciam unam. In pulvere dosis sinapis est a granis decem ad viginti qualibet vice. (BANO ad drachmam porrexit!).

129) CALLISEN l. c. et BANO l. c.

130) Limitatur quoque corticis laus in febribus putridis a VASTAPANI (de china-china in synochia putrida animadversiones. Argentorati 1753), et verisimiliter ille nunquam ad febres nervosas in genere curandas admissus fuisset, nisi hypotheses de putredine et de aesthenia ad illius usum impulissent.

131) Nunc forte *cinchonina* aut *sulphas chininae* adhiberi possent.

132) Drachmae duae pro libra iufusi. Cfr. DE MAN l. c. p. 99. 102.

et flores arulcae¹³³⁾. De usu valerianae in febribus verminosis nervosis jam diximus¹³⁴⁾ quacunque demum in febre putrida, viribus vitalibus quammaxime dejectis, juxta indicationes infra stabiliendas¹³⁵⁾, ad camphoram, spiritum cornu cervi, aetherem et vesicantia confugiendum.

10. Ne vero credatis, artem, febribus gastrici-Monitum. co-putridis medendi, in administranda farragine pharmacorum consistere¹³⁶⁾! De memorabili isto argumento aequae ac de febrium putridarum regimine diaetetico deque cura singulari symptomatum et convalescentiae in paragrapho sequente disseretur.

§. XXXI.

De febribus nervosis primariis.

1. Febres, quae signis gentilitiis nervosa-Introductio.
rum¹⁾ incipiunt (si typhus contagiosus aliaeque febres pestilenciales, ut decet, excipiantur), sane rarissimae sunt, attamen aliorum ad exemplum²⁾ neutiquam negandae³⁾. Duplex illarum conspiciatur

133) Cfr. §. XXXI. No. 31.

134) Cap. IV. §. XXV. No. 10. 135) §. XXXI.

136) GOLDHAGEN diss. de abusu excitantium in febribus putridis. Hal. 1790.

1) §. XXVI, No. 2. 2) STOLL aphor. 708.

3) Vere ait RAIMANN l. c. §. 108. „Das ursprüngliche Nervenfieber, welchem der nervöse Charakter ursprünglich und wesentlich zukommt, ist keineswegs zu läugnen, obgleich es höchst selten vorkommt.“

citur forma, altera *acuta*, altera *lenta*. Ambabus symptomata *prodroma* praecedere solent.

Sympto-
mata pro-
droma.

2. Spectant huc: sensus aegritudinis vix verbis designandus⁴⁾, animi insolita irritabilitas et dejectio, pallor faciei cum rubore alternans, capitis stupor, vertigo, somnolentia, somnia terrificas, aurium tinnitus, sapor oris alteratus, oculorum splendor imminutus (interdum auctus), lacrymatio involuntaria, artuum gravitas plumbea, gressus impotentia, dolor lumborum, crampi, sudores spontanei, urina multa, alvusque modo obstructa, modo laxata.

Sympto-
mata febr.
nervos.
acutae.

3. Imminente febre nervosa *acuta* (quam potissimum descripserunt: VOGEL⁵⁾, NUGENT⁶⁾, LYNCH⁷⁾, SELLE⁸⁾, NEBEL⁹⁾, BÜTTNER¹⁰⁾, G. DE HINTE¹¹⁾, WIECHERT¹²⁾, BENIER¹³⁾, PLOUCQUET¹⁴⁾, HERZ¹⁵⁾,

4) GALL. *Malaise*. POLON. *Nuda*.

5) Diss. de febre nervosa ejusque genuina indole. Goett. 1767.

6) Diss. de febre nervosa. Edinb. 1780.

7) Diss. de febre nervosa. Lugd. Batav. 1781.

8) *Neue Beyträge zur Natur- u. Arzneywissenschaft*. Berlin 1782. 1. B. p. 72 sq.

9) Diss. de cognatione febrium nervosarum cum sic dictis malignis. Heidelberg. 1785.

10) Diss. de febribus nervosis acutis. Gött. 1785.

11) De febribus nervosis et intermittentibus cogitata quaedam. Halae 1786.

12) Diss. de febribus nervosis. Jen. 1787.

13) Diss. de febre nervosa. Lugd. Batav. 1787.

14) Diss. de febribus nervosis. Tubing. 1788.

HERZ¹⁵⁾, C. W. HUFELAND¹⁶⁾, PETERSEN¹⁷⁾, BECK¹⁸⁾, GILS¹⁹⁾, NOEHDEN²⁰⁾, MECK²¹⁾, J. G. RADENACHER²²⁾, MIANOWSKI²³⁾, A. F. HECKER²⁴⁾, G. BICKER²⁵⁾, RICHTER²⁶⁾) symptomata prodroma elapsis nonnullis diebus illis excipiuntur, quae feбри conveniunt, socia haud raro lipothymiâ. Quo tempore *frigus* partes corporis externas detinet, internae aliquando aduruntur, et vice versa. *Calor*, raro aequabiliter diffusus, maxime in facie, volis manuum plantisque pedum viget, et quandoque adeo urens observatur, ut aegrotum sine sensu ingrato tangere nequeas.

Cutis

- 15) Observationes de febribus nervosis. Berol. 1789.
- 16) Bemerkungen über das Nervenfieber und seine Complicationen in den Jahren 1796, 97 u. 98. Jena 1798.
- 17) Diss. de febris nervosae natura et origine. Jenae 1796.
- 18) Diss. an datur febris nervosa acuta? Gott. 1796.
- 19) Tentamen aetiologiae febrium nervosarum acutarum. Hannov. 1797.
- 20) Diss. de natura febrium nervosarum acutarum. Gott. 1797.
- 21) Diss. de febris nervosae natura ac progenie. Erf. 1798.
- 22) Beschreibung einer neuen Heilart der Nervenfieber. Berlin 1803.
- 23) Diss. therapiam febris nervosae exhibens. Vilm. 1807.
- 24) Ueber die Nervenfieber. Berlin 1807.
- 25) Einige Bemerkungen über die Nervenfieber. Bremen 1807.
- 26) Diss. de febribus nervosis. Erlang. 1810.

Cutis sicca est, aut sudoribus partialibus cooperta. *Pulsus* interdum sanis lentiores, ut plurimum parum frequentes, inconstantes, inaequales, saepe debiles et contracti; venae jugulares ad aspectu pulsant. Sic et regio epigastrica, saepe una cum hypochondriis tensa. Nihilominus plerumque *sitis* desideratur, quin interdum potus fastidiri solet²⁷⁾. Lingua rubra, modo sicca, modo humida. Vox acuta, flebilis, vel profunda et rauca; locutio suspiriis intercepta. Febris horis indeterminatis semel bisve de die exacerbatur. Remissiones in dies minus fiunt evidentes. Aeger potissimum tempore nocturno anxius est; et agrypniâ excruciat. Multi in coma vigil incidunt, surdescunt, delirant, fugam tentant. In nonnullis priapismus, singultus, catalepsis²⁸⁾, et saepius tremores et subsultus tendinum observantur. Nec desunt, qui meteorismum, diarrhoeam, parotidum tumores, salivationem patiantur. Urina jam multa et limpida, jam pauca et ignea, jam nulla. Interdum lotii incontinentia, retentione quandoque complicata, adest. Morbus circa diem quartum, septimum, decimum vel decimum quartum ad acmen perductus, aut praevio quodam terrifico symptomate (e. c. convulsionibus,

27) TRIBOLET DE LA LANCHE de hydrophobia sine morbo praevio. (BALDINGERI opusc. Vol. I. p. 236).

28) RENARD in HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 1815. Juny.

bus, lipothymia²⁹⁾), accedente somno, facto pulsa regulari magis ac elevato, reddita cute, sub medico universali sudore, tractabili, succedentibusque evacuationibus cum levamine, sensim sensimque decrescit; aut superaccedentibus symptomatibus, quae ultimum febris putridae gradum denotant, morte terminatur.

4. Dum febris nervosa lenta³⁰⁾ imminet (de Symptomata febr. nervosa. lenta.³¹⁾ qua, ne de antiquissimis medicis loquamur³²⁾, nervosa. scripsere: WILLIS³²⁾, SYDENHAM³³⁾, HUXHAM³⁴⁾, MANNINGHAM³⁵⁾, DEMIANI³⁶⁾, BOEHNER³⁷⁾, CA-

REL-

29) J. P. FRANK *Syst. einer vollständ. med. Polizey.* 5. B. p. 45.

30) *Synon. Febricula. Febris maligna. Febris lenta nervosa Huxhami.*

31) Quanta eorumdem circa febrem hujusmodi sub nomine morbi cardiaci fuerit doctrina, FALCONER demonstravit in *Memoirs of the medical society of London. Vol. VI. p. 1.* (Et in *Samml. auserles. Abhandl. für pr. Aerzte.* 23. B. p. 3). — ANAUNIS, eundem morbum sub nomine febris lymphaticae describentis, notiones, extollit SPRENGEL. (*Versuch einer pragm. Geschichte der Heilkunde.* 2. Th. p. 293).

32) *Pathologia cerebri.* p. 56.

33) *Febris nova.* a. 1685. Sched.

34) *Opp. Lib. de febribus. Cap. VII. De febribus lentis et nervosis. — Diss. de febribus lentis nervosis.*

35) *The symptoms, nature, causes and cure of the febricula, or little fever. London 1755.*

36) *Diss. de febre lenta nervosa. Lips. 1777. Vid. BALDINGERI sylloge. T. IV.*

37) *Diss. de febris lentae nervosae natura. Hal. 1781.*

NELSON³⁶⁾, HARTMANN³⁹⁾, JACOBI⁴⁰⁾, KOZLOWSKI⁴¹⁾, BROSIG⁴²⁾, P. L. MÜLLER⁴³⁾), symptomata prodroma, valde in longum protracta, tandem ita cum constitutivis confluent, ut limites praedispositionem inter et morbum statuere arduum sit. Certe ad hunc jam spectant vagi horrores, cum calore alternatim comparentes. Dum volae manuum ardent, extrema frigescent; dum caput calet, algent pedes. Animi maxima observatur irritabilitas, atque aegri minima data ansa nunc rubent, nunc pallescent, atque facillime terrefiunt. Suspiria crebra, vox debilis, tremula, interdum involuntaria lacrymatio. Pulsus saepe sanum frequentia non superat, vel eo lentior; aliquando tamen frequentissimus, semper variabilis et inconstans. Aegri de capitis dolore, de aurium susurru conqueri solent. Mox digestio laeditur, testantibus id praecordiorum oppressione, nausea, ructibus, ciborum desiderio deleta, alvoque tarda. Urina copiosa, pallida. Somnus inquietus.

38) Diss. symptomatologia et aetiologia febris lentae nervosae. Gött. 1782.

39) Diss. de febre nervosa lenta. Francof. ad Viadr. 1790.

40) Diss. de febribus lentis epidemicis a. 1792. Stuttg. 1792.

41) Diss. de febre lenta nervosa. Halae 1792.

42) Diss. de febris lentae nervosae pathologia. Hal. 1793.

43) *Abhandl. über das schleichende Nervenfeber.* Duss. 1808.

quietus, haud reficiens. Hic rerum status per hebdomadem et ultra protrahitur, quin aegri facile lectum petant. Interea multa occurrunt symptomata, nunc catarrhalia, nunc alia, e. c. diarrhoea serosa, fluor albus, haemorrhoides, respirandi sive deglutiendi difficultas, cordis palpitatio, sudores partiales, glutinosi, frigidi, saepe profusi, dolores quasi rheumatici. Potissimum vero vires mirum in modum deficient. Piget moveri, piget loqui. Saepe delirium occurrit (sine furente tamen insania) cum vigiliis; alias sopor. Nil prorsus interea poscunt, ne potum quidem. Jam tendinum subsultus adest, tremunt manus, tremit lingua, muco subalbido obducta, atque in media parte arescens. Symptomata huiusmodi saepe remittunt, ac dein sine ordine, ac sine data causa invalescunt. Facies et praecipue oculi gravem morbum designant. Urina vapidi instar vini aut cerevisiae, haud-raro subnigra, subinde paulo crassior, farina quasi inspersa. Praevia anxietate interdum miliaria, alias ecchymomata, non tamen multa nec admodum evidenter, prorumpunt, ita interdum et aphthae. Res sic ad tertiam hebdomadem, ad mensem, quin imo ad quinquaginta dies et ultra extenditur. Felici in casu symptomata paullatim imminuuntur, ac vix unquam crisis occurrit. Alias stragula contrectant et inanes quasdam imaginesprehendere tentant. Extremitates fiunt gelidae, cum pulsu exili, admodum formicante; jamque

vox fancibus haerens, ungues digitique lividi, facies cadaverosa, perpetua fere ac frigida suspiria, certissimam instare mortem, praenuntiant.

Necroscopia.

5. In *cadaveribus* post febres nervosas tum acutas tum lentas, praeter phaenomena febribus putridis familiaria, nil hucusque detegi potuerat, quod morbi peculiarem sedem indicare posset. Sunt, qui de inflammatione arachnoidea testentur⁴⁴⁾.

Causae.

6. Ad febres nervosas tam acutas quam lentas *disponunt*: habitus gracilis (illi fere similes, qui ad phthisin hereditariam praedisponit⁴⁵⁾), systema nervorum praetermodum sensibile et excitabile (e. c. hystericarum et hypochondriacorum), rapidum corporis incrementum, epocha evolutionis partium genitalium, onania, Venus, educatio effeminata, animus imaginationis et pathematum imperio resistere impotens, studia protracta, lucubrationes nocturnae, potus coffeae et liquorum alcohol continentium⁴⁶⁾, ejusque repentina et diuturna interceptio. *Excitantur* in praedispositis febres nervosae per peculiarem annuam seu epide-

44) GOEDEN in HUFELAND's Journ. 1820. May. p. 72.
Cfr. LARRET *recueil des mémoires de chirurgie etc.*
Paris 1821. Article *Nostalgie*.

45) RAIMANN l. c. §. 114.

46) Atque hinc per transennam notasse juvabit, morbum potatorum, incongruo nomine *delirii tremantis* insignitum, neutiquam ad febres nervosas, sed ad encephalitides spectare.

epidemicam constitutionem, per atmosphaeram frigidam humidamque, aut calidissimam et exhalationibus animalibus inquinatam; per aërem reclusum haudque renovatum; per victus nutriendi defectum; per defatigationem justo majorem; per jacturam humorum; per venena narcotica; per spes frustratas et moerorem profundum; per imaginationem⁴⁷⁾; per impotentiam, duram disciplinam sustinendi; per amorem infelicem et maxime (*quoad febres nervosas lentas*) per patriae, domus paternae, curae maternae et consueti vivendi modi inane desiderium. Quibus caussis et contagium adscribendum foret, nisi febres ex hoc fonte pullulantes ut morbum sui generis consulto a febribus consuetis nervosis distinguere placuisset. Ad causam febrium nervosarum proximam quod attinet, quid de humorum vitiis cogitandum sit, jam dictum est⁴⁸⁾. *Astheniam* quodammodo ceu morbi effectum, neutiquam vero ceu causam admittere possumus. Arctioribus enim limitibus virtus pharmacorum excitantium circumscripta est, quam vulgo creditur. Quae quum ita sint, febres nervosas pro effectu processus mor-

O 2

bosi

47) ROBERT HAMILTON in *Transactions of the medico-chirurgical society of Edinburgh. Vol. I. No. 15.* (In instituto quodam puellarum Edinburgensi tempore morbi ejusdam de contagio suspecti, plurimae illarum in *febrem* inciderunt, placato animo illico fugatam).

48) §, XXX. No. 6.

bosi incomprehensibili et sui generis declaramus.

Diagnosis. 7. Febres nervosae ante omnia ab *encephaliti- tide* distinguendae sunt⁴⁹⁾, et quidem praesertim a formis hujus morbi lethargica, phrenetica, convulsiva et tremefaciente. Interea sub ipso illarum decursu cerebrum (instar reliquarum corporis humani partium) *rubedine* aliisque tum ecchymomatis tum phlogoseos indiciis notari posse, vix dubitandum. Neque mirandum foret, si in febre nervosa, potissimum lenta, *cor et vasa majora* speciatim affecta fuerint. Imo suspicio, ne olim *pericarditides* vel *aortitides chronicas* pro febribus nervosis lentis habuerimus, nos angit. Et cur communissimus quondam error, morbos chronicos cordis et aortae cum hysteria et hypochondriasi confundendi, non ad morbos quoque acutos extensus fuisset? — Alterius quoque errandi occasionis meminisse juvabit. Accidit nimirum in nonnullis febribus nervosis lentis, ut, quum symptomata, ad febrem propius determinandam spectantia, parum expressa sint, contra vero delirium emineat, morbus, alioquin diuturnus, pro *mania* habeatur⁵⁰⁾. Caeterum nil faci-

49) P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. III.

50) Sic a. 1799. juvenis medicus, *maniacus* declaratus, nosocomio Vindobonensi traditus fuit. Quum autem in illo virium jacturam magnam, proclivitatem ad lipothymias, et vestigia exanthematis peticularis observarem, quumque tunc temporis febres nervosae len-

facilius, quam talem evitare errorem. Id quod etiam de confundenda febre lenta nervosa cum *febricula* valet, quae in hysteria symptomatice occurrit⁵¹⁾. Haec quidem priori affinis est, at tamen ob chronicum decursum non minus, quam ob absentiam periculi, saltem imminenti, ab illa probe distinguenda.

8. Superest, ut *differentias*, quae inter *fe-* Continua-
tio argu-
menti.
bres nervosas ipsas locum habent, perpendamus.

Illarum uni divisio febrium nervosarum in *proprie dictas* et in *putridas* innititur⁵²⁾. Etiam si libenter fateamur, morbos systematis nervosi mere dynamicos (sine laesione scilicet missionis et formae materiae) vix animo concipi posse; nihilominus tamen nihil impedit, quominus febres, quibus vigentibus compages corporis (modo visibili) *non* mutatur, ab illis distinguantur, ubi contrarium accidit. Caeterum a nobis sub nomine *febris putridae* potissimum febrem gastrico-nervosam, summumque febres nervosae gradum intelligi, ex dictis constat. Alteram febrium ner-

vosa-

tae grassarentur, diagnosin maniae in illam febres nervosae lentae mutavi, sicque juveni et sanitatem et famam brevi restitui.

51) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XIV. §. LXX. No. 3.

(5). Immerito HOFFENGLÄRTNER febrem istam, quam *nervosam hystericoam* vocavit, a se primum descriptam esse ratus est! (*Rheinische Jahrbücher d. Med. u. Chir. Supplement-Band für die ersten vier Bände.* p. 1).

52) §. XXVI. No. 4.

vosarum divisionem, in *versatiles* et *stupidas*⁵³⁾; quippe quae uno verbo conditionem morbosam indicat et therapiae quodammodo viam sternit, retinuimus. Atque hic locus est monendi, medicum, qui in doctrina universali morborum indolis nervosae versatus est, facultate pollere, ex symptomatibus specialibus febris nervosae, praecipue adfectas systematis nervosi partes conjecturâ designandi. Enimvero qui phaenomena novit, quae in aliis morbis nervosis (praecipue traumaticis) ex speciali affectione cerebri, cerebelli, medullae spinalis, plexuum nervorum oriuntur, ille et fontem symptomatum febris nervosae aptius *conjectare* valebit. Tertiam, qua febres nervosae in *acutas* et *lentas* dividuntur⁵⁴⁾, vel maxime propterea inculcamus, quoniam illâ praetermissâ, *febris lentae nervosae* cognitio praeter modum ardua fieret. In genere medicos tirones non satis praemoneri posse putamus, ne illas febres ideo negligant, quod aut pulsus parum a norma deflectit, aut aeger lectum recusat, aut quoddam symptoma, febribus alias alienum, praesto est.

Argumenti
finis.

9. De febrium nervosarum divisionibus loqui non desinemus, quin illius, in *simplices* et *complicatas*, mentionem injecerimus. *Simplicem* dicimus febrem nervosam, quae in homine alioquin sano, inprimis annua constitutione aliis morbis haud favente, evolvitur; contra *complicatam*

53) Ibid.

54) Ibid.

tam vocamus febrem nervosam, quae hominem adgreditur, plethora, labe quadam rheumatica aut catarrhali, vel primarum viarum colluvie adfectum, praecipue si annua constitutio simul febribus inflammatoriis, rheumaticis, catarrhalibus et gastricis faveat. Complicationes autem febris nervosae *primariae* non omnino cum complicatione nervosa in aliis febribus, atque cum istarum in febres nervosas *secundarias* transitu confundendas esse, per se patet. Hic etenim conditio nervosa dumtaxat *accessoria* est, ibi *fundamentum* morbi constituit. Caeterum huiusmodi divisiones eousque in praxi valent, quousque ad lectos aegrorum institui possunt; quare in casu dubio ut de complicatione conveniatur, sufficit, quin inanes de praec eminentia alterutrius diatheseos quaestiones moveantur.

10. Febre nervosa primaria in genere peri-Prognosis. culosa declarata, praeterea rerum positiones nosse juvat, quae plus minus periculi portendere solent. Prae ceteris timendae sunt febres, quae circa epocham pubertatis accidunt; quae homines, Veneri, Bacchoque deditos, vel obesos et flaccidos invadunt; quae ex animi pathematibus diuturnis originem trahunt; quae complicationem exhibent, quaeque vel neglectae vel male curatae fuere. Mali praesertim ominis sunt insignis virium prostratio mox a febris initio, animi abjectio, inprimis mortis timor, manifesta facies a
forma

forma consueta aberratio (neque vigilis, neque evacuationibus nimis, neque defatigationi corporis adscribenda); intuitus fixus, torvus; materies puriformis ex oculis scaturiens, alter oculus altero minor (ubi non a conglutinatione palpebrarum, sed ab illarum conditione paralytica pendet); surditas ante septimum diem, capilli flacidi, pediculorum fuga; delirium, praecipue cum ferocia, cantu et circa imagines funebres; lingua arida, fissa, nigra; gingivae cruentae; deglutitio impedita; potus cum strepitu in ventriculum, quasi in dolium vacuum, delabens; jugularium oscillatio; respiratio laboriosa, inprimis post assumptum potum; anxietas, jactatio; meteorismus sub diarrhoea crescens, alvi profluvium aerosum; faecum et lotii in lectulum depositio; singultus; lumbago; priapismus; urina aquosa, aut a morbi initio jam largo sedimento instructa; haemorrhagiae effrenae, praesertim ex intestino recto; pulsus myurus, diffluens, irregularis, frequentissimus; remissionum defectus; unguium livor; brachium aliena vi elevatum, eadem cessante, proprio pondere cadens; pedum continua denudatio; decubitus inverecundus, cruribus divaricatis, brachiisque ad partes genitales admotis; floccorum venatio, stragulorum coacervatio; corpus aegri praeter modum grave; odor aegri cadaverosus; muscarum circa illum caterva; cutis veluti arenâ conspurcata, ex rubro livida, flava, sudo-

sudoribus inanibus, frigidis, exanthematibusque luridis cooperta; illorum praepostera fuga; gangraenae spontaneae sine levamine reliquorum symptomatum; decubitus sphacelosus; denegati vesicatoriorum, utut acriorum, effectus. *Contraria bona*. Interea potissimum respectu ad febres nervosas *lentas*, memor esto, morbum hujusmodi revera *malignum*, cani videlicet sine omni latratu mordenti aequiparandum esse⁵⁵⁾.

11. Inter febrium nervosarum pericula tantum et *transitus illarum alios in morbos* Transitus in alios morbos. memorandus est; quod quidem argumentum in totius hujusce operis decursu, maxime vero in tractatibus de morbis systematis nervosi et sensuum dilucidabitur⁵⁶⁾.

12. Dum curam aegroti, febre nervosa laborantis, suscipis, grave tibi imponis onus. Quum morbi hujus exitus admodum dubius sit, vel id perdiligenter cura, ut modus tunc te gerendi, omnem excludat ambiguitatem. Binae minimum requiruntur intra nychthemera aegroti visitationes. Post unamquamque (rimatis antea inter se symptomatibus), quid in curatione morbi lucrifactum, quidve amissum fuerit, statue. Palam inde fiant *indicationes*. Multifariae eae sunt, et

55) Cfr. ACKERMANN diss. de malignitatis morborum disertioribus signis. Kilon. 1782.

56) OBERCAMP de molestiis a febre putrida sanata relictis, iisque pedissequis. Heidelb. 1778.

et duce experientia stabiliendae, utpote quae optime doceat, quid hucusque hoc in morbo curando sub variis rerum positionibus bonos, quid malos praestiterit effectus. Contra indicationes hypothesibus superstructae (quales e. c. sunt, putredinem arcendi, astheniae occurrendi e. s.-p.), nisi fors cum prioribus fortuito conveniant, ad finem perducere solent deplorandum.

Contin. argumenti.

13. Priusquam ad curationem morbi te accingis, quaestio solvenda est, utrum ille sit *simplex* an *complicatus*. Imo talis quaestio quotidie repeti debet. Accidit nimirum haud raro, ut complicationes dumtaxat sub morbi decursu exsurgant. Utut sit, quoties illae obveniunt, sine mora abigendae sunt.

Cura complicat. inflammatoriae.

14. Maximas difficultates exhibet *cura febris nervosae cum complicatione inflammatoria*. Licet enim nequaquam existimemus, diathesin nervosam, inflammatoriae e diametro ita oppositam esse, uti aesculae systematis astheniae et atheniae quondam docuerunt; nihilominus fatemur, methodum alteri adcommodatam, alteri adversari. Adversatur praecipue methodus antiphlogistica conditioni februm nervosarum, quoad missionem sanguinis. Qui contrariam sententiam defendunt, aut typhum contagiosum cum febribus nervosis confundunt, aut per complicationem istarum inflammatoriam in errorem ducti sunt. Hac nimirum in complicatione ab ipsa *venae sectione* aegroti

grati salutem pendere posse, persuasi sumus. Comparata itaque antecessorum experientia⁵⁷⁾ cum nostra sequentes hic pro *phlebotomia* indicationes religiose statuimus: dum genius morborum regnantium inflammatorius est; dum febres nervosae intercurrentes in aliis aegrotis phlebotomiam cum successu sustinuerunt⁵⁸⁾; dum hae febres ex febribus inflammatoriis biliosis evolvuntur⁵⁹⁾; dum methodus calefaciens praepostere adhibita symptomatibus inflammatoriis locum dedit; dumque morbi alias sanguinis missionem exposcentes cum febribus nervosis societatem ineunt. Debet autem

57) A. THURINI an in omni febre putrida competat phlebotomia? Romae 1545. — J. B. SYLVATICUS tractatus de secunda in putridis vena, quam salvatellam dicunt. Mediol. 1583. — N. MASSA de venae sectione in febribus ex humorum putredine ortis. — B. CAXANES de ratione mittendi sanguinem in febribus putridis. Barcinon. 1592. — DREZINCOURT an in omnibus febribus putridis venaesectio et purgatio? Montpel. 1654. v. opuscul. omn. p. 3. — RUDOLPHI de sanguinis missione in febre putrida. Gies. 1780. — SPIES diss. de utilitate venaesectionis in morbis, praecipue febre nervosa, ubi ordinario locum non habet. Altdorf. 1795.

58) Ex quo elucet utilitas societatum medicarum, ubi videlicet medici semel bisve de mense conveniunt, sibi in vicem proprias observationes circa morbos regnantes communicant.

59) SCHRADER diss. de praeclaro venaesectionis in quibusdam febribus biliosis putridis speciebus. Rintel. 1770.

autem phlebotomia hisce in casibus non aliter quam praesente medico, pulsuum vim continuo explorante, institui. Ea vel non omnino indicata, vel urgentibus dumtaxat congestionibus ad quodpiam viscus, *hirudines* aut *cucurbitulae scarificantes*, abusum evitando⁶⁰⁾, usurpandae sunt. Caute etiam in adhibendo *nitro* incedendum⁶¹⁾ est.

C. aliarum
complicat.

15. *Complicationes rheumatica et catarrhalis* notis inflammatoriis stipatae phlebotomiam sub rerum positionibus vix allatis⁶²⁾ exposcunt. In genere illis vigentibus, tum in regimine tum in pharmacis omnia, quae transpirationi injuriam inferre possent, evitari debent. *Complicatio gastrica*, nisi insuperabilia obstacula praesto sint, *emetico*⁶³⁾ abigitur. Evacuatio nimirum vomitus ope elicitata minus, quam omnis alia, vires frangere solet. Imo *emetica* ita porrecta, ut minimas evacuationes ciant, ad vires systematis nervosi excitandas non parum conferunt, quo respectu imprimis radix *ippecacuanhae* praestat⁶⁴⁾. Interea
satur-

60) FABRICIUS AB AQUAPENDENTE de cucurbitularum in febribus putridis abusu. In edit. opp. Patav. 1647.

61) DELIUS diss. de moderando usu nitri in febribus putridis et malignis. Erford. 1772.

62) No. 14.

63) Rad. *ippecacuanhae* grana viginti, tartari emetici granum unum. M. D. Capiat.

64) GOTTL. CRAMER *die Behandlung der Nervenfeiber, insbesondere des Typhus; mit besonderer Rücksicht auf*

saburris, bile, deorsum turgescuntibus, vel vermibus praesentibus, juxta regulas, alibi expositas⁶⁵⁾, procedendum.

16. Febre nervosa complicata ad simplicitatem reducta, aut ea vel ab initio simplici, juvat ante omnia videre, quorsum morbus sua sponte tendat. Quamvis enim persuasi simus, morbum, de quo agimus, instar typhi contagiosi naturae committi non posse; nihilominus quousque ille juxta propriam indolem regulariter et placide decurrit, eoque nos quoque ad exemplum summi viri⁶⁶⁾ aliorumque praeter debitum regimen diaeteticum ac prudentem symptomatum curam, vix pharmaca praescribimus.

17. Est autem *regimen diaeteticum* sequens: Regimen diaeteticum. Decumbat aegrotus in amplo conclavi, ut multum purumque aërem trahere possit⁶⁷⁾: quo denegato (excepto rigidissimo anni tempore) potius in horreis aliisque locis semiapertis degat. Parietes conclavis ne sunt picturis ornati, utpote quae exaltatae imaginationi pabulum ad delirium usque praeberent. Quumque aegroti phantasia, impedito

die Wirksamkeit der Ipecacuanha gegen dieselben. (HAN-
LESS *Rheinisch-Westphälische Jahrbücher.* 16. B. 2. St.
p. 21).

65) §. XXX. No. 9.

66) FR. HOFFMANN diss. de natura optima febrium malignarum medicatrice. Hal. 1713.

67) Sunt CELSI verba (Curatio ardentis febris. Lib. III. cap. 7.).

dito per loci obscuritatem intuitu rerum circumdantium, in semet ipsa pabulum inveniat, conclave lucidum esto, quin tamen permittatur, ut radii solares lectum attingant. Huic absolute affixus debet esse aegrotus, neque unquam sibi derelinquendus, ut suadetur⁶⁸). Lectus amplius sit oportet, ita, ut aeger in eo commode se movere undique possit. Multum miser recreatur, si ipsi lecti duo, quorum in altero primam, in altero secundam nychthemeri partem transigat, dicantur. Culcitae plumeae, quoad ejus salva consuetudine fieri potest, removendae. Lintea saepe mutanda, eaque subtilia requiruntur, ne *decubitus* promoveant. Ad hunc praepediendum etiam usus pellis caprinae, cervinae, alcis, aut telae ceratae subtensae inserviunt. Conopeum debitas aëris renovationi obstando nocet. Matulae, structurae partium genitalium utriusque sexus accommodatae, magnum praebent commodum eo, quod aeger, quin surgat, mingere potest. Id ipsum de vase quoque valet, quod natibus submittitur ad excipiendas faeces. Removeto autem illico sordes, et munditiei studeto, quoad fieri potest. De modis aërem purificandi alio loco⁶⁹).

Continua-
tio argu-
menti.

18. Maximi porro momenti est aegroti *animum addere*. Esto igitur facies medici serena, fidu-

68) A HERBERDINO comment. de morbor. hist. et curat.
Edit. SOEMMERRING. Francof. 1804. p. 136.

69) P. I. Vol. II. Sect. II. De typho.

fiduciam concilians. Ne aegrotans objecta ingrata videat, aut de iisdem loquentes audiat. Contrarium de contrariis. Tandem ad causas, quae morbum excitarunt, praecipue ad animi pathemata respiciendum, et probe retinendum, consolationem bonaque officia saepe plus, quam exquisitissima pharmaca, prodesse. Sic plus vico simplici in febribus nervosis, praecipue lentis, quae aut ex penuria, aut nostalgia ortae erant, vel pecunia collecta, vel reditu in patriam promisso, profuimus. Verum cave etiam a repentina fortiorique, utut grata, animi commotione. Ita a nimio adstantium numero. De effectibus *musicae* in febribus nervosis miracula narrantur⁷⁰⁾, quae revera iis, qui imperium sonorum harmonicorum in systema nervorum noscunt, haud omnino vana videbuntur. Attamen dolendum, hoc auxilii genus parum in usu esse, ideoque timendum, ne medicus, illud forte sine successu praescribens, vulgi sarcasmis occasionem sit porrecturus.

19. Quoad cibum in febribus nervosis si, as-
 secas interrogaveris doctrinae putredinis, — illi <sup>Continua-
tio argu-
menti.</sup> *vegetabilem* (utpote antisepticum); — si assecas
 doctrinae astheniae, — illi *animalem* (utpote magis
 nutrientem) tibi proponent! Audiatur experientia, vel quod idem est, illius oraculum, HIP-

POCRA-

70) REIL's *Fieberlehre*. 4. B. p. 181.

POCRATES⁷¹⁾. „Tennes, inquit, et exacti victus, et in longis semper adfectionibus et in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt: et rursus victus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressae, difficiles sunt⁷²⁾. In tenui victu delinquentes aegrotantes, magis laeduntur: omne enim delictum, quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui, quam in paulo pleniore victu⁷³⁾. Ubi quidem peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, et extreme tenuissimo victu uti necesse est. Ubi vero non, sed pleniore victu uti licet, in tantum subdescendendum est, in quantum morbus extremis mollior fuerit⁷⁴⁾. Quum in vigore fuerit morbus, tunc tenuissimo victu uti necesse est⁷⁵⁾. Simul vero conjectare oportet, an aeger ex victu durare possit ad morbi vigorem: et utrum ille prius deficiat, et ex victu durare non possit: aut morbus prius deficiet ac obtundetur⁷⁶⁾. Quibus igitur statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud et paulo ante illud tempus, subtrahendus est. Antea vero mitius aeger victu tractandus est, quo durare possit⁷⁷⁾. In exacerbationibus

71) Aphorismor. Lib. Sect. I. No. 4. 5. 7—11.

72) l. c. aphor. 4. 73) l. c. aphor. 5.

74) l. c. aphor. 7. 75) l. c. aphor. 8.

76) l. c. aphor. 9. 77) l. c. aphor. 10.

bus subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Et quibus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus subtrahere oportet⁷⁸⁾. Itaque in febribus nervosis *acutis* aut nullum (praeter potum) alimentum, aut *juscula* dumtaxat aquea ex hordeo, oryza, avena, pane albo parata, superaddito pauxillo butyri et salis porrigimus; contra in *lentis* (vel illis *acutis*, quibus inedia aut nimiae evacuationes ansam porrexerunt, vel quae jam deferbuerunt) *juscula carnea*, adipe carentia, tum simplicia tum oryzae, hordeo, avenae, vitello ovi nupta, nec tamen nimis saturata, propinquamus, et quidem minimis saepeque diu noctuque repetitis vicibus. Quodsi diarrhoea, vires prosternens, non obstat, etiam *fructus horaei* tum recentes, tum cum aqua et saccharo decocti, permitti queunt. Quin imo in ipsis febribus gastrico-putridis fraga et uvas summo cum emolumento ingestas observavimus.

20. Ad *potum* quod attinet, optimus *aqua* Continuatio argumenti. *fontis*, eaque, aegro expetente, neque sudante neque tussiente, *frigida*. Nisi diarrhoea vetat, isti succus citri, aurantiorum, mali punici granati, baccarum berberis vulgaris, rubi idaei, vaccinii oxycocci cum saccharo addi possunt. Et *aquam Selteranam* exhibere licet; ubi ventriculus eam fert. Pauperibus *aqua mulsa* addito aceto, deco-

78) l. c. aphor. 11.

Frank Prax. I. 1. 2.

decoctum pomorum; in Rossia *Kwas*⁷⁹⁾ et in Polonia *succus brassicae acescentis* aut *betae rubrae*⁸⁰⁾, si opus fuerit, aqua dilutus. Decrescentibus viribus sedatoque caloris impetu, tenuis, absque multo lupulo aliisque narcoticis parata *cerevisia*, potum prae caeteris in hoc morbo egregium constituit. Sed cavendum est, ne forte praesens diarrhoea vel meteorismus inde augeantur. *Vino*, omni aevo a medicis in febribus nervosis commendato⁸¹⁾, sub sequente rerum positione locus est; videlicet dum vires maximo in gradu languent, dum animus depressus et tristis est, vox flebilis; dum pulsus mollis, diffluens; sudor copiosus, viscidus et cutis subfrigida; dumque aeger pharmaca excitantia alioquin indicata respuit, aut vomitu rejicit, vinumque exposcit. *Nocet* autem vinum, ubi pulsus cum duritie micat, facies accensa est, calorque cutis magnus; ubi haemorrhagiae cum impetu contingunt. Dum vini exhibendi indicationibus satisfas, respice etiam ad consuetudinem et facultates aegrorum. In nosocomiis nunc vinum pharmacis, nam alias facile ad aegros usque non pervenit.

79) Est potus fermentatus, qui ex farina secalis obtinetur.

80) *Burakowi rosol*.

81) C. CRIVELLATI *trattato dell' uso e modo di dare il vino nelle malattie acute*. Roma 1600. Cfr. *The history of ancient and modern Wines*. By AL. HENDERSON. London 1824.

venit. Porro, praesertim in regionibus septentrionalibus, cave a vino adulterato. Vina in febribus nervosis, indicatis sub rerum positionibus, quammaxime proficua sunt Campaniae⁸²⁾, Rhennana⁸³⁾, Mosellae, Franconiae et Austriae, verbo, vina, quae gaz acido carbonico abundant, aut pauxillum aciditatis continent. Possunt illa praeterea aqua *Selterana* aut alia simili dilui, addito pauxillo sacchari. Ubi vero vina pro viribus potenter recreandis indicantur, illa Burgundiae et Burdigalense caeteris omnibus palmam praeripiunt. Vina fortissima Lusitaniae, Hispaniae, Cypri, nisi omnino aduetis et cautissime porrigantur, in nostro morbo raro conducunt. Pro stadio convalescentiae illa reservanda. A *coffea* hic semper detrimentum conspeximus: secus a *thea*. De lacte in febribus nervosis lentis jam mentionem fecimus⁸⁴⁾.

21. Ad regimen diaeteticum accedit *symptomatum cura*, nimirum *quatenus per universalem* ^{Cura symptomatum.} *therapiam obtineri non potest*. Loquimur de cura *aestus febrilis, delirii, haemorrhagiarum,*

P 2 *ischu-*

82) NAVIER *dissertation sur l'usage du vin de Champagne mousseux contre les fièvres putrides et autres maladies de la même nature*. Paris 1778.

83) FR. HOFFMANN *diss. de natura et praestantia vini Rhenani in medicina*. Halae 1703.

84) §. XXIX. No. 6. Cfr. J. F. HERTON *de usu lactis in putridis*. (Miscell. acad. nat. curios. Dec. I. a. I. 1670. p. 84).

*ischuriae, obstructionis alvi, meteorismi, d
bitus, gangraenae et parotidis.*

Cura ac-
utus.

22. Adversus summum *acutus* gradum q
doque in febribus nervosis primariis *acutis*,
proprie dictis, tum putridis, molestum ab
quissimis jam temporibus in usum deductur
*frigus*⁸⁵⁾. Aquae frigidae (videlicet temperat
putei) usus externus eodem in morbo famil
erat HAHNIO⁸⁶⁾ et THEDENIO⁸⁷⁾. Maxime at
eundem propagarunt W. WRIGHT⁸⁸⁾ et J. RIE⁸⁹⁾, quorum exempla secuti sunt, praeter
ipsos⁹⁰⁾, GREGORY⁹¹⁾, HALL⁹²⁾, GIANIN

85) HIPPOCRATES de morbis Lib. II. et de intern
fectibus (cumque, ait, ardor tenuerit, lineta fi
intincta, qua praecipue parte ardere dixerit, adme
At si horror corpus detinuit, refrigerantia res
to"). — GALENI Comment. IV. in libr. Hipp
de acut. morb. victa. Sect. IV. art. 12. — C
AURELIAN. acut. morbor. S. II. cap. 38. — P
AEGINETA de re medica lib. II. cap. 30.

86) In act. physico-med. natur. curiosor. Vol. X. ;

87) *Neue Erfahrungen zur Bereicherung der Wundar
kunst und Arzneygelahrtheit. I. Th. p. 137.*

88) In *London medical journal for the year 1786.*

89) *Medical reports on the effects of water, cold
warm, as remedy in fever. Liverpool 1804. Edit.*

90) J. FRANK's *Reise nach Paris, London etc. 2. T
290. (Experimenta jam a. 1803 — 4. in nosoc
Vindobonensi instituta).*

91) W. WRIGHT *lettre to Dr. GARTHSHORE in th
VII. of the medical facts and observations.*

92) In *medical commentaries for the year 1795. co*

JACKSON⁸⁴), FRÖHLICH⁸⁵), RUEG⁸⁶), alique⁸⁷). Enim vero praestans in febribus nervosis auxilium sistit *adpersio* vel *lotio* aegrorum *ope aquae frigidae*⁸⁸), dummodo rerum positiones, sub quibus haec methodus indicatur, rite perpendantur⁸⁹).

DUCAN. *Edinb.* 1795. *Dec. II. Vol. X.* — Et in *Samml. auserlesener Abhandl. f. pr. Aerzte.* 17. B. 1. St. p. 36.

83) *Della natura delle febbri e del miglior methodo di curarle.*

84) *An exposition of the practice of affusing cold Water on the surface of the body as a remedy of fever.* *Edinb.* 1808.

85) *Abhandl. über die kräftige, sichere und schnelle Wirkung der Uebergießungen oder der Bäder von kaltem oder lauem Wasser in Faul-, Nerven-, Gall-, Brenn- u. Scharlachfebern, den Masern u. einigen andern langwierigen Krankheiten.* *Wien* 1810. — Et: *Abhandl. von dem auffallenden Nutzen des kalten u. lauen Wassers in einigen Fieberkrankheiten u. dem Scharlach.* 1820.

86) *Von dem Nutzen des äusseren und innern Gebrauchs des kalten Wassers bey einem mit heftigen Nervenzufallen u. Meteorismus verbundenen Faulfieber.* In *Museum der Heilkunde.* 4. B. p. 162.

87) *Cfr. P. I. Vol. II. Sect. II. De typho.*

88) *Adpersio sequenti modo instituitur: Postquam aeger extra lectum positus atque denudatus est, amphora aqua temperaturae putei profundi repleta super eum ex alto effunditur. Peracta adpersione aeger linteis citissime abstergitur, lectuloque iterum committitur. Lotio ope spongiae aqua frigidiuscula impraeguatæ fit.*

tur⁹⁹). Spectant huc, praeter calorem urentem superficiem corporis externae, sensus internus stertens, facies accensa, oculi scintillantes, pulsus plenus irritatus, proclivitas ad soporem et estaxin, recens mali origo (e. c. a prima ad quartam morbi diem) et *absentia* complicationis tarrhalis¹⁰⁰), rheumaticae et sudoris. Indicatio lotio aut adpersio secunda sive tertia quaque hora repeti debet, donec calor cutis urens mitigatus sit. Nonnunquam peracta una alteratione aut adpersione lenis sudor prorumpit, tuncque desistere oportet. Quousque lotiones et adpersiones frigidae continuantur, interne nihil, aut *emulsio* quatuor seminum frigidorum majorum et minorum, aut *acida* propinantur.

Cura deli-
catis.

23. Non solum aeger vaniloquens, sed ille, cui vaniloquii periculum imminet, diutiusque sedulo custodiendus, ne, quod plurimum observavimus, per fenestras sese praecipitet, sibi met ipsi aliiave vim inferat. Quousque fieri potest, aegroti non ligandi; ex vinculis enim extremitates circumdantibus gangraenae istiusmodi partium conspeximus. Ut vero, et furis

99) Cfr. DROGAN *observation sur une fièvre putride maligne, dans laquelle les affusions d'eau froide ont été nuisibles.* (SEDILLOT *recueil périodique de la société de médecine de Paris.* Tom. 35. p. 391).

100) HALL (l. c.) quidem testatur symptomata catarrhalia non obstare, quod quodammodo de typho, et de febre nervosa valet.

furiose delirant, cohibeantur, consueta maniacorum vestis in usum trahenda. Haec vero ita induitur, ut manicae longae, quibus instructa est, decussatim inferiori lecti fulcro alligentur, tenso simul super pedes stragulo, vel fascia lata. Delirantibus tandem nec liquida pharmaca, nec potus in vasculis vitreis suppeditandi. Vasa metallica vel cornea, quae canula vel rostro terminantur, hic apprime conveniunt.

24. Quamvis in febribus, qualiscunque de-
 mum generis, ad cohibendas haemorrhagias, ut-
 ut conspicuas, non admodum proni simus; ni-
 hilominus in febribus nervosis, proclivitatem ad
 profluvia cruenta manifestantibus, omnia admi-
 nicula, quae ad illa, si cum vitae periculo con-
 tingerent, sistenda idonea sunt, praeparare sole-
 mus, ut urgente necessitate sine temporis jactura,
 diu noctuque praesto sint. Loquimur de admi-
 niculis potissimum mechanicis, praecipue in tra-
 ctatibus de *epistaxi*¹⁰¹⁾ et *metrorrhagia*¹⁰²⁾ pro-
 pius determinandis.

25. Quum *urinae excretio* in febribus ner-
 vosis, quia aut aegrotus conscius non est, aut
 affectio medullae spinalis vesicam veluti paraly-
 ticam reddiderat, saepe suppressi soleat; medici
 est,

101) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. XXVII. §. CXXXIX.
 No. 9.

102) P. IV. Vol. II. Sect. I. Cap. de uteri haemor-
 rhagia.

est, quotidie inquirere, non solum, utrum urina secedat, sed etiam, utrum in *debita copia* secedat. Potest enim, uti jam meminimus ¹⁰³⁾, incontinentia urinae cum retentione complicari. Retentum hisce in febribus lotium plerumque illico excernitur, si regioni hypogastricae aqua, aut frigida aut calida, applicatur, vel linimentum volatile illinitur, vel clyster emolliens cum sale injicitur. Dumtaxat, nisi haec juvarent, ad *catheteris* applicationem, eamque sine mora suscipiendam, deveniendum foret.

Cura ob-
stipationis
alvi et me-
teorismi.

26. Etiamsi febris nervosa complicationis gastricae experta sit, nihilominus, ut alvus intra nychthemeri spatium semel bisve aperta sit, optamus. Contrarium saepe inertiam intestinorum, modo ex cerebri modo ex medullae spinalis affectione proficiscentem indicat. Antequam fontem mali aggredi liceat, *clysteribus* ex aqua, aceto et sale, succurrendum est. *Meteorismus*, ex eadem intestinorum inertia pullulans, interdum illinitione ventris *linimento volatili*, vel fotu per *species aromaticas* cum vino calido, imminuitur. Quae singula si effectum destituerentur, ubi nulla frigoris contraindicatione ¹⁰⁴⁾ exstat, *glacies contrita* linteis suscepta et abdomini imposita conduxit ¹⁰⁵⁾. Sunt adeo, qui aërem intestina disten-

103) No. 8. 104) No. 22.

105) Tali pacto Pater meus meteorismum, febris nervosae symptoma, in alumno collegii Germanici, quon-

distendentem ope syringae extrahere conentur¹⁰⁶).

27. Nunquam curam aegri, febre nervosa C. decubitus et gangraenae. provectiore laborantis, suscipe, quin illico ad latentem et ab aliis forte minime animadversum *decubitus* respicias¹⁰⁷). Ne istum praetervideas (nisi de custodum sollertia certissimus sis), loca, in quibus aeger continuo decumbit, quotidie *ipse* examina. Quam primum ibi rubor cutis in conspectum venit, loco affecto statim lintea, aqua frigida impraegnata (cui vel pauxillum aceti, sive extracti saturni superadditur), imponenda, saepeque renovanda. Caveas hic a frictione, praesertim cum spiritu vini camphorato: augebitur enim malum et cutis exulceratio inevitabilis erit. Ea jam laesa, praesentibusque suppurationis indiciis, ad *cataplasma* tepidum ex mica panis albi, lacte et croco confugiendum. Quodsi aut in decubitu

aut

dam Ticini stabiliti, et in filio consulis Galliae Leseps, Petropoli degente debellavit, aegrotis sic ex orci faucibus ereptis.

106) FRAMBAGLIA apud BURSERIUM instit. Vol. II. p.

418. — MEGLIN in *Bibliothèque médicale* XII. année.

107) Vilnae a. 1805. a Professore L. ad juvenem febre nervosa laborantem in consilium vocatus fui. Moxbum ad decimum diem aut placide decurrisse, tunc vero inopinate magnum viridum lapsum ingruisse narraverant. De *decubitu* illico quaestionem institui, et, ecce, examinatis (pro prima vice) natibus, lata plaga gangraenosa in conspectum venit. Aegrotus salvari amplius haud poterat.

aut alibi *gangraena* appareat; linteâ decocto *cinchonae officinalis* saturato imbuta plagae affectae applicanda. Si multum ichoris inde stillet, partes gangraenosae subtilissimo polline aut *corticis cinchonae*, aut *florum chamomillae*, aut *radicis acori calami*, aut herbae *sabinae*, aut *carbonum vegetabilium*¹⁰⁸⁾ (addita in magno malo *camphorâ rasâ* aut *opio*) inspergenda. Marginibus adhuc rubris et calentibus, aqua frigida cum extracto saturni imponenda. Raro enim scarificationes hoc in casu, ut alias fieri solet, gangraenae progressibus obstant. Curandum praeterea est, ut partes decubitu detentae a compressione defendantur. Cui scopo species jugi, in medio loco vacuo, ad partes morbosas excipiendas idoneo instructi, optime inservit¹⁰⁹⁾.

C. parotidis.

28. Sicuti glandulae secernentes, in genere per vicinum stimulum in consensum tractae, intumescere solent; ita *parotides* laborante in febribus nervosis cerebro. Tumore hac in glandula comparente, *hirudines* aliquot, in distantia circum circa mox apponendae, indicantur. Linteâ calida *camphorâ rasâ* adpersa, vel species aromaticae sacculis commissae, tumorem potius augere solent. Quodsi tumor jam adeo increverit, ut

108) ODIER *manuel de médecine pratique* p. 32.

109) W. HERBEN tale instrumentum addita tabula aenea descripsit, in *medical transactions published by the college of physicians in London. Vol. V. 1815.*

ut resolutionis spes deficiat, ad *cataplasma emolliens* confugiendum. Ne vero cutem parotidi impositam, antequam glandula ipsa suppuret, maceres, cataplasma saepius, praesertim noctu, removebis, ac interea *emplastrum meliloti* applicabis. Alii ad maturationem abscessus parotidis promovendam *lintea liquore acetatis ammoniacae irrorata*, aut illinitionem *saponis ammoniacalis* proponunt. Patientiae autem hic magis quam irritantibus opus est. Ad maturationem perducto abscessu, libentissime spontaneam illius rupturam, modo extrorsum modo introrsum (in cavitatem scilicet oris) contingere solitam, expectamus. Interea si tumor parotidis et cellulosae adiacentis propter puris copiam ita extenderetur, ut inde aut suffocatio minetur, aut sanguinis circuitus impediatur, abscessus, dummodo maturus¹¹⁰⁾, aut caustico aut culto aperiendus.

29. Praeter regimen diaeteticum atque curam *Pharmaca*. symptomatum, datis et determinatis sub rerum positionibus ad eadem *pharmaca* in febribus nervosis primariis recurrendum est, quorum partem jam in therapia febrium nervosarum secundaria-
rum mentionem injecimus.

30. Sic *acidis* locus est, praesentibus calore *Acida*. cutis urente, pulsu irritato, siti inexplebili, haemorrhagiis symptomaticis, sudoribus intempesti-
vis,

110) A praematura parotidis incisione letalem gangraenam observavi.

vis, ecchymomatibus et constitutione aegri aliquin scorbutica. Contraindicantur acida pectoris adfectione, ventriculi et intestinorum doloribus, et diarrhoea. Praeterea ipsa inter acida pro re nata *selectus* instituendus est. In recente et adhuc invalescente morbo, inprimis si aeger fuerit admodum sensibilis, *acidum tartarosum*¹¹¹⁾, omni alii anteponimus. Minor sensibilitatis gradus *acidum sulphuricum dilutum*¹¹²⁾ admittit, ac praecipue haemorrhagiae periculum illud exposcit. Crescente interea debilitate, pulsuque molli reddito, ad *elixir acidum Halleri*¹¹³⁾ deveniendum est. Praeterea si aut profusi sudores aut haemorrhagiae aut ecchymomata, aut aegri conditio scorbutica acida exposcerent, caeterum vero cutis potius frigeret quam caleret, *elixir vitriolicum Mynsichtii*¹¹⁴⁾ indicaretur. *Acido nitrico*¹¹⁵⁾ sub

iis-

111) R. Aquae fontis libram unam. Acidi tartarosi q. s. ad gratam usque aciditatem. Edulcetur s. q. syrupi cerasorum nigrorum. M. D. S. C. omni secunda hora vasculum semis.

112) R. Aquae fontis libram unam. Acidi vitriolici diluti q. s. ad gratam aciditatem. Edulcetur s. q. syrupi rubi idaei. M. D. S. C. omni hora cochlearia duo.

113) Scrupulus unus pro libra aquae c. s. q. syrupi violarum.

114) Ad scrupulos duos cum unciiis octo aquae nucleorum pruni cerasi, et uncia una syrupi fructus ejusdem. M. D. S. Cap. omni secunda hora unciam unam.

115) Dilutum ad libram aquae ad gratam usque aciditatem cum necessaria syrupi cujusdam quantitate.

iisdem prorsus circumstantiis, sub quibus sulphuricum commendavimus, locus est. Acidum illud quondam huic praetulimus, ubi hepar simul adfectum erat; at modo intelleximus tali in casu, ob ventriculi sensibilitatem auctam, mineralium nec unum nec alterum locum habere posse. *Acidum muriaticum oxygenatum*¹¹⁶⁾ in maximo morbi gradu, gangraenâ, praeter indicata symptomata urgente, sacram anchoram sistit.

31. Cum systema nervosum torpescere inci-
pit, inprimis praesentibus sopore, stupiditate,
auditu gravi, et fracto sphincterum officio, *flo-*
*res arnicae montanae*¹¹⁷⁾ suffragia multorum¹¹⁸⁾
jure collegerunt. Quodsi alvi profluvium adesses,
florum loco *radix* praescribitur¹¹⁹⁾. *Radix va-*
leria-

Arnica.
Valeriana.

116) Ad drachmam unam; diluatur s. q. aquae fontis et edulcetur syrupo quopiam. Cap. sensim sensimque nychthemeri spatio. Cfr. *Observations relatives à l'usage interne ou externe de l'acide muriatique oxygéné (Annales de la soc. de médecine de Montpellier. T. 25. p. 192).* — *Del acido muriatico ossigenato in generele e delle sue proprietà mediche in particolare. (Giornale della soc. med. chirurgica di Parma. Vol. 6. p. 106).*

117) R. Florum arnicae mont. s. drachma semis ad drachmas duas. Ebulliant c. s. q. aquae per aliquot horae momenta. Colaturae librae unius adde: Syrupi cinnamomi drachmas tres; pro nychthemero.

118) COLLIN de arnicae in febribus ac aliis morbis putridis virtute. Vindobonae 1775.

119) A drachma semis ad drachmas duas ad decoctum, ut supra, parandum.

lerianae sylvestris apprime conducit vigente sensibilitate aucta systematis nervosi, itaque obvenientibus delirio cum facie pallida, urina aquosa, pulsu debili et tendinum subsultibus, ne amplius de complicatione loquamur verminosa.

Angelica. 32. Ubi indicationes pro vix recensitis phar-
Calamus.
Serpentaria. macis minus sunt evidentes, ac in genere de virium recreatione, deque restauranda pulsum humili conditione maxime agitur, inter radices *angelicae archangelicae, acori calami et aristolochiae serpentariae* unam alteramve eligit.

Camp- 33. Magna virium prostratio cum pulsu debili, molli, diffluente et aequali, cum extremitatibus subfrigidis, sudore viscido coopertis, cum facie lurida ecchymomatibusque lividis *camp-
ra. phoram*¹²⁰⁾ exigit. Ab ea vero abstinendum, si sub illius usu facies praeter modum accendatur, si pulsus crebrior calorque cutis fortior quam par est, evadant, si sopor et sitis angeantur, et haec symptomata diu persistent, nec epota limonada sive emulsione amygdalina tenui, cessent. Dosis, nisi minimis¹²¹⁾, saltem modicis¹²²⁾, effectus obtinere possumus, quos alii maximis sese obtinuisse gloriantur.

34. *Mo-*

120) A. FD. L. DÖRRFURT's *Abhandl. über den Kampfer*. Wittenb. 1793.

121) Quarta grani pars cum granis quatuor pulveris gummi arabici, secunda quaque hora.

122) Granum unum pro dosi.

34. *Moschum* ¹²³⁾ (si bonae indolis haberi *Moschus*.
 queat, sique aegrorum facultates pro acquirendo
 tam pretioso remedio sufficiant, sique odor illis
 non ingratus sit), in febribus nervosis, praecipue
 juniorum, puellarum, adhibemus, praesentibus
 subsultibus tendinum, tremoribus, delirio cum
 facie pallida, urina clara, cum pulsu parvo, con-
 tracto et duriusculo. Nisi effectus a dosibus mo-
 dicis moschi ¹²⁴⁾ primo vel altero nychthemero
 observentur, incassum iidem serius expectari so-
 lent; quare cavendum est, ne eo (uti quon-
 dam ¹²⁵⁾ et haud pridem ¹²⁶⁾ accidit), abutamur.

35. Moschi vices plerumque *gummi-resina* *Asa foetida*.
ferulae asae foetidae gerit, praxi nosocomiali,
 pauperumque usui magis idoneum remedium.
 Propinatur sub iisdem rerum positionibus, sub
 forma sive tincturae ¹²⁷⁾, sive emulsionis ¹²⁸⁾, aut
 si

123) B. L. TRALLES *die Heilkraft d. Moschus. A. d. L.*
 von M. H. MENDEL. Breslau 1804. — G. L. K.
 KAPP über einige Wirkungen des Moschus in d. Krank-
 heiten der Menschen. Nürnberg 1812.

124) A grana uno ad grana tria secunda quaque hora.

125) B. L. TRALLES diss. de limitandis laudibus et ab-
 usu moschi in medicina, in medela morborum. Bresl.
 1783.

126) Tempore quo secta Browniana vigeat.

127) R. Aquae destillatae rutae graveolentis nncias sex.
 Tincturae asae foetidae drachmas duas. M. D. S.
 Omni hora cochleare unum.

128) R. Asae foetidae drachmam semis. Mucilaginis
 gummi mimosae niloticae unciam unam. M. et

si aeger medicamentum respuat, sub ea clysterum¹²⁹⁾.

Castoreum. 36. Accedit *castoreum*¹³⁰⁾, quod, dummodo bonae notae, moscho adulterato anteponi potest. Aegroti valde excitabiles facilius *pulverem*¹³¹⁾, quam *tingturam*¹³²⁾ ferre solent.

Crocus. 37. In febribus nervosis, potissimum *lentis*,
Vanilla, ubi diuturnitas morbi mutationem pharmacorum interdum exposcit, in *croco*¹³³⁾ atque in *Vanilla*¹³⁴⁾ duo reperire auxilia, circiter rerum positionibus, moschi usui faventibus, accommodata, gratum erit.

Ammonia. 38. Extremae virium dejectioni, pulsui tremulo, intermittenti et molli, *ammonia* non sine quadam successus spe opponenda, eaque sub forma

affunde emulsionis amygdalarum dulcium uncias decem.

129) *Asae foetidae* drachmam unam. Vitelli ovorum Nro. unum. Subige et affunde infusi florum matricariae chamomillae uncias sex. D. S. pro clystere.

130) A. C. BONN anatome castorei atque chem. castor. analys. ejusque in medicina usus. Lugd. Bat. 1806.

131) A grano uno ad grana tria pro dosi.

132) R. Aquae rutae uncias sex. Tincturae castorei a drachma semis ad drachmam unam. M. D. S. Omni altera hora semunciam capiat.

133) R. Aquae melissae uncias sex. Tincturae croci a scrupulo ad drachmam semis. M. D. S. Omni secunda hora cochleare majus.

134) HOFFMANN in HUFELAND's Journ. der. pr. Heilk. 5. B. p. 248.

ma liquoris subcarbonatis ammoniae empyreumaticae¹³⁵⁾. Ni fallimur, in ammonia minus pharmacum, vires vitales excitans, quam potius pharmacum, fibrae muscularis exhaustae virtutem resarciens¹³⁶⁾, possidemus.

39. *Aetherem sulphuricum*, aut alium; prae-Aetheres. cipe indicatum existimamus sub vitae imminente periculo, apparente lipothymia, vel pulsu exili, filiformi, irregulari, fere deficiente, delirio cum facie pallida et urina aquosa. Oportet vero hoc pharmacum parvis intervallis porrigere, omni quarta scilicet, aut dimidia horae parte¹³⁷⁾.

40. *Phosphorum*, utpote in genere alea ple-Phospho-
num¹³⁸⁾, et *mercurium*¹³⁹⁾, utpote febribus ner-
vosus rus, Mer-
curius.
Opium.

135) R. Aquae menthae uncias sex. Spiritus cornu cervi a drachma semis ad drachmam integrām. D. S. Omni hora unciam semis capiat.

136) Cfr. Observationes A. HUMBOLDT (*Versuche über die gereizte Muskel- u. Nervenfasern. Berl. 1797.*) circa effectus alcali in fibram muscularem.

137) A guttis quinque ad decem.

138) De phosphori in febribus nervosis usu legi possunt: BURDACH *die neuesten Entdeckungen in d. Heilmittellehre.* p. 292. — BUTTATZ *über den Phosphor als Heilmittel. Götting. 1800.* — LEROI *expériences et observations sur l'emploi du phosphore à l'intérieur. Magazin Encyclop. An. VI. No. 122. p. 155.* Suadetur conelamato fere morbo, extremitatibus subfrigidis,

FRANK PRAX. I. 1. 2.

Q

vosus adversum, silentio praetereuntes, ad *opium* nos convertimus. Quamvis enim hoc pharmacum, rite monentibus TRALLES¹⁴⁰⁾, HUXHAM¹⁴¹⁾ aliisque, in febribus nervosis in genere minime quadret; sunt tamen rerum positiones, quibus vigentibus praestantes exserit effectus. Loquimur praesertim de convulsionibus, de delirio, de vigiliis, deque diarrhoea, non foeculenta, sed serosa, vires exhauriente, meteorismum augente, et quidem dumtaxat in morbo provento, magis in nervosa proprie dicta, quam in putrida, et ubi vires vitae, teste pulsu adhuc sat vegeto, praeter modum dejectae non sunt. Vix autem hic opio puro locus est, sed potius illius cum radice ipecacuanhae connubio¹⁴²⁾, aut clysteribus¹⁴³⁾;

pulsu imperceptibili, singultu, deglutitione impedita, sopore, stertore et sudore viscido. Exhibent sub sequenti formula: R. Phosphori grana quatuor. Solve in uncia dimidia aetheris sulphurici. D.S. Cap. omni dimidia hora decem guttas.

139) Qui aliter sentiunt, aut febres nervosas secundarias nonnullas aut alios morbos systematis nervosi (e. gr. encephalitidem, rhachialgitidem, nevritidem) cum febribus nervosis primariis, de quibus hic unico sermo est, confundunt.

140) Usus opii. Vol. II. p. 212.

141) Lib. de febribus. Cap. VII. p. 81.

142) Pulvis Doveri ad grana duo, tria, bis terve nycthemeri spatio.

bus ¹⁴³⁾; neque facile administratio opii ultra nycthemerum unum aut alterum protrahenda est.

41. *Corticis cinchonae* ¹⁴⁴⁾ usus ad febres ner- *Cinchona*.
vosas lentas aut saltem ad acutas propectas circumscribitur est, si aegrotans aut per praevias evacuationes exhaustus, aut decubitu confectus, stimulo quodam permanente indiget. Sed etiam hic cortex non conducit, nisi pectus sit liberum, pulsus mollis et primae viae non admodum labefactatae. Secus enim illius administrationem anxietas, respirandi difficultas, tussis, linguae siccitas et abdominis inflatio sequuntur.

42. Praeter pharmaca hucusque adlata, etiam *Remedia*
plurima *auxilia externa* in febribus nervosis *externa*.
primariis locum habent. Inter haec *sinapismi* et
potissimum *vesicatoria* ¹⁴⁵⁾ praestant. Illi recen-

Q 2

tione

143) Guttas decem landani liquidi Sydenhami cum unciiis quatuor infusi chamomillae. D. S. pro uno clystere.

144) Decoctum aut extractum, o. gr. ad drachmas duas cum aquae menthae unciiis sex, et syrupi corticum aurantiorum uncia una. M. S. Cap. aeger ex vase probe agitato omni tertia hora cochlearia duo majora.

145) BAGLIVII opp. p. 641. de usu et abusu vesicantium.
— HUXHAM Lib. de febribus. Cap. VIII. p. 415. —
TRALLERUS usus vesicantium salubris et noxius. Vratiss. 1782.

tiore morbo, sub calore, exacerbationum comite, et scopo derivante usurpandi sunt. Haec morbo senescente, cuti potius frigescenti, prope loca maxime affecta (absente jam jam omni conge-
 stione) applicanda, et quidem dumtaxat tanquam *rubefacientia*, si, gangraena aliis locis nascente, artificialis exulceratio nova pericula portenderet. Quocunque in casu ne adposita epispastica obli-
 vioni traduntur aut negliguntur! — Quapropter ut medici consuetudinem, plagas illis lacessitas propriis oculis quotidie inspiciendi, mature fa-
 miliarem sibi reddant, suademus. Sunt, qui ve-
 sicantium loco, *aquam fervidam* cuti admo-
 veant¹⁴⁶⁾. Nos, cutis irritationem generalem de-
 siderantes, ad *frictionem* universi corporis, praeci-
 pue prope columnam vertebralem, ope panno-
 rum siccorum, vel vini calidi, aut aceti¹⁴⁷⁾ re-
 currimus. Pro *balneis* nulla in febribus nervosis
 primariis indicatio invenitur.

Monita. 43. Auxilia hucusque enumerata in usum
 deducens, a complicata nimis et tumultuaria me-
 dendi ratione abstineas. Quodsi magnitudo mor-
 bi

146) CALLISEN von dem Gebrauche des kochenden Was-
 sers als ein blasenziehendes Mittel. (Samml. auserles.
 Abhandl. f. pr. Aerzte. 21. B. 2. St. p. 40).

147) De lotionibus corporis humani variis in morbis
 ope aceti legi meretur HERBERGEO in med. chir. Zei-
 tung. 1825. No. 71—73.

bi postulet, ut cura illius non uni dumtaxat pharmaco committatur, duo, quae tibi indicata videntur (e. gr. decoctum florum arnicae et camphoram, vel infusum valerianae et moschum), separatim, eaque alternis vicibus exhibe. Arto creata medicinalia¹⁴⁵⁾ praeter quam quod ingratisima sint, carissimoque pretio veniant, id praesertim mali portendunt, quod, quale in iis contentum pharmacum aut profuerit aut nocuerit, determinari nequeat. — Porro quum nostro in morbo nullum pharmacum per incantamentum juvare possit, quodcunque illorum praevia matura deliberatione tandem eligatur, id ipsum saltem per nychthemeri spatium (nisi rerum positiones omnino mutatae appareant) continuetur. Pharmaca, quae mane descripta sunt, circa meridiem jam rejicere, tuncque praescripta iterum ad vesperras remove, talique pacto paucorum dierum spatio aggeres tormentarios ampullarum, scatularum aliorumque involacro sepositorum pharmacorum, circa lectos aegrorum et vicinas fenestras, ut saepe vidimus, extruere, nisi ignorantiae, saltem

145) En talem scandalosam formulam: R. Radicis serpentariae, valerianae àà drachmas duas. Infund. o. s. q. aquae fontanae fervidae. Colat. unciam octo adde: Camphorae subactae grana sex, aetheris sulphurici drachmam semis. Extracti corticis peruviani drachmas duas. Syrupi corticum aurantium unciam unam! —

saltem pusillanimitatis medici amplum praebet testimonium. Altera vero ex parte etiam obstinatio, qua pharmaca, quae evidenter nocent, ulterius continuantur, evitanda est. Quo magis morbus ad convalescentiam vergit, eo rarius eoque minore dosi propinantur pharmaca: ast gradatim!

§. XXXII.

De convalescentia post febres nervosas.

In genere. 1. *Convalescentia* post febres nervosas, tum secundarias, tum primarias, nisi morbus (quod sat rarum est) tumultuaria crisi terminetur, pedetentim ingruere solet. Varii illius tunc habentur gradus, probe distinguendi. In convalescentia *incipiente* symptomata quidem febrem constituentia evanuerunt, at nonnulla adhuc phaenomena morbosa, inprimis ex illis, quae ad crisis spectant, perseverant. Haec in convalescentia *confirmata* vix amplius observantur; tanta autem virium dejectio praesto est, ut functionum plurimarum laesum remaneat exercitium. Eo praeter quandam debilitatem restituto, *absoluta* dici potest *convalescentia*.

2. Ingruente convalescentia consuetudines
 Con-
 vale-
 scientiae
 phaeno-
 mena. sani hominis sensim sensimque redeunt. Puta
 rationem screandi et nares mungendi; desiderium

rium pulverem nicotianae naribus attrahendi, coffeam, vinum bibendi etc. Haud pauci de auditus gravitate et memoriae factura conqueruntur. Multi animum admodum irritabilem, et quandoque infantilem produnt; sub minima enim illius commotione in risum fletumque vicissim prorumpunt. Mira permultis est voracitas, continuaque de cibis sollicitudo. Interdum idea quaedam fixa, praegressi fugatique caeterum delirii effectus, isto difficulter eradicanda restat¹⁾. Sunt alii, qui superato morbi periculo, de vita nunc demum desperare incipiunt²⁾. Quamplurimi

1) Sic Vilnae mercatorem, solvendis debitis imparem, curavi. qui vigente morbo continuo de tribus millibus aureorum numorum, apud socium depositorum, delirabat. Qui vir quum in convalescentiae stadium pervenisset, utut caeterum mentia omnimodo compos, nihilominus memoratae ideas adeo tenaciter adhaesit, ut uxorem ad instituendos propter istam pecuniam greisus instigaret.

2) Conspicua matrona Vilnae febre catarrhali in nervosam transgressa laborabat. Solus usque ad convalescentiam adstitit. Hac ingruente aegrotata tanto correpta est mortis timore, ut nunc et aliorum medicorum consilium postularet. Ridebat ipsam tota familia, est incassum. Sanitati dein ex integro restituta, quae fuerat aegra, de illo phaenomeno aibi rationem reddere haud poterat. — Atque hic per transennam recorder aegroti, qui ab infimo gradu ad illum ducis exercitus adscenderat. Viro isto, quippe gravi morbo detento,

mi excruciantur furunculis, ulceribus, tum a vesicatoriis, tum a decubitu relictis, item sudoribus, vomitu, pollutionibus nocturnis, sensu imbecillitatis, tussi, anorexiâ, crinium complicatione pediculorumque proventu. Confirmata magis magisque convalescentia saepe desquamatio epidermidis et quandoque unguium secessus³⁾ observantur. Crines dumtaxat absoluta convalescentia defluere solent.

Recidiva. 3. Devictis regulariter febribus nervosis, *recidiva* vix timenda. Recidivis nimirum neutquam adscribas morbos accidentales, e. c. febres rheumaticas, catarrhales et gastricas, quibus convalescentes, si refrixerint aut gulae indulserint, obnoxii sunt. Interea quum in hominibus sanis ejusmodi febres in nervosas transire possint; eo facilius in convalescentibus, systemate nervoso adhuc debili praeditis, id timendum erit. Jactura humorum et maxime animi pathemata, primariis quoque inter illas febribus nervosis ansam porrigere possunt.

4. Quam-

ipse consilium medicum proposui, quod ille, ad convalescentiam perductus, renovari voluit; cur quæso? quoniam ista scena, qua sedilia multa in semicirculum ponuntur, ac dein a medicis vicissim perorantibus occupantur, quammaxime delectabatur, illamque altera vice libenter vidisset! . . .

3) Bano in Act. soc. reg. Hannov. Vol. I. p. 265.

4. Quamvis ingruente convalescentia regi-
mini studere ut plurimum satius sit; nihilominus <sup>Cura con-
valescen-
tiae.</sup> in administratione pharmacorum, quibus fuga
morbi tribuitur, adhuc per nychthemera unum
alterumve, saltem semel bisve de die, continuan-
dum erit. Secus enim si aegrotus fortuito de-
trimentum caperet, culpa in pharmacorum prae-
postera remotione locaretur. Neque deforent
passim homines malevoli, qui alios ex semet
ipsis judicantes, tali data occasione suspicio-
nem, medicum morbi curam lucra gratia con-
sulto procrastinare, jactarent. Tandem sacrae
consuetudinis leges quoque respectu ad pharmaca
valent. Possent praeterea non solum pharmaca,
sed et venaesectiones, imminente convalescen-
tiae stadio, ex imperfecta crisi relictis malis ex-
posci⁴⁾.

5. *Cibi* nutriendi faciliisque digestionis parca <sup>Continua-
tio argu-
menti.</sup> manu repetitis vicibus porrigendi. Quo minus
aegritudo inflammatorii quid habuerit, eo secu-
rius moderata *vini* aut *cerevisiae fortioris* (e. gr.
Porter) conceditur usus. Familiares singuli sen-
sim

4) *History of a fever which prevailed in the suburbium of Paisley; with an account of the utility of Blood-Letting in the imperfect crises, slow convalescence and lingering ailments. By J. MUIR. (The Edinb. medic. and surg. Journal. Vol. 2.).*

sim sensimque admittendi. Ne eorum colloquia circa res ingratas versentur, curandum. Lectus in confirmata dumtaxat convalescentia deseratur, isque primis vicibus per breve temporis spatium, Crines intricatos vix superato morbo pectini non subjcito; convalescentes enim inde facile cephalacam paterentur. Nec illos rescindito; vita enim periclitaretur⁵⁾. Pediculorum proventui secundum praecepta, alibi tradenda⁶⁾, occurratur. Firmatis viribus balneum tepidum puritatis causa, et tandem rusticatio conducunt.

Finis argumenti.

6. Nisi indicato sub tegimine vires redeant, ad *pharmaca tonica* recurrendum, inter quae convalescentibus prae caeteris salubria sunt *infusum cinchonae frigidum*, *decoctum menianthis trifoliatae cum elixiro vitrioli Mynsichti*⁷⁾,
nec

5) LANGE in *Actes de la société de médecine de Bruxelles*, T. I. p. 94. et *Samml. auserles. Abhandl. f. pr. Aerzte*, XX. B. 2. St. p. 247.

6) P. I. Vol. III. Sect. II. Cap. de psora, psoriasi et phthiriasi.

7) R. Herbae trifolii fibrini drachmam unam. Ebulliat per horae momentum c. s. q. aquae. Col. unciarum septem adde: Elixir Mynsichti a scrupulo ad drachmam semis. M. D. S. tribus vicibus capiat curriculo nyctithameri.

nec non *elixir viscerale Hoffmanni*⁸⁾. Antequam vero ad hujus generis pharmaca devenias, an non forte saburrae restorationi virium obsint, probe examina. Verisimile id erit: si febris praecedens gastrici quid habuerit, si crisis per alvi profluvium facta non sit, si somnus inquietus, non recreans, sique lingua alba, sapor depravatus, anorexia et vomitus obveniant. Quibus casibus *tinctura rhei aquosa cum aqua menthae*⁹⁾ aut *electuarium lenitivum*¹⁰⁾ optime quadrant. Quod spectat ad sudores, facturam memoriae, aliarumque animi et sensuum facultatum, cephalaeam, pollutiones nocturnas, tussim, vomitum, ceterasque a febre nervosa relictas adfectiones, hae, nisi cum virium restauratione pari passu evanescant, illico secundum praecepta in tractatibus de morbis cutis, cerebri, sensuum, medullae spinalis, pectoris, ventriculi etc. tradita, curandae sunt. Ulcera a vesicatoriis vel a decubitu relictas (rejectis unguentis) calore humido fovenda. Enim vero miraculose per ipsam naturam, victu nutriente, lacte, et decocto ex glandibus quercinis tostis parato, suffultam sanantur. Atque ita saltem in corpore sano. Quodsi enim convalescens simul lue scorbutica, venerea, vel
alia

8) Drachma una pro dosi cum cochleari vini.

9) Ana uncias tres. Cap. omni tertia hora unciam unam.

10) Uncia semis pro dosi.

252 DE FEBRIBUS NERVOSIS PRIMARIIS.


alia detentus esset, methodus specifica requiritur¹⁵⁾.

DE

15) Plurimos curavi convalescentes post febres nervosas, quorum exulcerationes a vesicatoriis relictæ, ad perfectam sanationem perducere non potuerunt. Re propius examinata illos syphilide contaminatos detexi. Paucis tunc mercurii dulcis doses, ore assumptæ, extemplo exulcerationes profligarunt.

DE

MORBIS CUTIS.



CAPUT VI

De morbis cutis in genere.

§. XXXIII.

De argumento generatim.

1. **Anatomia et physiologia docent¹⁾**, *cutim* Cutis con-
sideratio.
simul

1) BICHAT *Abhandlung über die Häute im allgemeinen u. im besondern. A. d. Franz. übersetzt von CH. FR. DÖRNER. Tübing. 1802. 8.* — J. B. BANNEAU *histoire naturelle de la peau et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps. Paris 1802.* — K. M. ANDRÉ *de cute humana externa. Lips. 1805.* — KELLIE *historical and critical analysis of the functions of the skin. (The Edinburgh medical and surgical Journ. Vol. 2. p. 170. April 1805.)* — WALTHER *Physiologie des Menschen. Landshut 1807.* — RADEMIN *diss. de functione cutis in statu sano aequae ac in morbo. Götting. 1809.* — CURTII SPRENGEL *institutiones medicae. Amstelod. 1810. 8; T. II. p. 41.* — G. A. GAUTIER *recherches anatomiques sur le système cutané de l'homme. Paris 1811.* — E. J. CARLIER *considérations anatomiques et physiologiques sur la peau. Paris 1812.* — JOS. WILBRAND *das Hautsystem in allen seinen Verzweigungen, anatomisch, physiologisch u. pathologisch dargestellt. Gießen 1813.* — P. H. VEILHERS *quelques considérations sur le système cutané. Paris 1813.* — P. N. CH. DESÉTANOS *considérations anatomiques et physiologiques sur la peau, suivies d'un précis sur les cosmétiques. Paris 1816.* — BÉCLARD *éléments d'anatomie générale. Paris 1823.*

*simul cum epidermide*²⁾, *unguibus*³⁾ *et pilis*⁴⁾, corpori humano, veluti cortex arboribus, extensum sistere indumentum juxta variam illius stirpem varium⁵⁾; eam internas caveas intrare⁶⁾, ac vasis,

2) MAURIT. HOFMANN diss. de cuticula et cute. Altd. 1685. — D. KLINKOSCH diss. de vera natura cuticulae ejusque regeneratione juxta sensum. Prag. 1775. 8.

3) J. GLO. HAASE experient. anatom. ad nutritionem unguium declar. capta. Lips. 1774. — M. F. NÜRNBERGER melet. super digitorum unguibus. Wittemberg. 1786.

4) J. H. KNEIPHOF's *Abhandlung von d. Haaren, deren Beschreibung, Nutzen, Zufällen u. Mittel dagegen. Rotenb.* 1777. (Opus sermone latino conscriptum a. 1754 prodiit). — G. RÖDT BÖRMER de dignitate pilorum remediisque incrementum promovent. et impediunt. Wittemb. 1798. — J. K. PFAFF de pilorum varietate naturali et praeternaturali. Hal. 1799. — GLO. MÜLLER diss. sistens physiologiam et pathologiam pilorum fragmenta. Wratisl. 1816. — H. W. BUCK diss. de pilis eorumque morbis. Hal. 1819. — BLÜMENBERGER *Abhandl. über das menschliche Haupthaar, in histor., anatom., physiologisch., pathologisch. u. therapeutischer Hinsicht.* Berlin 1825.

5) S. TH. SÖMMERHINO *über die körperliche Verschiedenheit der Mohren von Europäern.* Frankf. a. M. 1784. — SM. STANH. SMITH's *Versuch über die Ursachen der ungleichen Farbe u. Gestalt des menschl. Geschlechtes. A. d. E. mit Anmerk. von TH. KÜHNKE.* Braunschw. 1790. — BLUMENBACH de generis humani varietate nativa. Goett. 1793.

6) A. BORN de continuationibus membrarum in E. SANDIFORT thesauro dissertationum. Vol. III.

vasis, tum sanguinis circulo dicatis, tum lymphaticis⁶⁾ et glandulis varii generis, nec non conspicuis nervis ex medulla spinali ortum ducentibus, abundare, atque cum singulis visceribus, praesertim autem cum pulmonibus⁷⁾, ventriculo, intestinis⁸⁾, hepate, renibus, vesica urinaria, partibusque genitalibus, arctissimum alere commercium et postremo non solum *organum tactus*⁹⁾ continere, sed et *officiis exhalationis*¹⁰⁾ et

6) J. GLO. HAAKE de vasis cutis et intestinorum absorbentibus plexibusque lymphaticis pelvis humanae annotationes anatomicae. Lips. 1786. fol.

7) MECKEL diss. pulmonum cum cute commercium etc. illustratum. Hal. 1789.

8) L. MARCHANT *observations de phlegmasies gastro-intestinales terminées par des irritations cutanées.* (Journ. complémentaire du dict. des sciences médicales. T. XXII. 1825. Juillet. p. 89).

9) J. F. SCHRÖTER *das menschl. Gefühl oder Organ des Getastes.* Leipzig 1814.

10) Cfr. Cap. II. §. IX. 1. (7. 8.) — W. CRUIKSHANK *Abhandl. über die unmerkliche Ausdünstung und ihre Verwandtschaft mit dem Athemholen.* A. d. R. von CH. F. MICHAELIS. Leipz. 1793. 8. — CH. H. W. ROTH de transpiratione cutanea, aequilibrui caloris humani conservationi inserviente. Hal. 1793. 8. — F. L. AND. KÖLER de odore per cutem spirante. Gött. 1794. 4. — F. TRÖ. SCHÜTZER de perspirab. cutaneo et sudore. Lips. 1797. 4. — J. FRIEDLÄNDER *über die Perspiration.* V. Ejusd. *Versuche in d. Arzneyk.* 2 Th. Leipz. 1802. (1809.) 8.

Frank Prax. I. 1. 2.

R

et *absorptionis*¹¹⁾ praeesse. Patet igitur, cutim in oeconomia animali eminentem et supra quam vetustas crediderat¹²⁾, occupare locum. Atque ita non in secunda tantummodo valetudine, sed vel in morbis fere omnibus¹³⁾.

Scriptores. 2. GRAECI mala cutis imperfecte describere, si morbi integumentorum capitis, sique erysipelas et phlegmone excipiantur; ac in eo potissime peccarunt, quod diversos admodum morbos sub uno eodemque nomine comprehenderint, quodque contra ea varios unius ejusdemque morbi gradus diversis nominibus insigniverint. ROMANI, excepto CELSO¹⁴⁾, Graecorum vestigia secuti sunt ARABES praeprimis doctrinam vitiorum cutis acutorum excoluerunt, verum saepe nomina morborum praeter necessitatem multiplicarunt. Instauratis in Europa scientiis, de morbis cutis egerunt HIER. MERCURIALIS¹⁵⁾, PAOL. SIMONETA¹⁶⁾,

SA-

11) BRADNER (*Deutsches Archiv für Physiologie*. 1. B.).

12) Quam leviter vetustas de cutis dignitate cogitaverat, testatur HIPPOCRATES in libro de ossibus et GALENUS in Commentariis ad TIMAZUM et in libro de causis morborum Cap. VI. Cfr. E. L. W. NEBEL antiquitat. morborum cutaneorum. Gies. 1798. 4.

13) De cute ut signo in morbis lege scriptores de semiotice, in P. I. Vol. I. Sect. I. §. XVII. praesentis operis enumeratos.

14) De medicina.

15) De morbis cutaneis. Venetiis 1572.

16) Breve compendium totius medicinae. Ticini 1592. Lib. III. cap. 2. p. 319 sq.

SAMUEL HAFENREFFER¹⁷⁾, MINADO¹⁸⁾, alique¹⁹⁾, ex quorum auctorum operibus, multa patientia munitus, irritis infinitis hypothesibus, plurimas tamen utiles medendi rationes effodit. Continet earum haud paucas liber, caeterum empiricus, TOBIAE VOGELII²⁰⁾. Docte porro de morbis cutis egerunt FR. HOFFMANNUS²¹⁾, SCHULZE²²⁾, TURNER²³⁾, ISENFLAMM²⁴⁾, LEIDENFROST²⁵⁾; doctissime autem elegantissimus atque classicus scriptor

R 2

LOR-

- 17) Πανθεχείων ατολόδαρμον, in quo cutis — affectus omnes traduntur. Tub. 1630. Ulm. 1660.
- 18) De humani corporis turpitudinibus cognoscendis et curandis. Lib. III. Patav. 1700. fol.
- 19) LAUR. JOUBERT de affectibus pilorum et cutis praesertim capitis. Lugd. 1577. 8. — MONTAGNANA consilia de aegritudinibus cutis. V. opp. select. Fr. 1601. fol. — J. JESSENIUS de cute et cutaneis affectibus. Pragae 1611. — JON. PETR. FABRI chirurgia spagyrica de morbis cutaneis omnibus. Tolosae 1638. 8. — AEMILIUS CAMPOLONGUS tractatus de morbis cutaneis. v. HALIER bibl. med. P. II. p. 159.
- 20) Curieuse Hautdiener, vorstellend der menschlichen Haut Schönheit und Hässlichkeit. Grätz 1698.
- 21) Diss. de morbis cum colore cutis depravato. Hal. 1714.
- 22) Diss. de cutis exterioribus morbis. Hal. 1740.
- 23) Abhandl. von den Krankheiten d. Haut. A. d. Engl. Altenburg 1766.
- 24) Diss. de morbis cutaneis. Erlang. 1771.
- 25) Diss. de statu praeternaturali succi retis Malpighiani, seu de morbis supracutaneis. Duisb. 1771. Opusc. Vol. III. No. 2.

LORRY²⁶⁾. Multum ordinis demum hanc in doctrinam introduxit SAUVAGES²⁷⁾, multumque simplicitatis SWEDIAUER²⁸⁾. Breviter nimis ac superficialiter, at clare et plene, eam exposuit PLENK²⁹⁾. Hypotheses systematis CULLENII in opere JACKSONII³⁰⁾, germanica versione plane indigno, invenies. Ita hypothesibus pathologiae humoralis abundat opus, caeterum non spernendum, RETZII³¹⁾. REILII systematis notam refert SCHMIDTII diligenter exaratum opusculum³²⁾. Aliis hypothesibus scatet MARCOCI liber³³⁾ etc.³⁴⁾. Multa atque memoratu digna facta opus exhibet CHIARUGI³⁵⁾.

Nullus

26) De morbis cutis tract. Par. 1777. 4. Habetur translatio germanica: *Abhandl. von d. Krankheiten d. Haut. Leipzig 1779.* 8.

27) Nosologia methodica.

28) Novum nosologiae methodicae systema. Hal. 1812.

29) *Lehre von den Hautkrankheiten, a. d. L. übersetzt, und mit einigen Zusätzen vermehrt von WASSERBERG. 2. Aufl. Wien 1789.*

30) *Dermato-Pathologie. A. d. E. Erfurt 1794.* 8.

31) *Des maladies de la peau. Paris 1790.* 12.

32) *Cutis morbi, ex materia animalis mixtura et forma mutatis cognoscendi. Diss. inaug. Halae 1799.* 4.

33) *Entwurf einer speciellen Therapie. 3. Th. 1. Abtheil. Nürnberg 1812.*

34) G. KIESER *über das Wesen und die Bedeutung der Exantheme; eine philosophisch - medicinische Abhandl. Jena 1812.*

35) *Saggio teorico pratico sulle malattie cutanee sordide osservate nel R. Spedale di Bonifacio di Firenze. Firenze 1799. Habetur nova et locupletata editio. a. 1807.*

Nullus vero ex allatis auctoribus WILLAN³⁶⁾, virum, omni nostra laude superiorem, attigit. Operis illius pretium, doctis animadversionibus, quibus FRIESE germanicam locupletavit versionem³⁷⁾, permultum auctum est. Displicet solummodo, quod auctor thesaurum observationum suarum in angustos artificialis systematis limites cœgerit, quod et de aemulo illius TH. BATEMAN³⁸⁾, deque nonnullis aliis³⁹⁾ plus minus valet. Posse enim vel intricatam morborum cutaneorum doctrinam sine hoc erroneo artis adminiculo in ipsorum tyronum usum tradi, ea J. P. FRANK epitomes pars docet, quae morbos cutis amplectitur⁴⁰⁾. Idem testatur splendidissimum de morbis cutis opus, auctore ALIBERT⁴¹⁾. Placuisse modo cele-

36) *Description and treatment of cutaneous diseases.* Lond. 1798.

37) *Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung.* A. d. E. Breslau 1799. 4.

38) *Praktische Darstellung d. Hautkrankheiten, nach WILLAN's System bearbeitet.* A. d. E. von HANEMANN mit Vorrede u. Anmerkung. von K. SPRENGEL. Halle 1815. Ejusdem BATEMANI: *Delineations of the cutaneous diseases comprised in the classification of the late Dr. WILLAN.* Lond. 1815. Fasc. I—V. 1816. Fasc. VI—VII.

39) SUASSO morborum exanthematicorum descript. specim. Vol. I. II. Amstel. 1809. 1816. — WILSON *treat. on cutaneous diseases.* Lond. 1813.

40) Vol. III et IV.

41) *Description des maladies de la peau observées à l'hô-*

celeberrimo viro nexum inter proprias et alienas observationes accuratius exhibere, a subtilissimis nonnullis morborum divisionibus, quae plus adspectui, quam intrinsecae rerum naturae superstruuntur, abstinere, ac majori aequitate de antecessorum laboribus judicare⁴²⁾. WILLAN potissimum et ALIBERT secuti sunt recentissimi de morbis cutis scriptores⁴³⁾, videlicet F. W. NUSHARD⁴⁴⁾, W. AND. HAASE⁴⁵⁾, KLAATSCH⁴⁶⁾, C. A. BERGMANN⁴⁷⁾, S. PLUMBE⁴⁸⁾.

3. In

pital Saint-Louis et exposition des meilleurs méthodes suivies pour leur traitement. Paris 1806. Et: Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau. Paris 1810.

42) Nullo certe pacto intelligi potest, quomodo cl. ALIBERT, post tot tantaque clarissimorum in morbis cutis excolendis tentamina, asserere potuerit: „J'entre dans une carrière presque déserte, où peu d'hommes ont pénétré avant moi, où aucun travail antérieur ne m'a servi de guide etc.“ (§. 1.). Et infra: „J'éloigne de cet ouvrage les discussions futiles auxquelles se sont livrés mes prédécesseurs.“ (Des teignes. §. 1.).

43) Anonymus Lusitanice inscripsit opus: *Ensaio dermatographico, o succinta e systematica descripção das doenças cutaneas. Lisbon 1820.*

44) *Skizze einer Dermato-Pathologie mit physiol. Vorbericht, als med. Inaugural-Diss. Mit ill. Kupf. Prag 1816.*

45) *De exanthematibus chronicis in universum. Lips. 1820.*

46) *Tabellarische Uebersicht der Hautkrankheiten nach WILLAN's System entworfen. Berlin 1824.*

3. In tanta multitudine scriptorum, nihilominus doctrina de morbis cutis magnis adhuc premittitur difficultatibus, ac valde ab eo absolutionis gradu distat, quem aliae medicinae partes jam attigerunt. Nemo autem, nisi ipsa rerum natura, ob id criminari potest. Arduum enim vel plane impossibile foret, cohortem morborum *verbis* exacte designare, quorum haud exigua pars, pro varia mali duratione, pro varia aegrorum aetate, constitutione, pro scalptu, pro varia cutis colore, pro varia illius cura et munditie, pro vario climate, pro varia denique medendi ratione, formas ad infinitum diversas exhibere solet. *Picturis* quidem *verbis* succurrere praesenti aevo satagerunt; at ipse WILLAN jure meritoque fatetur, picturas nec ad varios gradus pelluciditatis pustularum, nec ad copiam et qualitatem materiae ex ulcusculis scaturientis, nec ad mutationes, quae sub decursu morbi contingunt, ostendendas, idoneas esse. Idem fere de *imaginibus* morborum cutaneorum *cera efformatis* valet⁴⁷⁾. Tyronibus igitur commendamus, ut nullam opportunitatem morbos cutis *in natura* observandi negligant⁵⁰⁾.

4. Me-

47) *Die Krankheiten der Haut, der Haare und Nägel am menschl. Körper. Leipz. 1824.*

48) *A practical treatise on diseases of the skin. Lond. 1824. Praktische Abhandl. über die Hautkrankheiten, von S. PLUMBE, a. d. E. übersetzt. Weimar 1825.*

49) HEBENSTREIT diss. de pathologia artis pictoriae plasticaeque auxilio illustranda. Lips. 1801.

Oido no-
ster.

4. Mediam viam inter scriptores, qui genera morborum cutis maxime multiplicant et qui ea nimis circumscribunt, legendo, limites ab utilitate practica desumendo, certamque doctrinae bonitatem incertae perfectioni anteponendo, et maxime illius claritati studendo, eo videlicet scopo, ut facile a tironibus intelligi et in usum ad lectus aegrorum deduci possit⁵⁰⁾, sequentem eligimus ordinem. Innixi scilicet proposito nostro, confinia medicinae potius transsiliendi, quam coarctandi, ad chirurgiam duntaxat *vulnera* et *ulcera* cutis primaria remittimus. Tractatum reliquorum morborum et vitiorum cutis ordimur, ad spectum in universam conjiciendo rem. Posito sic firmo rerum tradendarum fundamento, multas in speciali doctrina evitare licet repetitiones. Hanc vero doctrinam incipimus ab *peticulis*, *miliaribus*, *bullis*,

50) Vitia cutis prae aliis morbis in clinica instituta suscipienda forent, saltem ut diagnosis institueretur. Et medici juvenes itineratores in nosocomiis magnis praecipuis studio morborum cutaneorum incumbere deberent.

51) Gloriarı possum, millenos quos institui medicos, plus quam alias tirones solent, in morbis cutaneis definiendis excelluisse, idque in primis dum doctrinae a me traditae stabent. Praematura enim lectio aliorum auctorum constanter illis plus impedimenti quam commodi afferebat. Doctius quidem de morbis cutis blaterare sciebant, verum oblato eorum uno insolito, aequiparandi erant puero, qui fassus est, se sylvam ob arborum copiam videre haud potuisse.

bullis, urticaria, erysipelate, furunculo, anthrace et *carbunculo*. Sequuntur tractatus de *peste, ephemera sudatoria Anglica, typho et febre flava Americanorum*. Annectitur doctrina *scarlatinae, morbillorum, rubeolae, variolarum, varicellae, variolae mitigatae, zosteris et exanthematis mercurialis*. Examinatis ita morbis cutis *acute decurrentibus*, ad deformitates et aegritudines *chronicas systematis cutanei* pervenimus, quibus adnumerantur *vitiligo, lentigo, chloasma, ecchymoma, erythema, porrigo, rhagades, calli, cornua cutanea, ichthyosis, hystriiciasis, verrucae, condylomata, vitia unguium, item pilorum, strophulus, urticatio, hydroa, pemphigus, psora, psoriasis, phthiriasis, psyracia, herpes, tineae, lepra, pellagra, plica polonica, morbus ruber Cayennae et Crimeae, radesyge Norvegiae, herpes Aleppi, rosa Asturica; Yaws et Pian*. Absolutâ horum morborum doctrinâ, ad alias aegritudines pervenimus, quae, etiamsi cutis *colorem* non immutent, nihilominus ad morbos systematis cutanei pertinent, ad vitia scilicet *officii transpirationis et sensus tactus*. Quoniam vero systema cutaneum arcte cum *textu celluloso subcutaneo* (bursarum mucosarum *sedes*⁵²⁾), hic vero textus similiter cum *musculis* subjacentibus et quodammodo cum *articulis* cohaeret; nec harum partium morbos hic praetercundos

52) B. G. SCHAEFER de bursis mucosis subcutaneis. Erlang. 1825.

eundos esse existimavimus, unde postremo sermo fit de *polypionia*, de *anasarca*, de *emphysemate*, de *induratione telae cellulosa*, de *rheumatismo*, saltem *acuto*, et de ejusdem reliquiis.

§. XXXIV.

Symptomata. Necroscopia. Analysis chemica.

- Genera-**
tim. 1. Ante omnia simplicissimas morborum cutis formas explanabimus, *terminos* sic statuendo *technicos*. His enim sive neglectis sive arbitrario in usum deductis, tota doctrina, rite monente WICHMANN¹⁾, corrui, vel potius condi nequit.
- Stigma.** 2. *Stigma* est cutis punctum (purpureum, bruneum, flavum, lividum, nigrum) sine elevatione epidermidis²⁾.
- Macula.** 3. *Macula*³⁾ est recessio coloris consueti et normalis in una alterave cutis parte⁴⁾.
- Furfur.** 4. *Furfur* est parva exfoliatio epidermidis sub forma, ab ipso nomine satis indicata⁵⁾.
- Squama.** 5. *Squama* est lamina epidermidis plerumque inspissata, albescens, opaca⁶⁾.
- Crusta.** 6. *Crusta* est substantia dura, superficiem externam partis exulceratae cooperiens, ac decidua, saepe iterum renascens⁷⁾.

7. *Pa-*

1) *Ideen zur Diagnostik*. 2. Th. §. 101.

2) WILLAN op. cit. Tab. I. fig. 5.

3) *Macula*, veteribus dicebatur *panus* sive *pannus* (ARNOLDUS de Villa nova. Opp. p. 1158).

4) WILLAN l. c. fig. 8. 5) l. c. fig. 1.

6) l. c. fig. 2. 7) l. c. fig. 3.

7. *Papula* est minima atque acuminata pro-Papula.
minientia sub epidermide cum basi inflammata,
nullum liquidum continens, in suppurationem
haud desinens, plerumque desquamatione furfura-
cea terminata⁸⁾.

8. *Tuberculum*, sive *Phyma*, est tumor durus, Tubercu-
superficialis, circumscriptus, apice plerumque sup-^{lum.}
purans, interdum gangraenescens⁹⁾.

9. *Vesica* est prominentia epidermidis, ma-Vesica.
gnam circumferentiam exhibens, basi irregulari,
fluidum serosum et pellucidum continens¹⁰⁾.

10. *Phlyctaena* est vesicula super basi pro-Phlyctae-
funde rubra sive plumbei coloris¹¹⁾.^{na.}

11. *Pustula* est elevatio epidermidis figurae Pustula.
nunc globosae, nunc conicae, pus sive serum
continens.

12. *Pruritus* est molesta sensatio, ad scal-Pruritus.
pendum imperiose incitans.

13. *Necroscopia* hominum, ex nonnullis mor-Necroscopia.
bis cutaneis defunctorum, docet: eadem phaeno-
mena, quae in variis partibus integumentorum
externorum cernuntur, plus minus vel in mem-
branis *internis* ac in partibus contiguis observari¹²⁾.
Plurimi autem extant morbi cutis, praesertim
chro-

8) l. c. fig. 6. 9) l. c. fig. 9.

10) l. c. fig. 10. 11) l. c. fig. 11.

12) „Ut autem (morbi cutis) corporis summa ita et in-
terna omnia viscera, musculos, nervos, caeterasque
partes solidas obsident, ex hisque primariam ducunt
originem.“ (FARNESIUS de febr. cap. 18.).

chronici, quorum doctrina vel exiguum, vel nullum lucrum a necroscopia obtinet, eo quod magna pars vitiorum cutis cum vita evanescat, et multi non directe morbis cutis, sed aliis causis succumbant. Caeterum nisi ubique per sectiones cadaverum, saltem per examen microscopicum, hoc compertum habetur: morbos cutis pro re nata sedem figere in epidermide, in rete mucoso, in tela cellulosa et membrana adiposa, in glandulis tum lymphaticis tum sebaceis et earum ductibus excretoriis, in vasis tum sanguinis circulo dicatis, tum lymphaticis, in papillis nerveis, in unguibus, bulbis et vaginis capillorum vel, uti plerumque accidit, in plurimis partibus simul. Nihil enim a veritate magis alienum est, quam consueta nunc sedis morbosae uno eodemque in organo, in varia, ex quibus componitur, systemata, citra visus confinia, collocatio.

Analysis
chemica.

14. *Analysis chemica* nuper a cl. ALIBERT ad morbos cutis illustrandos in auxilium ducta est. Quamvis vero parum utilitatis, pro medicina, saltem practica, inde expectandum esse censeamus, libenter tamen et huic examini subscribimus, optamusque, ut chemici hoc in opere medicis amicam porrigere velint manum. Nunquam enim facta, quaecunque demum, inutiliter colliguntur.

§. XXXV.

C a u s s a e.

Genera-
tim,

1. Non omnes sane *causae* morborum cutis
notae

notae sunt. Ad notas, sive praedisponentes, sive excitantes, pertinent: vitia haereditaria et congenita, influxus aetatis, sexus, constitutionis corporis, climatis et vestium, porro immundities, opificia, insecta, vermes, vegetabilia, contagia, venena et pharmaca, tandem alimenta quantitate aut indole peccantia; sanguinis conditio abnormis; secretio morbose sudoris, urinae, bilis, seminis, menstruorum, lochiorum, lactis, adipis: postremo, animi pathemata ingrata, ac errores in motu et quiete, in somno et vigiliis.

2. Varia cutis conditio, varias apud gentes et familias¹⁾, abunde de imperio stirpium in systema cutaneum (praecipue in epidermidem et rete mucosum) testatur. Imperium huiusmodi sese vel ad *morbos cutis* extendere, ex pluribus praesentis libri locis elucebit. Elucebit simul, vel citra vitia *haereditaria*, defoedationes cutis dari *congenitas*²⁾.

3. Quae-

1) Familias novi, quarum singula individua cutim exhibebant vel planam, candidam, mollem instar panni bombycini; vel unctuosam et foedam; vel asperam et furfuribus obiectam.

2) Praeter vitia cutis congenita, quorum in curriculum huius tractatus passim mentio injicitur, sequentia adhuc notatu digna sunt, videlicet: *defectus omnium tegumentorum* observatus in monstro (BARTHOLINUS Histor. anatom. rarior. Hafn. 1654. Cent. III. hist. 5. T. II. p. 15. Cfr. RUYSCH obs. anat. chir. Amst. 1691. obs. 91. fig. 59.), *defectus integumentorum manuum crurum et pedum* (CORDON in ROUX Journ. de

Aetas. 3. Quaevis *aetas* ad proprias defoedationes cutis disponit. Confirmatur id magna factorum copia, a recens natis, ab infantibus, a pubertate, ab aetate media et a senio desumta. Legi de hoc argumento merentur J. P. FRANK³⁾ aut ALIBERT⁴⁾.

Sexus. 4. Quamvis cutis conditio in utroque sexu quodammodo differat⁵⁾, attamen nullus datur systematis cutanei morbus, qui *sexui* uni alterive exclusive proprius dici posset. Plurimi vero morborum cutis longe frequentius feminas invadunt, quam mares. Evirati immunitate quadam gaudere videntur⁶⁾.

Constitutio corporis. 5. Sunt morbi cutis, qui nulli fere *constitutioni corporis* parcent, sunt qui praecipue vel debiles,

médecine. T. XXVI. p. 557.), extensio cutis talis ut in amplas plicas corrugari poterit (TULPIUS obs. med. Amstel. 1672. Lib. I. cap. 57. p. 100.), aut caudas simulaverit (A. W. OTTO *Handb. der patholog. Anatomie. Breslau* 1814. p. 152.), et *defectus epidermidis* (BARTHOLINUS l. c. Cent. I. obs. 21. T. I. p. 36. — Cfr. ALBINI annotat. academ. lib. I. cap. 1.).

3) Op. c. Vol. IV. p. 31.

4) Op. c. §. 17. — ALIBERTUS hfc FRANKIUM ad verbum in suum opus transcripsit, quod ex supra dictis vix expectari potuisset!

5) ACKERMANN diss. de discrimine sexuum praeter genitalia. Mogunt. 1788. 8.

6) Cutis quidem eviratorum citissime rugosa fit; de reliquo autem, quamvis magnum spadonum numerum in Italia cognoverim, non recordor me inter eos morbos cutaneos, nec exceptis variolarum foveis, observasse.

biles, vel robustos aggrediuntur. Praeterea nonnullorum hominum cutis ita constituta est, ut a quacunque demum caussa, sive externa, sive interna, facillime afficiatur?).

6. Nemo mirabitur, *clima* magnum exserere Clima. imperium in morbos superficiei corporis externae, cum vel in morbos viscerum reconditorum influat. De imperio illo testantur inprimis morbi cutis *endemici*, et observatio, quod sicuti eadem vegetabilia hoc sub coelo plantam inermem, — in illo fruticem aculeatum referunt; ita iidem morbi cutanei, sub vario coelo, variam induere videntur formam. In effectu climatis eruendo inprimis ad aërem, ad lucem, ad calorem, ad electricitatem respiciendum, quarum rerum vim in morbis systematis cutanei excitandis plurima facta ostendunt. Interim ne climati effectus adscribas, qui alias causas agnoscant, e. c. contagia, in certas regiones bellorum et commercii ope introducta.

7. Et *vestium cultusque ratio* sibi locum in Vestes. aetiologia morborum cutis vindicat. Notatu digna est

7) *Constitutio psorica HUFELANDII.* (*Journ. der pr. Heilkunde.* 21. B. 4. St. p. 14). Forte aptius *constitutio impetiginosa* vocaretur. Hujus constitutionis peculiaris cutis praesertim si medicorum memores esse deberent, qui morem aevi sequentes remediis externis abutuntur. Quot horrenda spectacula ab illinito unguento ex tartaro emetico vidi! Quot alia ex sinapismorum, vesicatoriorum et foniculorum applicatione!

est *lepra vestium*, de qua Moses loquitur⁸⁾. Ita usus Romanorum, vestes urinâ expurgandi⁹⁾. Debitis palam fiet locis, quid in morbis cutis excitandis valeant pelles, lana, fucus aliaque cutis ornamenta¹⁰⁾. Indusia lintea morbis cutaneis potius obstant; interea et ea saepe contagiorum sunt vehicula.

Immundities.

8. Plebs immunda praecipue morbis cutaneis subjicitur, quod tum ex *immunditie* directe repetere, tum ex eo, quod ista contagiis et insectis cuti infensis faveat, ac transpirationi obstet¹¹⁾, explicari licet. Verum nec nimiam munditiam e catalogo caussarum morborum cutis excludendam esse censemus¹²⁾.

Opificia.

9. Ob immunditiam, aliquando specificam, nec non ob alias caussas et *opifices* haud pauci morbis cutaneis subjiuntur¹³⁾; exemplo sint textores, sartores, homines, in fodinis carbonum fossilium, salis et metallorum viventes, pistores, nautae¹⁴⁾, purgatores caminorum, mercatores vestium

8) MICHAELIS *Mosaisches Recht*. 4. Th. p. 261.

9) PLINII *historia naturalis*. L. XXVIII. 6.

10) De valetudine hominis nudi et cooperti diss. praeside GOTTEL RICHTERO. Goetting. 1763. 4.

11) PLATER de morbis ex immunditie. In *Opusc.* Vol. I.

12) PLAZ diss. de morbis ex munditie intempestiva. Lips. 1746. 4.

13) *Op. cit.* P. I. Vol. I. §. IX. 7.

14) BLANE *Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute*. p. 195.

stium antiquarum, lotrices, aurigae, laniones, rustici etc.

10. *Copia insectorum cuti humanae infensorum* Insecta. infinita est¹⁵⁾, praecipue in plagis calidis humidisque¹⁶⁾. Nec rara sunt exempla insectorum, casu
in

15) HEISE diss. de insectorum noxio effectu in corpus humanum. Halae 1757. — BUCHON *histoire des insectes nuisibles à l'homme*. Paris 1748. — JOERDENS *Entomologie und Helminthologie des menschl. Körpers*. Hof 1802.

16) Insecta hic homini praecipue infensa sunt: *pulex penetrans*, vulgo *chique*, *nigua*, *biecho* (DON ANT. DE ULLOA *voyage historique de l'Amérique méridionale*. T. I. p. 58. — J. G. STEDMANN *voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane*. T. II. p. 52. — SAVARESY *de la fièvre jaune* (p. 94.), *acarus indicus*, *aequinocialis* et *batatas*, *culex pipiens* et *pulicularis* (FERO *Bemerkungen über die durch ihren Stich den Menschen schädli. Insekten in Surinam*. Vide HARLESS *Jahrbücher d. deutschen Medicin u. Chirurgie*. 1. B. 1. Heft. p. 149. 1813.), *bibius sanguinarius*, vulgo *moskara* (PALLAS *Reisen durch Russland*. 1. B. p. 193.), *oestrus humanus* (HUMBOLDT *essay sur la géographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales*. Paris 1806. p. 136.), *phalangium aranioides* sive *solpuga arachnodes* (SONNINI *voyage en Grèce et en Turquie*. T. I. p. 111.), *mosquitos* (*nemoceres* LACRETELLII) et *zancudos* seu *culex cyanopensis*, *c. lineatus*, *c. ferax*, *c. chloropterus*, *c. maculatus*, *conops calcitrans* (A. HUMBOLDT *voyage aux régions du nouveau continent*), *slisque* (SCHÖNBAUER *Geschichte der Columbacher Mücken im Banat*. Wien 1795. — COGROSSI *in nuove ed erudite osservazioni storiche, mediche e naturali*. p. 49. Venezia 1731).

Frank Prax. 1. 1. 2.

S

in ulcera delatorum¹⁷⁾, aut contagiis pro vehiculo inservientium, aut ab aliis animalibus acquisitorum¹⁸⁾. Ad insecta vero homini propria, ac in aetiologia morborum cutaneorum memorabilia, pertinent: *pediculus humanus*, *pediculus pubis*, sive *morpio*, et *acarus exulcerans*.

Vermes. 11. Inter vermes¹⁹⁾ cuti infensos eminet *filaria medinensis*. Forte et *cysticercus cellulosae*, in contextu musculorum majorum habitans, huc spectat.

Vegetabilia. 12. *Vegetabilia* vario pacto cutim afficiunt²⁰⁾,
datas

17) JO. PILAS de verme ex spina dorsi. (Ephem. nat. cur. Dec. I. an. II. p. 180). — CHRIST. STENEVELT diss. de ulcere verminoso. Lugd. Bat. 1697. p. 4. — S. CONRAD ZACHMANN diss. de vermiculis in vulnere. Basil. 1704. — BOISSE sur les vers trouvés dans les pustules de la peau. (Journ. de médecine. T. 32. p. 336).

18) GESSNER in TODT arzneykundige Annalen. 4. (Heft. p. 25.

19) RUDOLPHI entozoorum historia naturalis. Vol. II. P. II. p. 229. BREMER über lebende Würmer im lebenden Menschen. Wien 1819. p. 195. 237. Ejusdem icones helminthum systema Rudolphii entozoologicum illustrantes. Tab. I. XVII. — HELENUS SCOTT in JOHNSON'S medico-chirurgical review 1823.

20) *Plumeriae rubrae* succua vesicas in cute excitat. Idem *hippomane mancinella* et *rhus radicans* (Neuestes Journ. der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der gesammten Medicin. 1810. 1. B. 4. St.) efficiunt. Cutim quoque laedunt: *arum maculatum*, *ovatum*, *arborescens*, *rhus vernix*, *iris germanica*, *euphorbiae*, *daphne mezereum*, *colchicum autumnale*, et *ranunculi*. (SCHMIE-

datas autem morborum formas tantummodo *urtica dioica* et *crenulata*²¹⁾ nec non *rhus toxicodendron* excitare solent.

13. Maximum in cutim imperium exercent *Contagia*, imprimis illa, quae morbis febrilibus ansam porrigunt. Propter hoc etiam notiones generales circa morbos cutis tractatibus febrium contagiosarum praemittendas esse credidimus. In fontibus contagiorum, quatenus causas morborum cutis sistunt, eruendis animalium domesticorum, quin imo et ferarum²²⁾ memores esse juvabit.

14. *Pharmaca et venena* aliquando vitiis systematis cutanei ansam porrigere, docent, nisi effectus *solani dulcamarae* et *rhododendri chrysanthi*²³⁾, saltem ii *valerianae*, *sudoriferorum*, *sulphuris*, *tartratis stibii et potassae*, *mercurii*, *arsenici*, *nitratis argenti*, *thermarum* etc. Pharmaca
et Venena.

15. De alimentorum in cutem imperio mentio. Alimenta.

S 2

nem

den über die blasenziehende Schärfe und das scharfe Princip der Pflanzen, in: Neue Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Halle. 4. Heft.).

21) *Memoirs du muséum de l'histoire naturelle*, 3e année, 4. cahier. p. 359.

22) *Uebertragung einer Hautkrankheit von einer jungen Löwin auf den Menschen*. (HUTELAND's Journ. der pr. Heilk. 1818. December. p. 119).

23) HAHNEMANN *Versuch über ein neues Princip zur Ausfindung der Heilkraft der Arzneysubstanzen*. (HUTELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 2. B. p. 479 — 505).

nem jam injecimus ²⁴⁾ aliaque hujus operis in parte injiciemus ²⁵⁾. Saepe vel in praesente libro de eo disserendi erit opportunitas.

Sanguis. 16. Plurima facta docent, *sanguinem*, sive nimium, sive retentum, sive extravasatum, sive deficientem, sive alio modo peccantem, nec non *vasa*, quibus continetur, inter causas morborum cutaneorum, praecipuum occupare locum. Inprimis variae *coloris* gradationes in morbis maculosis, cruori, diversa ratione reliquis humoribus mixto, originem debent. At cavendum, ne, ubi de vitiis sanguinis, sensus fugientibus, quaestio est, hypothesebus aurem praebeamus.

Transpiratio. 17. Uberrimum morborum cutis fontem sistit *transpiratio* aut suppressa, aut nimia, aut indole peccans. Indole autem potissime, perturbata aliorum organorum secretionem, peccare ea solet.

Urina. 18. *Urinæ* in cutim imperium praecipue in morbis chronicis systematis cutanei evidens est. Et morbi non cutanei, e. c. icterus, diabetes, ischuria etc. de eo testantur.

Bilis. 19. Nullus autem corporis humani liquor, nullumque viscus saepius pro causa morborum cutaneorum habetur, quam *bilis* et *hepar*. Quamvis vero hypothetici ac erroris multum hac in re lateat, attamen, quantum simul veri subsit, non reticebimus.

20. De

24) Cap. IV. §. XXI. 7.

25) P. II. Vol. I. Sect. II. Cap. VIII.

20. De pubertatis in cutim imperio supra di-
ximus. De *seminis* huc pertinente actione prae-
cipue in capite de vitiis pilorum quaestio fiet.

21. *Menstruationis periodus*, vel citra mor-
bum, evidenter in cutem agit²⁶). Evidentissimo
autem systema cutaneum a catameniorum suppres-
sione, tum graviditatis, tum morbi gratia con-
tingente¹, afficitur.

22. Cutis puerperarum specificum cando-
rem²⁷) et, a minima licet compressione, macu-
lam rubram exhibere solet. Maxime vero suppres-
sio *lochiorum* in eam influere videtur.

23. *Mammae* tam arcte cum integumentis co-
haerent, atque *lac* tam evidenter in adipem insluit,
ut haud mirum sit, ex cohibito lactationis negotio
plurima cutis mala originem trahere. Praeterea
lac contagiorum nonnullorum vehiculum est.

24. *Adeps*, contextum cutaneum plus minus
undique adimplens, cum bile, spermate, men-
struis et lacte, praemagnum commercium alens,
in omni morbo febrili, potissime vero in eo, qui
cutis affectione stipatur, facile evanescens, emi-
nentem

26) J. FRANK's *Gesundheitstaschenb. f. das J. 1803.* p. 63.

27) *Gravidarum* cutim candidam fieri monet LORRY (l.
c. p. 243). Idem vero vel de matrona refert, quae gra-
vida faciem *nigram* offerebat. Simile factum GÜN-
THER enarrat (*Salzburger med. chirurg. Zeitung.* 1806
No. 33. p. 127.) nec non JOERRO (*Handb. d. Krankh. des
m. Weibes.* Leipz. 1809. p. 83).

nentem in morbis systematis cutanei gignendis occupat locum²⁸⁾.

Animi pathemata.

25. De *animi pathematum* in cutim actione, quotidiana testatur experientia²⁹⁾. Illorum effectus vel a matre ad prolem utero inclusam, etiam nullum inter hunc et illam nervorum commercium pateat, sese extendunt³⁰⁾. Animi pathemata *deprimentia* vim contagiorum cuti infensorum sustinent, aut latentem morborum cutaneorum fontem

28) LORRY in *histoire de la société R. de médecine* 1779. Et: *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte*. 9. B. p. 222.

29) A verecundia facies et universa cutis rubore suffunditur. Vel modica et occulta ira nasi apex rubescit. Terror, vehemensque ira cutim mortis pallore obducit (PETIT *essay sur la médecine du coeur*. Lyon 1806. Et: *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 23. B. 3. St. J. C. L. RIEDEL über die nachtheilige Wirkung der Leidenschaften, hauptsächlich der Furcht u. des Schreckens auf den menschlichen Körper. *Rust's Magazin*. 20. B. 3. Heft).

30) Non me pudet, *naevos maternos* saepe a rebus, imaginationem matris vehementer ferientibus, repetere. Legatur de hoc argumento: *Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie* 1812. JUIN in nota cl. SEPILLOT; et *Salzb. med.-chirurg. Zeitung*. 1813. No. 6. p. 85. T. TOONIS in *medical repository* 1824. et *Magazin der ausländischen Literatur der gesamt. Heilkunde von GERSON und JULIUS* 1824. July, August 1824.

tem evolvunt, vel praesentes eruptiones repraesentant³¹⁾.

26. Cutis vario plane modo afficitur, prout ^{Motus,} muscoli subiacentes vel ad *motum* excitantur, vel ^{vigiliae.} *segnes* relinquuntur. Praeterea primo in casu transpiratio promovetur, in altero retinetur. Et adeps diversa ratione a motu aut quiete afficitur. Nil igitur mirum, si homines vel motu nimio, vel nimia quiete, ad morbos cutis disponantur³²⁾. Eo facilius id accidit, quo magis motus cum *vigiliis* et quies cum *somno* societatem ineunt³³⁾.

27. Effectus pravi causarum huc usque recensitarum eo certius sequuntur, quo magis istae ^{Connubi-} *con-* ^{um caus-} *sa-* ^{rum.} *nubium* inter se ineunt, quod, cum una causa alteri facile ansam porrigat, saepissime contingere solet.

28. De *caussis proximis* morborum cutis nunc ^{Causa} *disserendum* foret; at, quae inter hasmet causas ^{proxima.} sensuum imperium non fugiunt, e. c. effectus irritationis ab immunditie, ab insectis etc., haec sponte elucet; caeterae, e. c. humorum vitia, solidorum intrinsecae conditiones etc., hypothesis duntaxat, a quibus abhorremus, attingi queunt. Hoc autem non impedit, quo minus allata opportunitate, saltem historice, de iis mentio injiciatur.

§. XXXVI.

31) Exécrabilis nequitiae vir universam faciem pustulis defoedatam habebat; cum ad extremum supplicium duceretur, vultum candidum exhibuit. (*Vie politique du dernier duc d'Orléans. An X. p. 232*).

32) ALIBERT op. c. §. 24. 33) Ibidem §. 25.

§. XXXVI.

D i a g n o s i s.

Genera- 1. *Diagnosis* morborum cutis bifaria est, re-
tim, spectat enim tum *formam*, tum *indolem* morbi. Ab
illa morbo imponitur *nomen*; ab hac illius deter-
minatur *natura*.

D. formae 2. *Diagnosis formae* dum instituis, praeci-
in genere, pitanter ne judices, sed enunciatum semel errorem
difficulter corrigi, maximeque inde famam medici
laedi, memor esto. Quo tutius incedas, tempore
tantummodo diurno atque in loco lucido judices;
ne tamen, morbos cutis dari, qui melius sub
umbra in conspectum veniant, obliviscaris. Cutim
undique, ac, si opus fuerit, oculo etiam armato
considera. Tactum interdum, quin ipsum odora-
tum, in usum revoces.

D. indolis 3. Stabilitâ formâ morbi, ejusdem *indoles*,
in genere, nisi ea inde jam sponte eluceat, determinanda est.
Examina igitur, utrum morbus de quo agitur, sit
acutus aut *chronicus*, id est, utrum veluti morbus
febrilis, brevi tempore curriculum absolvat, aut
instar diurni, sine febre in longum decurrat?
ALIBERTUS quidem distinctionem inter morbos
cutis acutos et chronicos, ob maximam eorum ana-
logiam vilipendit¹⁾, verum alteram opinionem de-
fendimus, credimusque ejusmodi analogiam ad-
spectui potius quam intrinsecae rerum naturae
superstructam esse. Nemo id luculentius WICH-

MAN-

1) Op. c. §. 14.

MANNO²⁾ demonstravit. Vocabimus morbos cutis acutos, *exanthemata*³⁾, chronicos autem, *impetigines*⁴⁾.

4. Detecta *exanthematis* praesentia, indagan- Exanthe-
dum est, utrum effloratio febris cuidam veluti ^{matum} ^{divisio.}
symptoma supervenerit; an *proprium* constituat
morbum? Primo in casu *exanthema symptomaticum*;
in altero, *exanthema primum* habebis.

5. *Exanthemata symptomatica* id gentilitium Exanthe-
habent: quod multifariis et inter se maxime diver- ^{matum sym-}
sis febribus, quin imo ipsis interdum exanthema- ^{ptomatica.}
tibus primariis, et quidem incerto plerumque
tempore, superveniant, quodque, iis comparenti-
bus, morbus primarius saepissime immutatus per-
sistat et haud raro exasperetur. Nec multum in
morbo mutatur dum exanthemata symptomatica
evanescent; quod etiam incerto morbi tempore
contingere solet.

6. Contra *exanthemata primaria* specificam Exanthe-
agnoscunt causam, contagium videlicet sui gene- ^{matum pri-}
^{maxia.}
ris.

2) Op. c. p. 12. 13. 32.

3) A graeca voce 'Εξανθήω, effloresco. Synon. phlegma-
siae exanthematicae, ΣΑΥΥΛΟΓΙΑ; febres exanthematicae
LUDWIGII. GERM. Ausschlagfieber. GALL. Fièvres
éruptives. ANGL. Exanthematous or eruptive fevers.

4) Vocabulum *impetiginis* vario modo interpretatur, ut
videre est apud HIPPOCRATEM (Lib. II. prothet. XIX.
1. et lib. de affect. XXX. v. 4.), apud GALENUM (de-
finition. medicae), apud FOESIUM (oco. p. 379.), apud
CHIAVUOI (l. c. p. 4.) etc. Definitionem J. P. FRANK
amplexi sumus (op. c. Vol. IV. §. 370.).

ris. Suscepto hoc contagio morbus raro exemplo evolvitur. Evolvitur autem suo tempore ut plurimum febre, determinata quadam partium internarum affectione stipata. Comparsente exanthemate, febris evidentem subire solet mutationem. Effloratio plerumque per certum tempus cutim detinet et varias sat constantes mutationes subit. Nec satis! Vel ipso fugato morbo specificae reliquiae restant.

Monitum. 7. Quamvis divisionem exanthematum in *primaria* et *symptomatica* in genere magni faciamus; nihilominus pro illa non ut pro aris et focis dimicandum esse censemus. Hujus enim generis divisiones duntaxat adminicula sistunt, quibus ad ordinem quemdam in doctrinam pro tironum commodo introducendum utimur, quaeque vero adminicula indigna sunt, ut ad lectulos aegrotorum materiam litis inter viros expertos constituent. Natura enim minima rerum discrimina agnoscit, quae in media inter litigantes via inveniri solent.

Stadia varia. 8. Patet igitur, exanthemata *primaria certa stadia* percurrere, illa scilicet *latentis contagii, invasionis, eruptionis, efflorescentiae, desquamationis sive suppurationis et exsiccationis.* His accedit, rite procedente morbo, *convalescentia.*

Stadium latentis contagii. 9. *Stadium latentis contagii* inter temporis punctum, quo aeger contagium suscipit atque inter primum morbi initium, locum obtinet. Stadium

dium hujusmodi aliquando perbreve, ut plurimum nonnullorum dierum, interdum aliquot hebdomadum est. In rebus huc pertinentibus rite enucleandis toti estote.

10. Quam primum contagium, sive alia causa, evidentes in corpore effectus producant, *stadium invasionis* subintrat. ^{Stadium invasionis.} Ingruunt plerumque symptomata prodroma febrium, quibus, ut diximus, ipsa febris succedit. Eodem circiter tempore, pro varia contagii natura, fauces, pulmones, ventriculus, vel plurima organa simul, non excepto universo nervorum systemate, afficiuntur. Ex organo laeso, eo facilius futura efflorationis forma praesagitur, quo magis noti sunt morbi tunc temporis grassantes, quo magis aetas aegri morbis exanthematicis favet, et quo minorem eorum copiam iste jam pertulerit.

11. Praegressa latentis contagii et praesente *stadium eruptionis* suspitione, continua cutis sollicitudo habenda est. ^{Stadium eruptionis.} Vituperio enim tibi foret, si alter adstantium factam jam, nec a te primum animadversam *eruptionem* detegeret. Quibusnam in partibus variorum exanthematum eruptio incipere soleat, sciendum est, si nempe modo inverso rem inquirimus, inescitiam patefacimus. Sciendum quoque, exanthemata primaria nonnunquam *solo invasionis stadio* terminari, nulla scilicet subsequente eruptione.

12. Noto jam jam exanthematis praesentis *stadium efflorescentiae*. ^{Stadium efflorescentiae.}

nere, cutis sub quavis aegri visitatione examinanda est. Praecipue autem eae investigari debent partes, in quibus prima eruptionis vestigia comparuere; hic enim plerumque primae exanthematis mutationes occurrunt, pro ratione exanthematis variae. Exanthemata, quae sub adspectu macularum et papularum efflorescunt, ut plurimum in *furfures* et *squamas* desinere solent. Contra, exanthemata tuberculosa formam vesicularum et pustularum ocyus serius induunt, et plerumque *suppuratione* et *crustis* terminantur.

Stadium
desquamati-
onis. 13. Furfures et squamas jam definivimus: Periodus, qua sese produnt, *stadium desquamationis* vocatur. Eo vigente, pristina epidermis non solum secedit, sed nova simul generatur. Tempore intermedio, nuda fere cutis, sensilis admodum et ad impressiones morbosas recipiendas valde apta est.

Stadium
suppurati-
onis. 14. Exanthemata pustulosa, vigente *suppurationis stadio*, tot abscessulos, quot numerantur pustulae, exhibent. Pro varia morbi indole, pus laudabile, ichorosum, serosum observatur. Saepissime pus hujusmodi contagiosum est, aut saltem contagio pro vehiculo inservit.

Stadium
exsiccationis. 15. Disruptis, vel sponte, vel scalptu, abscessulis, pus, inde manans, ab aëre condensatur ac in crustas convertitur, quod *stadium exsiccationis* vocatur.

Convalescentia. 16. *Convalescentia* post omnes morbos, in primis

primis acutos, memorabilis, absoluto exanthematum primariorum curriculo, maximi momenti est. Quodvis enim horum exanthematum convalescentiam, propriis phaenomenis et periculis insignitam agnoscit. Pericula haec multifaria sunt, ac evolutionem plurimorum morborum, tum acutorum, tum chronicorum, respiciunt.

17. Omne primarium exanthema morbum sui generis constituit. Interea saepe contingit, exanthemata primaria a recto tramite deflectere, ac complicationem induere, inflammatoriam, gastricam, nervosam. ^{Indoles exanthematum primariorum.} Accidit hoc: 1. dum exanthemata, de quibus agitur, in tempus incidunt, quo constitutio annua sive epidemica morbis aliis favet; 2. dum homines invadunt, ad morbos varii generis praedispositos; et 3. dum errores vel in regimine vel in medendi ratione, morbi curriculum perturbant. Hisce observationibus innixi, exanthemata primaria dividimus in *simplicia*, *inflammatoria*, *gastrica* et *nervosa*.

18. Exanthemata primaria dicuntur *simplicia*, ^{Exanthemata primaria simplicia.} dum talia solummodo symptomata prae se ferunt, qualia stricte ad regulare morbi curriculum pertinent, dumque omnibus complicationum indicia destituuntur. Diagnosi illorum duntaxat ex absoluta notione exanthematum peculiarium institui potest. In genere exanthemata primaria, quamvis simplicia, tamen ita constituta sunt, ut semper plus minus ad diathesin inflammatoriam incli-

clinent: unde, si a recto tramite deflectant, non mirum est, quod saepissime inflammatoriam complicationem referant,

Complicatio inflammatoria. 19. *Complicatio inflammatoria exanthematum primariorum*, per consueta signa febris inflammatoriae prodit, at non semper, ut aliis in morbis, clara est. Impetus enim, quo morbus haud raro adortur, celeritas, qua idem versus acmen decurrit, tenera multorum aegrorum aetas et corporis constitutio, impedire videntur, quominus energia illa, morbis inflammatoriis in genere propria, consueto more in conspectum hic veniat, unde facilis in diagnosi error succedit.

Complicatio gastrica. 20. *Exanthemata primaria saepius complicationem induunt gastricam*. Voracitas infantum, praesentia vermium et consensus cutim inter et tubum intestinale, praeter annuam constitutionem, morbis gastricis faventem, abunde de hac complicatione rationem reddunt. Ea praesente, exanthema saepe a norma consueta recedit, febris exacerbationes vehementes horis vespertinis exhibet, ac aeger, sine reliquis indiciis nervosis, magnam virium prostrationem offert, quae sub usu remediorum excitantium in pejus ruit, evacuationibus autem tubi intestinalis, sive spontaneis sive artificialibus, sublevatur. Singula haec, certiora sunt, quam ipsa signa gastrica, nullibi quidem fida, in exanthematibus primariis vero quammaxime fallacia. Saepe enim violentia, qua con-

contagium in teneram aegrorum constitutionem agit, vel absente vitio gastrico, signa excitat gastrica atque *apparentem* ita eonstituit complicationem.

21. Exanthemata primaria interdum et *ner-* Complica-
tio nervo-
sa.
vosum exhibent *characterem*. Hoc vel a primo morbi initio contingit, vel sub illius decursu. Primum longe rarius secundo animadvertitur. Si enim excipiamus aut nonnullas epidemias, aut connubium fortuitum contagii exanthematis primarii cum contagio typhi, aut aegros, ante adventum morbi exanthematici, a lue scrophulosa, venerea, scorbutica sive alia viribus fractos; indoles nervosa raro in primo limine exanthematum primariorum observatur. Observatur quoque haec raro sub decursu morbi, dum recta adhibetur medendi ratio. Qui enim fere continuo malignam, nervosam, sive asthenicam exanthematum primariorum indolem somniant, hi maxime, heu! a vero aberrant. Errant potissimum in eo, quod ex turbis nervorum et ex debilitate, ad indolem nervosam exanthematis concludunt. Sicuti enim illae turbae longe saepius originem suam debent irritamento inflammatorio in nervos praeter modum excitabiles agente, quam atoniae; ita et haec debilitas longe saepius obstaculis, exercitium functionum impredientibus, quam verae adynamiae debetur. Certiora indicia diatheseos nervosae in exanthematibus primariis tibi suppeditabunt: tum
notio

notio genii epidemiae regnantis, vel saltem illius morborum constitutionalium; tum consideratio constitutionis aegri, morborumque, quibus prius subjectus vixit; tum evacuationes copiosae, absque omni levamine, imo cum conspicuo virium decremento contingentes; tum cita vel tarda nimis exanthematis, imperfecte et abnormiter absoluti, eruptio; tum praesentia exanthematum symptomaticorum; tum turbae nervorum, vel facta eruptione exanthematis perstantes; tum denique methodus antiphlogistica sive antigastrica sine successu adhibita.

Observatio.

22. Interdum exanthemata primaria, quam complicationem prius exhibebant, eam, senescente morbo, amittunt. *Mutatio* huiusmodi, medicum in singula attentum et conditionem rerum quovis die comparative ad trutinam vocantem, latere nequit. Quodsi vero lateret, vita aegri non parum periclitaretur.

Impetiginum divisio.

23. *Impetigines*, vel ex caussis localibus contingunt; vel ex labe totius corporis evolvuntur. Illae, *primariae* sive *locales*, hae, *secundariae* sive *symptomaticae* dicuntur.

Impetigines primariae.

24. Antequam impetigo pro *primaria* sive *locali* declaretur, duae potissimum conditiones requiruntur. Oportet enim illam primo cum nullo alio morbo, vel praegresso, vel praesente, nexum habere; secundo, illius sive praesentiam, sive absentiam, nullo pacto, saltem immediate, in exercitium

citium functionum, citra cutim imperium exercere, et vice versa a nulla harum functionum regi. Impetigines ita constitutae sunt: 1. vitia conformationis in systemate cutaneo; 2. vitia ex cute, absque causa satis nota, luxuriante; 3. morbi ab immunditie; 4. morbi ab insectis, a vermicibus aliisque a causis, vel mechanice vel chemice agentibus, et 5. vitia a solius cutis sive laxitate sive rigiditate, sive sensibilitate morbosa. In diagnosi impetiginum localium instituenda, maculas arte *simulari* posse⁵⁾, ne obliviscaris.

25. *Impetigines secundariae* sive *symptomati-* Impetigines secundariae.
cae, cum morbo quodam vel praegresso, vel praesente nexum habent, atque in unam alteramve corporis functionem imperium exercent; aut vice versa, ab una alterave harum functionum reguntur. Talis generis esse solent: impetigines ex *diatesi inflammatoria*, *gastrica*, *arthritica*, *carcinomatosa*, *scrophulosa*, *scorbutica*, *venerea* et *nervea*, verbo, impetigines, quae quondam a *polychymia*⁶⁾, a *polycholia*⁷⁾, et a *cachexia*⁸⁾ repetebantur. Sponte elucet, huiusmodi impetigines tantummodo symptomata morborum universalium esse, qui tamen morbi, haud semper innotescunt,

5) Excitari possunt maculae rubrae cum solutione auri, — maculae flavae cum acido nitrico, — maculae nigrae cum nitrate argenti fuso.

6) A Gr. πολὺ, multum et αἷμα, sanguis.

7) A Gr. πολὺ, multum et χολή, bilis.

8) A Gr. κακός, malus, et ἔξis, habitus.

Frank Prax. I. 1. 2.

T

scunt, eo quod comparente vitio cutis saepe cessare soleant.

Impetigines inflammatoriae. 26. Imperium quod aetas florida, constitutio corporis robusta, calor nimius, alimenta praeter modum nutrientia, liquores fermentati et potissime sanguinis exuberantia in cutim exercent, jam satis indicat, diathesin inflammatoriam ab impetiginibus non esse alienam, quod praeterea a magna factorum serie confirmatur. *Impetigines inflammatoriae* sedem praecipuam figunt in vasis sanguinis circuitui dicatis. Illas haud raro cum vitiis cordis et arteriarum nexum habere experti sumus. Nexus impetiginum cum morbo *systematis venosi*, vulgo *haemorrhoides*, jam dudum innotuit. Alias impetigines, de quibus agitur potissimum *vasa cutis capillaria* detinere videntur. Utut sit stipari solent rubore, ardore, pruritu aliisque notis phlogoseos. Ut plurimum formam macularum rubrarum et pustularum induunt. Pustulae copiosum pus largiuntur, ab aëris actu coalescens. Impetigines inflammatoriae non solum sine damno sed imo cum emolumento, erumpunt. Exasperantur a rebus irritantibus, tum externe tum interne adhibitis. Diagnosi securissime fit ex aetiologia, quo in opere praecipue suppressionis consuetarum haemorrhagiarum ratio habenda est.

Impetigines gastricae. 27. Nisi in *diatesi gastrica* stricte sumta, quatenus scilicet ex saburris, bile, muco et vermibus

mibus oritur, saltem in prava viscerum abdominalium conditione fons multarum impetiginum inter adultos non solum sed et inter infantes latet. Nunquam igitur de natura impetiginis secundariae iudicium feras, quin prius abdomen exploraveris. Memor quoque sis, diathesin gastricam, ob consensum cutis cum tubo intestinali⁹⁾, facile et impetiginibus alterius indolis superaccedere. Praeterea, ne ex colore flavo aut viridescente impetiginis, ad naturam illius gastricam sive biliosam concludas: enimvero jam monuimus, multas gradationes coloris impetiginum ex cruore, vel sincero, vel aliis cum humoribus mixto, explicandas esse¹⁰⁾.

28. Et *diathesis arthritica* suum in impetiginibus exercet imperium, quod facile intelligitur considerando: primitivam arthritidis formam, scilicet podagram, scilicet per inflammationem cutis, maxime pollicis pedis, patefacere; hanc inflammationem

T. 2

saepe

9) Legatur de hoc consensu *Tissot oeuvres. T. XII. p. 71.*

10) Haec observatio non latuit *SWIETENIUM*, qui de erysipelate quaestionem instituendo (*Commentar. in aph. Boerhaav. T. I. §. 380*) ait: „Cum autem erysipelatosi loci color aliquid flavescentis rubro misti haberet, *bilem*, tanquam causam praecipuam erysipelatis incusaverunt veteres medici. Sed novimus hodie serum sanguinis naturaliter flavescere; unde ubi pauculum rubri cum multo sero haeret in vasis serosis obstructis et inflammatis, color ille ex rubro flavescens in parte affecta oritur.“

saepe tophos sequi; hujusmodi tophos arthriticos, vel ad alia cutis loca, potissime circa articulos, comparere: multas impetigines illos, qui laute vivunt, declinante vita, sub iisdem igitur rerum positionibus, quae arthritidi favent, aggredi, vel haereditario modo in familiis arthriticis vigere; cutim magnum commercium cum organis uropoieticis, in caussa, sive effectu arthritidis eliminando maxime intentis, alere; atque multa symptomata arthritica, comparente impetigine, evanescere. Mirum revera est, classicum de morbis arthriticis scriptorem¹¹⁾, influxus diatheseos arthriticae in cutim obiter tantum meminisse, ac lacunam, ab auctoribus de morbis cutis relictam, haud adimplevisse. Signa impetiginum arthriticarum sunt: reditus morbi periodicus, influxus anni temporum in illas, pruritus, ardor et dolor, quibus aegrotos adoriuntur, levamen malorum internorum ab eruptione, inflammatio cutis in furfures desinens et mali sedes inconstans. Caeterum et hic diagnosi potissimum ex morbis praegressis et ex aetiologia desumenda est.

Impetigines carcinomati-
cae.

29. *Diathesis carcinomatosa*, cuti infensissima, glandulas systematis cutanei, ungues, bulbos crinium, crinesque ipsos, quocunque quidem vitae tempore at maxime ea in aetate, qua fluxus menstruus cessare solet, inquinat. Impetigines car-

11) BARTHEZ *Abhandl. über die Gichtkrankheiten*. A. d. Fr. Berlin 1803.

carcinomaticae saepe saepius vitium constituunt haereditarium. Alias eae naevis maternis¹²⁾, impetiginibus scrophulosis, arthriticis et syphiliticis, sive neglectis, sive male curatis ortum debent. Locum quem sibi impetigines carcinomaticae elegerunt, constanter retinent, cutim valde exedunt, ac interdum ipsa ossa vicina carie afficiunt. Praeterea nonnunquam societatem cum genuino scirrhusive cancro labiorum, nasi, linguae, uteri etc. ineunt.

30. Quemadmodum *diathesis scrophulosa* in Impetiginis scrophulosae universum systema lymphaticum influit, ita et in vasa ac glandulas lymphaticas cutis. Impetigines scrophulosae potissimum in aetate infantili atque juvenili accidere solent, et cutim sub forma tuberculorum, pustularum et crustarum afficiunt, eamque non solum defoedant, sed et contextum illius, plerumque tamen absque magno pruritu et dolore, exedunt. Abscessus, inde secuti, indelebiles cicatrices relinquunt. Nulli cutis loco, nec parte capillata capitis excepta, haec impetigines parcent. Diagnosin ex universis diatheseos scrophulosae notis desumitur. Cavendum vero est, ne impetiginem, propter id, quod forte glandulae subcutaneae vicinis in locis tumescant, praepostere pro scrophulosa declaremus; quodcumque enim malum, cutim lacessens, citra omnem scrophulo-

12) MAUNOIR *Abhandl. über den Mark- u. Blutschwamm oder fungus medullaris und haematodes. Frankfurt. 1820.*

phulosam diathesin, hunc in vicinis glandulis effectum producere potest. Nec ignorare oportet, cutim teneram candidissimamque scrophulosis fere propriam, facillime et aliis non scrophulosis vitii esse obnoxiam.

Impetiginos scorbuticae. 31. *Diathesis scorbutica* cutim praecipue *maculis* defoedat. Interdum et vasa illius varicosa reddit. Accedente tunc inflammatione istorum, facile ulcera oriuntur scorbutica. Fatemur caeterum, diathesin scorbuticam non tam saepe impetiginibus ansam porrigere, quam vulgo creditur, atque omni cum jure, praeter alios, MACBRIDEUM medicis objecisse¹¹⁾, quod in omnibus fere morbis cutaneis chronicis, labem scorbuticam accusarent. Rarius sane diathesin scorbuticam ille reperient, qui non ex uno, sed ex plurimis indiciis ad illius praesentiam concludunt.

Impetiginos venereae. 32. A maculis incipiens et ad pustulas ascendens, paucas impetiginum formas invenies, quae *indolem veneream* interdum non agnoscerent. Impetigines syphiliticae raro pruriunt aut dolent; interdum cum aliorum symptomatum venereorum levamine erumpunt; saepius interim simul cum iis persistunt: unde diagnosi a medico, in doctrina morborum venereorum versato, haud difficulter plerumque eruitur. Ne tamen effectus pra-

vos

11) *Systematische Einleitung in die theoretische und prakt. Arzneykunst. A. d. E. 2. B. p. 902.*

vos mercurii in cutim, cum illis ipsius luis confundamus, probe cavendum est.

33. De actione nervorum in cutim jam egimus, unde patet, vel eam *diathesin*, cui nomen *Impetiginosae* imposuimus, inter fontes morborum cutis chronicorum saepe esse quaerendam. Vario autem pacto impetigines e nervorum vitio generari posse videntur, nunc videlicet transpirationis opus pervertendo, nunc alias secretiones cohibendo, nunc vero sanguinis transitum per propria vasa impediendo. Quum cutis, ut monuimus, nervos suos ex medulla spinali accipiat, ad hanc systematis nervosi partem praecipue respiciendum erit. Impetigines nerveae extemplo ac inopinate oriuntur, periodice recurrunt, ac saepe vel cum vitiis systematis uterini, vel cum labe primarum viarum, vel cum turbis nervorum generalibus, cohaerent.

34. Quemadmodum exanthemata nunc simplicia sunt, nunc complicata, ita et impetigines se habent; ac revera, in frequenti variarum diathesium complicatione, potissimum difficultas diagnoseos consistit. Consuetae *diathesium complicationes* in morbis impetiginosis sunt: illa diatheseos *inflammatoriae* cum diathesi *arthritica*, nec non ea, diatheseos *arthriticae* cum affectione *scrophulosa*, *scorbutica* et *venerea*. Non solum vero *diatheses* variae, sed et variae morborum cutaneorum, tum acutorum tum chronicorum, *formae* inter

Impetiginosae nervosae.

Observationes.

inter

inter se complicantur. De *exanthematibus secundariis* id jam monuimus; verum minoris momenti talis est complicatio, si eam cum complicatione *exanthematum primariorum*, vel cum complicatione *exanthematum cum impetiginibus* conferas. Adde, quod vel ipsae *impetigines locales*, in corpore jam alio a morbo detento, indolem labis universalis induere, ac peculiare complicationis genus afferre queant.

§. XXXVII.

P r o g n o s i s .

P. exanth. 1. *Exanthemata symptomatica* vix aut ne vix
sympto- quidem prognosin generalem admittunt; sed po-
matico-
rum. tius pro *signo* morborum, quos comitantur, in-
serviunt.

P. exanth. 2. *Prognosis exanthematum primariorum* pe-
primario- titur praecipue ex constitutione vel epidemica vel
rum. annua, cujus scilicet constitutionis imperium hosce
in morbos tantum est, ut, qui uno anno pestis
instar saeviunt, aliis annis sine omni periculo de-
currant. Hinc epidemica sive annua constitutio,
magna ex parte et aegrorum temperamento et habi-
tui imperat, artique medicae limites nunc satis
extensos, nunc arctiores ponit¹⁾. In genere, bo-
num

1) Pulchre scribit FRID. HOFFMANNUS (Opp. de febr. Sect. I. Cap. XI. § 1.): „Felix harum febrium exanthematicarum eventus atque curatio non tam in arte medici, quantumvis periti atque agacis posita, sed

num est: dum exanthemata primaria cum ordine decurrunt; dum in aetatem incidunt, quae dentitionem et pubertatem intercedit; dum corpus antebac sanumprehendunt; dum sub atmosphaera nec frigida nec calida nimis comparent, dumque a complicatione aliena sunt. Quo magis protrahitur *stadium latentis contagii*, eo lenior esse solet morbus et vice versa. *Stadium invasionis* sine periculo magno cum impetu ingruere potest, dummodo subsequens *eruptio* morbi vim infringat. Contrarium, inprimis si partes internae magis magisque laedantur, malum est. Pejus erit, si evanescente ante tempus praescriptum exanthemate, partes internae totam vim morbi sustinent et cutis, si ita dicere liceat, vices peragunt. Malum hujusmodi, vulgo *retrocessus exanthematum*, praecipue mutationibus repentinis temperiei, erroribus in diaeta, ac animi pathematibus adscribendum est. Has retrocessus causas, nunc anxietates, nunc motus convulsivi, nunc inflammationes internae, nunc alia sequuntur. Dictae *inflammationes* difficulter resolvuntur ac facile in *exudationem, suppurationem* et *gangraenam* transcunt. Optimum contra ea, si facta eruptione, non solum impetus morbi, ut diximus, frangitur, sed etiam dum exanthema laete floret. Quemadmodum enim forma amoena herbarum innocuarum,

potius a corporis naturae bonitate ac vigore et conveniente regimine pendet."

rum, ab adpectu lurido vegetabilium veneniferorum differre solet; ita et species laeta exanthematum benignorum ab habitu tristi morborum huiusmodi cutis malignorum differt. Exanthemata, quae per *desquamationem* terminantur, plerumque sub illius curriculo *crisin* expectant. Est autem haec crisis illi febrium plane similis, ac plerumque sudore, urinâ et diarrhoea absoluta. Quae in *suppurationem* transeunt exanthemata primaria, haec saepe novo tunc stipantur febris insultu. Prognosis hoc sub stadio multum a virium vitalium conditione, et a statu partium internarum pendet. Crisis solum ingruente *exsiccatione* locum obtinet. Quodcunque exanthema primum, non penitus secundum normam terminatum, facile metastases excitat. In genere, neminem in vado constitutum esse dicas, nisi *convalescentiâ* omnibus numeris absolutâ.

P. impetiginum
primariarum.

3. *Impetigines primariae* sive congenitae sive haereditariae, sanationem plerumque non admittunt. Caeterarum impetiginum primariarum prognosis a natura caussarum, a duratione morbi et a complicatione forte cum vitio totius corporis contracta, pendet.

P. impetiginum
secundariarum.

4. Prognosis *impetiginum secundariarum* ab indole diatheseos, ex qua pullulant, ab aetate et constitutione aegrorum, a morbi quoque duratione, nec non a variis rerum positionibus, suo loco commemorandis, desumenda est. Quamvis enim

enim foedum semper et periculosum quandoque illae malum constituent, nihilominus haud raro cum vero *emolumento* erumpunt, quod imprimis de *impetiginibus inflammatoriis et arthriticis* valet. Illae, praesertim apud juvenes bene nutritos, non aliter e cute, quam gummata ex arboribus, in solo fertiliori vegetantibus, exsudare videntur: hae effectum caussae, prius vagantis, nunc in cute fixae, exhibent. Ex dictis patet: cutim organon, pro parte *emuntorium*, sistere, cujus organi operes plurimae, vel superfluae, vel alio modo nocivae, e corpore eliminantur, quo in *opere criseos processum* non poteris non animadvertere. Ob id ipsum autem mirum haud est, quod impedita aut sublata salutari naturae actione, plurima ac interdum gravissima mala succedant. Accidit nempe, ut eadem morboosa principia, quae per cutim evacuari oportuisset, alias in partes agant (vulgo: *retrocessus impetiginis*) atque hic, nisi eadem prorsus, ac in cute, mala producant, phaenomena saltem iis similia excitent. Partes, cutis vices ita agentes, esse soleant viscera, vel cum cute maximum consensum alentia, vel ob praevisum alium morbum labefactata, vel ob aliam causam, e. g. aut ob aetatem aegri, aut ob annuam constitutionem, aut ob vitium haereditarium, ad morbos disposita. Ad reliquas diatheses quod spectat, notandum est, *impetigines gastricas* sub recta methodo plerumque haud difficulter abigi, sed ob
id

id praecipue in prognosi memorabilem esse: quod vel aliis impetiginibus esse ita immiscere soleat, ut graviores, quam sint, videantur. *Diathesis scrophulosa*, quamvis securius integumenta, quam alia corporis organa detineat, ob id potissime timenda est, quod plerumque cutim magis formosam sibi eligat, quod vel sanata impetigine facile vestigia in eadem relinquat et quod complicationem cum aliis impetiginum causis incundo, curam earum perdifficilem reddat. *Impetigines scorbuticae* duntaxat aetate propecta, aut si diu neglectae fuerint, artis vim eludunt. Quae ex *diathesi carcinomatosa* originem ducunt, impetigines hae paucam sanationis spem relinquunt, ac incaute curatae, graviora adhuc mala, scirrhum scilicet, sive cancrum viscerum portendunt. *Impetigines venereae*, etiamsi horrendae, tamen recta adhibita medela, in aegro caeterum bene constituto, haud difficulter abiguntur. Longe difficilius *impetigines nerveae indolis*, quamvis adpectu levissimae, debellari solent.

§. XXXVIII.

C u r a.

Genera- 1. Medici est, tum ad tuendam cutis formo-
tim. sitatem, tum ad morbos systematis cutanei ante-
vertendos curandosve praecepta stabilire.

Ars cos- 2. *Artis cosmeticae* pars major in conservanda
metica. et augenda cutis integritate et formositate versa-
tur, et quatenus hic scopus cum eo servandae
salu-

salutis conspirat, ad imperium medicinae, id est prophylacticae, certo pertinet. Aliter quidem de arte cosmetica haud pauci inter medicos¹⁾ sentiebant, ac ignominiae adeo notam illi veteris ecclesiae lumina inurebant²⁾; verum cum CELSO³⁾ dicimus: „pene ineptiae sunt curare varos et lentículas et ephelides; sed eripi tamen feminis cura cultus sui non potest;“ — quod cum ita sit, ut sexus femineus tuendae et excolendae formositatis consilia potius a medicis, quam ab agyrtis expectat, optandum est. Neque hac in re medicorum scripta desiderantur⁴⁾.

3. Cu-

- 1) GALENUS de compositione medicamentorum. Lib. I. cap. 3. — CAELIUS AURELIANUS. Lib. I. cap. I. de morbis chronicis. TRILLERUS de remediis veterum cosmeticis, eorumque noxiis, in opusc. medic. parte altera p. 496. — JOAN. LANG epist. med. 43. lib. I. p. 194. HERMAN. BOERHAAVE elementa chemiae. T. II. Part. 3.
- 2) CLEMENS ALEXANDRINUS Paedagog. Lib. II. cap. 12. Lib. III. cap. 2. — BASILIUS MAGNUS op. T. II. p. 114. T. III. p. 575. — JOAN. CHRYSOSTOMUS in vet. test. T. I. p. 498. T. II. p. 863. — CYPRIANUS Lib. de habitu seu disciplina virginum p. 210. — HIERONYMUS de viduitate, ad Furiam. T. I. Ep. X.
- 3) De medicina. Lib. VI. cap. 5.
- 4) HIERONYMUS MERCURIALIS Lib. de decoratione. Venet. 1625. — FALLOPIUS de decoratione. v. opp. — G. W. WEDEL de medicamine faciei, Progr. Jenae 1695. 4. Idem de cosmeticis in sacris. Jenae 1716. 4. — D. W. TRILLER de veterum cosmeticis. Viteb. 1751. 4. v. Opp. Vol. I. — A. L. CAMUS, *Abdeker*,

Prophylactica.

3. Cutis jam a prima nativitate summa habenda est ratio, qua de caussa recens natus⁵⁾, absoluta funiculi umbilicalis ligatura, mox totus aqua tepida et sapone, vel vino quidquam calido et butyro, abluendus, ac praecipue partes genitales femineae a muco, has ipsas obducente, libe-

ou l'art de conserver la beauté. 4 vol. Paris 1754 — 1756. 12. — C. A. DE BERGEN cosmeticae, in artis formam redactae, specimen I et II. Francof. ad Viadr. 1755. 4. — PH. H. BENDER diss. de cosmetica. Argentorati 1764. 4. — KR. A. ZWIERLEIN der Arzt für Liebhaberinnen der Schönheit. Heidelb. 1761. 8. — G. E. KLETTEN Versuch einer Geschichte des Verschönerungstriebes im weibl. Geschlechte; nebst einer Anweisung die Schönheit ohne Schminke zu erhöhen. 2 Thle. Gotha 1792. 8. — BANNEAU L. C. — TROMMENDORFF Kalopistria, oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt. Erfurt 1805. 8. — CH. G. FLITTNER'S u. K. G. NEUMANN'S Kosmetik. Berlin 1806. — KR. J. KILIAN Diætetik der weibl. Schönheit. Hamb. 1806. 8. — CH. H. T. SCHNEGER'S kosmetisches Taschenbuch für Damen, zur Gesundheitsgemässen Schönheitspflege ihres Körpers. Nürnberg. 1810. 8. — J. VAL. MÜLLER'S Handbuch zur Toilettenlectüre für gebildete Frauen und Rathgeber für das schöne Geschlecht zur Erhaltung ihrer Schönheit u. Gesundheit. Frankf. a. M. 1817. 8. — CH. G. FLITTNER Samml. bewährter Vorschriften zu Mitteln, welche die Haut, die Zähne und Haare erhalten und deren Fehler verbessern; ingleichen auch Vorschriften für die Schönen. Berlin 1823.

5) LEVRET von der Behandl. neugeborner Kinder. Vide: Auserl. Abhandlungen f. pr. Aerzte. 1. B. 4. St. p. 126.

liberandae sunt. Cutis plicae saepius examinandae et pulvere tenuissimo lycopodii aut farinae inspergendae. Porro balneum ex aqua tepida quotidie, vel alternis saltem diebus, nullo obstante morbo huic contrario, adhibendum est. Lintea sunt tenuina et, ut saepius mutari queant, satis copiosa. Nec infans, cum liber aëris tepidi accessus illi conducatur⁶⁾, continuo obtegendus est. Simul ad lactis conditionem et ad universum nutritionis negotium respiciendum, atque si nutrix suo minus officio par sit, ea sine mora mutanda. Si alvus aut segnis aut viridis fuerit: ea illico cum *syrupo radices rhei palmati*, addita, sub faecum virore, *magnesia*, solvenda. Nec minor transpirationis et urinae habeatur sollicitudo; quae ultimae scilicet evacuationes si languerent, cum *infuso florum tiliae Europaeae* vel cum leni *decocto herbae violae tricoloris* promoveri deberent. Tertio versus finem vergente aetatis mense, nisi variolarum suscipiendarum periculum id citius postulet, ad *vaccinam* recurre. Absoluta hac magis magisque cutis cura habenda. Non facile, nisi terminato dentitionis opere, infantem sensim sine sensu temperiei mutationibus adsuesci oportet. Balneum tunc pro robustiore infante minus minusque tepidum ac tandem frigidiusculum sit. Satis autem erit,

6) Erinnerung an den Gebrauch der Luftbäder und der Frictionen der Haut, von Dr. GREINER. (Allgem. med. Annalen, auf das Jahr 1811. Altenburg).

erit, praecipue hiemali tempore, eo bis tantum quavis hebdomade uti. Universum corpus debitis vestibus, coelo et anni temporibus accommodatis obtegendum, ac cultus hodiernus, quo infantes collo, pectore et brachiis feminarum instar denu-
datis incedunt, evitandus est. Sic non solum san-
nitati, sed et formositati consulitur, quae ultima
inprimis a frigore, alternatim cum calore cuti ad-
moto, quamplurimum offenditur. Testantur hac
de re praecipue *manus*, utpote quae, semel conge-
latae, pristinam vix unquam recuperare queant
formam⁷⁾. Optime pulchritudini manuum usu
diu noctuque protracto chirothecarum pellitarum,
a sexu sequiori studetur. Nec *unguium* cura ne-
gligi debet. Praecipue vero *pars capillata capi-
tis* attentione digna est: nam si nimia illius ve-
lamenta, affluxum humorum ad cerebrum pro-
movendo, nocent; certo refrigeratio capitis, eru-
ptioni impetiginum obstando, similiter detrimen-
tum affert. Pectinatione quotidie reiterata, crines
quidem, nisi agatur de plicosa progenie, aestivo
tempore et moderate, abscindi possunt, sed nun-
quam radi debent. Nil vero magis infantes ab
exanthematibus et impetiginibus contagiosis, vel
ab insectis securos reddit, quam impeditum cum
aliis infantibus et cum personis immundis pro-
pius

7) Nunquam absque indignatione *neglectum cultus ma-
nuum* in institutis puellarum educationi dicatis, videre
potui.

pius commercium. Grassante exanthemate maligno, scholarum publicarum summa ratio habenda est.

4. *Juvenes et adulti* evitando potus fermentatos, praecipue calidos, et diuturnam in lecto moram cuti optime prospiciunt. Indulgeant contra ea motui corporis, praecipue in aëre libero; adhibeant balnea fluviatilia⁸⁾ ac munditiei vestium corporisque cum industria studeant. Eo magis id necessarium erit, quo magis officium, quod exercent, morbis cutis favet. Sexus sequior radios solares, ventos rigidos, motum nimium et sudores fugiat. In genere mulier, quid propriae cuti
con-

Continuatio argu-
menti.

- 8) P. A. MARTEAU *theoretisch praktische Abhandl. über die Bäder von einfachem Wasser und von Seewasser. A. d. Fr. übers. von CH. F. HELD. Leipz. 1778. 8. — Von der Badeanstalt für kalte Flussbäder zu Hamburg. (Schriften der Hamburgischen Gesellschaft. 3. B.). — Von der Anlegung eines öffentlichen Badehauses. (Pfl. Aufsätze u. Beobacht. aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 5. Samml. p. 216). — DEISCH von Anlegung der Flussbäder. (Reichsanzeiger 1795. No. 71. p. 629). — W. GF. FLOUCQUET das Wasserbett; ein Vorschlag zu einer bequemen und sichern Badeanstalt in Flüssen und Bächen. Tübingen 1798. 8. — D. LAVATER Abhandl. über den Nutzen und die Gefahren des Badens der Jugend an freyen Oertern; nebst Vorschläge, wie diese letzteren zu mindern seyen etc. Zürich 1804. 8. — J. F. S. POSEWITZ Entwurf zur Anlegung einer Bade- u. Bade-Rettungs-Anstalt für Städte an Flüssen. Gießen 1804. 8.*

conducat, quid illi noceat, observet: sunt enim feminae, quarum cutis tam sensibilis est, ut ab innocentissimis rebus, praecipue oleosis et pinguedinosiis, laedatur. Ipsa balnea non omnibus indistincte conducunt. Refert multum aquam pro lotionem caute eligi. Quo purior ea et quo liberior a salibus mediis, eo magis praesenti scopo idonea est. Aqua pluvialis et inprimis *ros*, tempore aurorae exceptus, sicuti regno vegetabili⁹⁾, ita et cuti humanae vel maxime favent. Potissime vero huic adversatur aqua sulphatam calcis continens. Feminae *aquae destillatae* aut *fragariae vescae* aut *florum tiliae Europaeae*, peculiarem vim cosmeticam, experientia edoctae, tribuunt. Quaecumque vero utamur aqua, aëris liberioris accessus immediate post lotionem evitandus; qua de causa haec potius vespere quam mane suscipienda est. Neque lotionibus ultra, quam opus, indulgere oportet. Feminae, quarum cutis ad siccitatem sive ariditatem inclinat, cum fructu *cremore lactis acidulo* utuntur, quo scilicet faciem, collum et pectus ante cubitum humectant atque linteo dein leniter abstergunt. Illis quoque vel *aqua oryzae*, quotidie recenter parata, qua simul cuti

9) Rorem colligit ac dein vegetabilia adaspergenda curat egregius *horti Schönbrunnensis* custos et moderator, Boos, atque huic artificio (quod a feminis propriae cutis curam habentibus didicit), peculiarem formositatem plantarum suarum tribuit.

cuti candor conciliatur, conducit. Ut cutim nimis sensilem ab externis impressionibus quodammodo tueamur, illinitio *vitelli ovi cum aqua subacti*, ad exsiccationem usque relictæ, ac dein ope spongiæ aqua tepidiuscula imbutæ abluti, inservit. Cutis a pulvere arenae, vel a pigmentis conspurcata, optime cum *unguento demulcente* nostro¹⁰⁾ abstergitur. Cuti, a pinguedine veluti a vernice obductæ (cutis unctuosæ), lotio, vel ope *aquæ rosarum rubrarum* additis nonnullis guttis *spiritus rosis marini*, vel ope *solutionis acidæ benzoës*¹¹⁾, amica est.

6. In *ætate senili* optime cuti prospicitur, si cunctæ excretiones, potissimum autem eae urinae et transpirationis debito modo regantur. Urinam debita potus quantitas et vini diuretici usus promovent. Transpirationem sollicitant mora diuturnior in lecto, indusia quidquam aspera, frictio cutis et *balnea* more antiquorum Graecorum et Romanorum¹²⁾, nec non Turca-

Finis argumenti.

U 2

rum¹³⁾

10) *Unguentum demulcens*, ex partibus aequalibus spermatis ceti et olei nucleorum amygdali communis, leni igne invicem fusis ac dein refrigeratis, paratur.

11) *Essentia benzoes simplicis* (paratur ex floribus benzoes spiritu anisi solutis) aquae communi tantum instillatur, donec lactescat (lao virginis).

12) De balneis omnia quae extant apud Graecos, Latinos et Arabas, tam medicos quam quoscunque caeterarum artium probatos scriptores. Venet. 1553. fol. — L. JOUBERT de balneis Romanorum et Graecorum. Francf. 1645. — LUTHER de balneis veterum cum inunctione

rum 11) adhibita. Latente vitio haemorrhoidali, aut suppresso alio cruoris fluxu, si sanguis evidenter in systema cutaneum irrueret, verno imprimis tempore, vel *hirudines* ano, vel *cucurbitulae scarificantes* dorso, admovendae forent. Caeterum, tum apud senes, tum apud alios, ei morbus cutis cum levamine prodeat, ille, veluti maximum naturae beneficium, promoveri potius quam reprimi debet; unde aegri, ne agyrtis aut medicis imperitis, sanationem vitii cutanei promittentibus, aurem praebeant, exhortandi sunt. Juvat imo naturae nisum *fonticulo* vel alio *artificiali ulcere* sustinere.

C. exanth. 6. *Exanthemata symptomatica* curam morbo
sympto-primario accommodatam exposcunt. Sicuti autem
matico-rum. vel aliorum symptomatum peculiarem curam minime negligimus, ita vel eam hujusmodi exanthematum in specie trademus.

C. exanth. 7. *Exanthemata primaria*, dum secundum
primario-rum. ordinem decurrunt, naturae committenda sunt,
omnis

conjungendis. Erford. 1771. 4. — CAMERON *the baths of the Romans*. Lond. 1772. fol. — E. WICHELHAUSEN über die Bäder des Alterthums, insonders der alten Römer, ihren Verfall und die Nothwendigkeit, sie allgemein wieder einzuführen. Mannh. 1807. 8. — FRANCESCO BRUNI *memoria sopra i bagni degli antichi, e su la necessità di riassumerne la pratica a tempi nostri*. Fiorenza 1811. 12.

13) Cutim post balneum manuum ope tractando (*l'art de masser*).

omnia enim medendi ratio, sicuti simplicius, ita quoque securius, ad regimen diaeteticum et ad levamen symptomatum limitatur¹⁴⁾. Si vero exanthemata primaria a debito ordine deflectant, tunc pro re nata methodus medendi activa eousque adhibenda est, donec ad viam praescriptam illa recedant. De singulis speciatim.

8. Praecipuum in cura exanthematum primariorum *simplicium* momentum, in debito *temperiei regimine* collocatum est. C. exanth.
primar.
simplicium. Temperatura modica, quatuordecim circa graduum thermometri Reaumuriani, ac diu noctuque aequalis, optime accommodata esse consuevit. Aeger quidem in lecto, sed stragulis minime obrutus decumbat. Praesertim vero sub alvi depositione ac tempore, quo lectulus sternitur, a refrigerio sibi caveat, unde vas ad faeces recipiendas idoneum et lectus alter in usum duci debet. Lectus loco opportuno sit positus ac nemo cum vestibus aura frigida imbutis aegrum incaute accedat. Neque pulsus manu gelida tangendi sunt. Lintea quidem impune quotidie mutari licet, dummodo neque humida neque frigida sint. Versus finem aegritudinis imprimis transpiratio moderate fovenda est. Quare *potum*, quem primo morbi sub decursu temperaturae cubiculi accommodatum suppeditavimus, nunc tepide haurien-

14) Legi de hoc argumento merentur: BORSIERI (Inst. med. Vol. II. cap. X. §. 310.) et HOHN (Archiv für med. Erfahrung. Jahrgang 1811. p. 311).

rendum offerimus. Ibi *aqua communis*, *lacte* remixta, vel *succo vegetabili* et *saccharo* edulcorata, inservierat; hic *infusum florum tiliae Europaeae* vel *sambuci nigrae* porrigitur. *Victus* per omne morbi curriculum *vegetabilis* et *paucus*, ex jussulis scilicet aqueis, butyro et sale cum avena, oryza, hordeo, decoctis, indicatur. Fructus, sive recentes, sive cocti, dummodo absque vino et aromatibus parati, expetente aegro, nulloque obstante alvi profluvio, concedi possunt. Motus animi et nimia incisi actio evitentur. Evacuaciones spontaneae, sive cruentae sive aliae, nisi limites excedant, minime sedandae. Si alvus deficeret, quotidie ea cum *clystere antiphlogistico*, movenda foret. *Purgantia*, rite monente VOGLERO¹⁵⁾, periculum inferre queunt. Si affinibus aut aegris solum regimen minus arrideat, tunc pro forma magis, ab initio *aqua destillata* sive *fructus rubi idaei* sive *nucleorum pruni cerasi*, ac dein *aqua florum* sive *tiliae Europaeae* sive *sambuci nigrae*, cum syrupis analogis, aut *emulsionibus amygdalarum*, *seminum mali cydonii*, *cucumeris melonis* etc. praescribuntur. Interea cavendum ne pharmacis dulcibus latentibus *vermes* intestinales excitemus, quod periculum etiam a repetitis nimis clysteribus et a diaeta nimis severa imminet.

O. exanth.
primarior.
inflammat

9. Ut exanthemata primaria *inflammatoria* ad simplicitatem reducantur, morbum, absque mora, cum

15) HUFELAND'S Journ. d. pr. Heilk. 1811. December.

cum remediis antiphlogisticis, diatheseos inflammatoriae gradui accommodatis, aggredimur. *Venae sectio*, hirudines, cucurbitulae scarificantes, *frigus* et *nitras potassae*, praecipua hic sistunt auxilia, de quorum tamen usu regulas generales statuere haud audemus. Dum hirudines aut cucurbitulae scarificantes in usum ducuntur, cavendum ne aeger istis sub operationibus frigus suscipiat. Praeterea, nisi alvus jam nimis aperta sit, ad *lenia purgantia*¹⁶⁾ recurrendum. Caeterum regimen ut supra.

10. In exanthematibus primariis *gastricis*, ne C. exanth.
intempestive ad emetica, aut ad fortiora purgan-
tia, praecipue sub stadio invasionis ac eruptionis, <sup>primar.
gastrico-
rum.</sup> confugas. Prius nempe impetum febris lenibus evacuantibus antiphlogisticis moderare et exanthematis, si natura ad hoc sufficiat, liberam evolutionem concede. In proVectiori morbo, cum pulsu molli, remedium, quod *tartritidi stibii et potassae* in parva dosi¹⁷⁾, equiparari posset, non inventes. Nimii illius remedii effectus ope decocti mucilaginosi compescantur. Regimen, quale

16) E. g. serum lactis tamarindinatum, aut: R. Pulpaes amylicae Indicae, succi fraxini orni aa unciam unam. Coque c. s. q. aquae fontis ad colat. unciarum octo. Cap. omni secunda hora unciam unam et semis (pro aegro 8—12 annos nato).

17) R. Aquae florum sambuci nigrae uncias octo. Tartari emetici granum unum. Syrupi sambuci unciam semis. M. cap. omni secunda hora unciam unam.

le in febris gastricis, praescribendum. Temperatura autem major, quam in exanthematum simplicium cura, requiritur. *Vermibus intestinalibus* in morbis exanthematicis vix aliter quam *oleo amygdalarum dulci*, illo *ricini* communis (dummodo non rancido) nupto silentium imponi potest. Fortiora enim anthelmintica febrem intendunt, tubum intestinale irritant, malumque malo addunt.

C. exanth.
primar.
nervosorum. 11. Exanthemata primaria *nervosa*, concessis haud paucis exceptionibus, in cura eorum speciali tradendis, secundum regulas in therapia februm nervosarum expositas, pertractantur. Praecipua indicatio in eo consistit, ut vires vitae sustineantur. Sustinentur autem potissime sub *temperatura calidiori*, *jusculis nutrientibus*, *vino*, *cortice cinchonae officinalis*, *acidis mineralibus et camphora*. Methodus hujusmodi tam diu valebit, quamdiu morbi character nervosus persistet.

Monitum. 12. Mutatio frequens indolis exanthematum primariorum, facilis, sub eorum decursu, diathesium complicatio, nec non plurimorum aegrorum, maxime infantum, morositas, obstinatio, ingentes medentibus difficultates opponere hic solent. Ut sub dubia rerum positione, quoadusque id fieri licet, secure incedamus, a remediis heroicis, donec lux major affulgeat, abstinendum est. Cunctando enim haud raro restituitur res, ac nisi ipsa natu-

natura responderit, ab arte sane parum aut nihil expectabimus.

13. Ut evanescente ante debitum tempus ex. C. retro-
 anthemate, locisque internis inde gravi modo affe-
 ctis, morbus pristinus ad cutim reduci queat, pri-
 mum est *causam retrocessus* indagare. Ea dete-
 cta, quoad potest, removenda, aut saltem pravi
 illius effectus corrigendi sunt. Hunc ad scopum,
 pro re nata, methodus nunc antiphlogistica, nunc
 antigastrica, nunc sudorifera indicatur. Ne hac
 ultima abutamur, cavendum est. Non enim quod-
 vis exanthema a cute dispersum, ad eandem rur-
 sus per sudorifera revocatur. Idem de vesicato-
 riis, de sinapismis, de frictionibus cutis, praeser-
 tim ope aceti calidi¹⁵⁾, de balneis tepidis, de
 cucurbitulis siccis, de emeticis aliisque remediis,
 in doctrina speciali commemorandis, dicendum
 est.

14. Cum quodvis exanthema primarium con- C. conva-
 valescentiam sibi propriam agnoscat, cuivis con-
 valescentiae et propriam curandi rationem esse,
 patet. In genere, convalescentes quammaxime ab
 atmosphaerae vicissitudinibus custodiendi sunt.
 Si pulsum quaedam irritatio, calores fugaces,
 somnus irrequietus et anorexia transitum convale-
 scentiae in sanitatem perfectam impedian, lene
 alvum evacuens remedium indicatur.

15. Im-

¹⁵⁾ HERBERGER in *medizinisch - chirurg. Zeitung* 1825.
 No. 71 - 73.

C. impetig.
genera-
tim. 15. Impetigines locales *remedia topica*, —
symptomaticas vero *auxilia universalia* exposcere,
vix opus est ut moneamus. Impetigines sympto-
maticas haud raro ita constitutas esse, ut praeter
methodum universalem et topica auxilia sibi exi-
gant, alibi docebimus. Caeterum non omnia,
quae cuti *topice* admoventur, remedia effectum
duntaxat *localem* exercent.

C. impetig.
localium. 16. Priusquam cura *impetiginis localis* susci-
piatur, num forsitan per artem major, quam mor-
bus ipse fecisset, cutis deformitas immineat, per-
pendendum est. Animadverti dein probe oportet,
an impetigo, prima quidem origine localis, tractu
temporis cum vitio universali societatem iniverit?
In genere, in omni impetigine, jam diu perstante,
praecipue si conspicuam illa secretionem inducere
solita fuerit, consuetudinis leges venerandae, ac
habitualis evacuationis vices, ope *ulcerum artifi-
cialium* agenda sunt. De *setaceis*, de *fonticulis*,
de *vesicatorio*, sic dicto, *perpetuo* et de applica-
tione *corticeis daphnes mezerei* hic loquimur. Con-
cessa autem facultate impetigines locales remediis
topicis aggrediendi, secundum rerum positiones
alibi in specie determinandas, vel ad *manum chi-
rurgicam*, vel ad *remedia abstergentia*, vel ad *res
insectis contrarias*, vel ad *auxilia*, quae in cutis
contextum *emolliendo*, *irritando*, *adstringendo*,
sedando, vel *erodendo* agunt, confugiendum est.

Manus chi-
rurgica. 47. Per *manum chirurgicam* vel *ulcera* exci-
tantur

tantur *artificialia*, vel ope *fili*, *forficum*, aut *cultri* excrescentiae auferuntur, vel *hirudinum* atque *cucurbitularum cruentarum* ope vasa cutis deplentur, vel *cucurbitulis siccis* cruor nunc a locis affectis divertitur, nunc ad haec ipsa magis dirigitur, vel *fasciis* et *frictionibus* cutis sustinetur, vel loca illius nimis sensilia *emplastris* aliisque auxiliis ab externis custodiuntur impressionibus.

18. *Abstergentium remedium* ope, cutis ab immunditie liberatur, vel ad alia externa auxilia, <sup>Remedia
abstergentia.</sup> serius applicanda, praeparatur. Pertinent huc: *lotio* ope *aquae simplicis*¹⁹⁾, vel cum *solutione saponis*, *balneum tepidum*, *massa detergens*²⁰⁾.

19. Solis jam abstergentibus remediis cutis nonnunquam ab *insectis* liberatur. Verum ad hu- <sup>Res inse-
ctia con-
trariae.</sup> jusmodi animalcula prorsus extirpanda, pro varia rerum positione, atque pro statu corporis vel sano, vel morbozo, plerumque recurramus opus est ad *oleum*, *nicotianam tabacum*, *helleborum nigrum* sive

19) POLID. LEWIS *philosophische Untersuchungen der Natur u. Eigenschaften des gemeinen Wassers, nebst Betrachtungen über seine medicinischen Kräfte. A. d. E. Stendal 1792. 8.* — J. G. LEIDENFROST *de aquae communis nonnullis qualitatibus tractatus. Lips. 1796. 8.*

20) R. Nucleorum amygdali communis amari, uncias novem. Nucleorum pini pineae uncias tres. Contundantur in mortario ut fiat pulvis. Adde mellis puri uncias sex. Vitelli ovorum n. sex. Portio hujus massae, quae quavis vice in usum trahitur, prius in aqua tepida solvenda est.

sive album, *inulam helenium, veratrum sabadillam, delphinium staphisagrium, colchicum autumnale, acidum sulphuricum, muriatem sodae, magnesium, praecipue vero ad mercurium et ad sulphur.*

R. emol-
liencia. 20. *Cutim relaxant balnea ope aquae tepidae, additis seminibus vel herbis mucilaginosi aut lacte, unctio ope olei, linimenti demulcentis, adipis, et applicatio fots animalis.*

R. irritan-
tia. 21. *Nihil systema cutaneum potentius irritat, quam major caloris gradus, ope balnei calidi simplicis²¹⁾, thermarum²²⁾, balnei vaporis²³⁾*

21) Graduum 29 Th. Reaumur. — 97 Fahrenh. — 36,25 Th. centigradi.

22) E. c. *Wiesbaden* (G. H. RITTER *Regeln bey dem Gebrauche des warmen Wassers zu Wiesbaden. V. Reichsanzeiger* 1797. No. 163. p. 1749. Ejusd. *Denkwürdigkeiten der Stadt Wiesbaden in vorzüglicher Hinsicht ihrer Mineralquellen. Frankf. a. M. 1801.* — F. LEHR *Versuch einer kurzen Beschreibung von Wiesbaden und seiner warmen Mineralquellen. Darmstadt 1800.* — FABRICIUS *manuel du baigneur aux eaux de Wiesbaden. Paris 1812.*) — *Baden in imago Ducatu Badensi* (F. J. KRAFT *Beschreibung der warmen Bäder zu Baden. Tübing. 1794.* — ALO. SCHREIBER *Baden im Grossherzogthume Baden mit seinen Heilquellen u. Umgebungen. Heidelb. 1811.* — W. L. KÖLSCHTER'S *Charakteristik der Mineralquellen in phys. u. medicinischer Hinsicht überhaupt und im besondern Bezuge auf Badens warme Heilquellen u. seine neuen Heilanstalten. Leipz. 1818.* Ejusd. *Die Mineralquellen im Grossherzogthume Baden. Karlsruhe in Baden 1820.*) — *Wild-*

ris²³⁾ et *arenas*²⁴⁾ applicitus. In genere ne quis se ad opus impetigines curandi accingat, nisi in doctrina thermarum et aquarum mineralium versatus. Exemplo unicuique sunt Germaniae triumviri²⁵⁾. Praeter thermas in cute alterius generis

bad (das *Wildbad* im Königr. *Württemberg* von KERNER. *Tübing.* 1813.) — *Pisa* (SANTI *analisi chimica delle acque dei bagni di Pisa.* *Pisa* 1789.) — *Bath* (FALCONER *essay on the Bath Waters.* *London* 1787.) etc.

- 23) SANCHEZ *mémoire sur les bains de vapeur de Russie* (v. *Mémoires de la société royale de médecine.* T. III. p. 233). — MARCARD *von Dampfbädern.* (*N. Magazin für Aerzte.* 4. St. 1776). — K. F. UDEN'S *Nachricht, die zu Berlin angelegten Dampfbäder betreffend.* *Dessau* 1782. — STIX de *Rumoribus balneis calidis et frigidis.* *Dorpat* 1802. 4. — RICHTER *Geschichte der Medizin in Russland.* *Moskwa* 1813. I. Th. p. 76. — CH. FR. HIRSCH *von den Vortheilen der in den Kais. Russ. Staaten gebräuchl. Dampf- od. Schwitzbäder und ihrer Einrichtung.* *Bamb.* 1816. — *Die Russ. Dampfbäder aus d. Franz.* des ANT. RIBEIRO SANCHEZ nach der *Denkschrift des VICQ D'AZYR* von K. JOCHMUS. Mit *Vorr. u. Anmerk.* von J. B. ERHARD. *Berlin* 1819. — F. GREGORIUS de *sudationibus Rossicis.* *Berl.* 1819. Ejusd. *Die Russ. Dampfbäder, ihre Wirkung u. Anwendung.* *Berlin* 1820.

- 24) XXI. *veterum et clariorum medicorum opuscula.* *Mosquae* 1808. p. 292.

- 25) CH. W. HUFELAND (*praktische Uebersicht der vorzüglichsten Heilquellen Deutschlands, nach eigenen Erfahrungen.* *Berlin* 1815. altera editio 1820.), JOH. ULR. GOTTL. SCHÄFFER jun. (*Boytrag zu einer künf-*

ris irritationem *frictiones* inducunt. Localem quoque stimulum illi inferre queunt *saliva*, *urina*, *bilis*, *subcarbonas potassae*, *acetum*, aliisque *acida*, *camphora*, *carbones*, *baccaae lauri nobilis*, *semina sinapis nigrae*, *varia mercurii praeparata* etc.

R. adstringentia. 22. *Adstringenti* ac simul irritanti principio instruuntur *sulphas aluminis*, *sulphas zinci*, *cortex quercus roboris* et similla. Mitissimum autem adstringens ac sedans simul remedium, in *plumbo*, debita cautela adhibito, habetur.

R. narcotica. 23. Eminentem quoque in impetiginibus curandis locum *narcotica*, inprimis *opium*, *hyoscyamus*, *conium maculatum*, *humulus lupulus*, et *oleum amygdalarum amararum* ²⁶⁾ occupant.

R. caustica. 24. Nec *acria* et *caustica*, e. c. *radix hellebori*, *meloës cantharides*, *nitras argenti fusus*, *potassa pura* etc., excipi merentur.

C. impetiginum symptomaticarum. 25. In *impetiginibus symptomaticis* remedia, diathesi, ex qua cutis vitium pullulat, accommodantur oportet. Patet hinc, neminem impetigines secundarias rite curaturum esse, nisi prius regulas, ad morbos primarios curandos tradendas, probe calluerit. In genere, securius curam remediis in-

ternis

tigen wissenschaftlichen Ansicht der Wirkungen mineralischer Wässer. Regensburg 1824.) et F. L. KNEYSIO (über den Gebrauch der natürl. u. künstlichen Mineralwässer von Karlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont und Spaa. Leipz. 1825).

26) DÖLTL Versuche mit Pflanzengiften. 1792.

ternis ordimur, ac ad *externa* tunc solum devenimus, ubi morbus jam satis in cutim desaeviit; ubi ipsa natura cutis affectionem, inani conatu, dejectere satagit; et ubi perstans antiqua impetigo depositioni secundae obstat. Diuturno autem in morbo, ut alibi, ita et hîc, ad leges consuetudinis respiciendum, ac saepe *ulcera artificialia* reliquis externis remediis praemittenda sunt. Praeterea, ut, durante cura impetiginis symptomaticae, singulae corporis evacuationes rite et abunde procedant, semper opus est.

26. Curam impetiginum *inflammatoriarum*, C. impetig. inflammatoriarum. sub regimine antiphlogistico, leni alvum *purgante* remedio incipimus. In aegro florido, robusto, si- que vitium cutis cum emolumento proruperit, a remediis localibus abstinentes, morbi sanationem quammaxime naturae committimus. Hoc vero non impedit, quo minus, modo quo decet, puritati cutis studeatur. Quodsi autem morbus tanto cum impetu in cutim saeviret, ut doloris vehementia aut cutis destruendae periculum promptius auxilium expeterent; istud in *hirudinibus* vel in *eueurbitulis cruentis*, tum prope impetiginem, tum ad loca, quae cum parte affecta maxime consentiunt, applicitis, habetur. Hirudines quoque vasis, ex quibus suppressa quaedam haemorrhagia revocari optatur, admoveri queunt. *Venae sectioni* in morbis, potius systema vasorum capillarium, quam vasa majora delincentibus, raro, nisi apud sum-

summe plethoricos, locus est. Neque sola cruenta evacuatio hic valet; conducunt enim et *ulcera artificialia*, quae conspicuam evacuationem serosam largiuntur. Quodsi impetigo nexum cum morbis vasorum majorum haberet, usus *acidorum mineralium* et *digitalis purpureae* locum habere posset. Nihil *reditum* impetiginis inflammatoriae, absque emolumento prorumpentis, securius antevertit, quam facta ope aquae frigidae aspersio, aut *balnea fluvialia* ²⁷⁾ nec non *marina* ²⁸⁾ vel istis

27) Vid. supra. No. 4. not. 8.

28) S. G. VOORZ über den Nutzen u. Gebrauch der Seebäder, nebst der Ankündigung einer öffentlichen Seebadeanstalt, welche an der Ostsee in Mecklenburg angelegt wird. Stendal 1794. Ejusd. Neue Annalen des Seebades zu Doberan. 1—10. H. Badezeit 1803—12. Ibid. 1804—12. — Ueber die Privat-Seebadeanstalt bey Travemünde. Lübeck 1803. — G. SWARTENDYK STEERLINGO's Annalen des Seebades bey Travemünde im Sommer 1815. Lüb. 1816. Ejusd. Ideen über die Indicationen, Wirkung und den richtigen Gebrauch der Seebäder. Hamburg 1815. — A. W. DANZMANN's Annalen des Travemünder Seebades v. J. 1817. Lüb. 1818. — F. W. v. HALEM über die Seebadeanstalt auf der Ostfries-Insel Norderney. Aurich 1801. Ejusd. Beschreibung der zum Fürstenthum Ostfriesland gehörigen Insel Norderney und ihrer Seebadeanstalt. M. 3 Kupf. Brem. 1815. — AM. A. ABENDROTH Ritzebüttel und das Seebad zu Cuxhaven. Hamb. 1818. — NEUMEISTER's u. A. RUOK's Beobachtungen über das Seebad zu Cuxhaven im Sommer 1818. Ibid. 1819. — Wie müssen Seebäder eingerichtet seyn? und wie wirken sie? den

istis quodammodo similia²⁹). Calor contra, quocunque demum pacto cuti applicatur, quod de singulis irritantibus remediis valebit, nocet.

27. Impetigines ex vitio abdominali, sive gastrico sive alio oriundae, exposcunt, praeter vinctum selectum, usum remediorum resolventium ac alvum moventium. Inter prima (saltem in aegrotis adultis) aquae minerales saponaceae³⁰), exiguae

C. impetig-gastricarum.

folgsamen Badegästen gewidmet von . . . r . . . g. Leipz. 1820.

- 29) *Ueber die Aehnlichkeit der Salzsoole mit dem Seewasser und den Nutzen der Soolbäder, nebst Nachrichten von dem Fortgange und den Wirkungen des Soolbades bey dem Gradierwerke unweit Salza in den J. 1803 u. 1810. von TOLBERG. Magdeb. 1811. — J. CH. REIL über die Nutzbarkeit und Gebrauchsart der Soolbäder bey der öffentl. Badeanstalt in Halle. Halle 1809. Ejusd. Die Anwendung des Dampfkessels zur Einrichtung örtlicher Qualmbäder. Ibid. 1809. — J. G. F. HENNING die salin. Eisenquellen bey Zerbst und die aus den damit angestellten med. Versuchen hervorgegangenen Erfahrungen. Zerbst 1818. — F. WÜRZER über die Soolbäder zu Nenndorf. Leipz. 1818. — J. H. G. SCHLEGEL Salzburger Heilquelle, ein die Seebäder ersetzendes Mittel (HUYELAND's Journ. d. prakt. Heilk. 1825. May. p. 41). Vorläufige Nachricht über d. Gebrauch der Salzsoolenbäder in K. K. Salz-Kammergute. Vom Med. Dr. FRANZ WOLFF (medizinische Jahrbücher des k. k. östr. Staates. II. B. 1. St. 1824. p. 62). — Ischl und seine Soolenbäder. Wien 1826.*

- 30) *E. c. Schlangenbad in Hessa (Hannöverisches Magazin 1783. 5. St. H. FENNER das Schlangenbad, Marb. Frank Prax. I. 1. 2.*

guae et repetitae doses *tartritis stibii et potassae*, ac, absente omni scorbutica complicatione, tales exiguae et repetitae doses *muriatis hydrargyri*³¹⁾; — inter altera *aquae minerales salinae*³²⁾,
radix

1806. — JUST. FENNER über den nützlichen Gebrauch der Heilbäder v. Schlangenbad. Wiesbaden 1816). — Lachowitz in Bohemia (systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen u. Bäder. Leipz. 1801. 1. B. p. 125). — Plombières in Lotharingia (MALOIN in mémoires de l'académie des sciences 1746. p. 109. Mem. pour servir à l'histoire naturelle et médicale des eaux de Plombières par Mr. MORAND membre de l'acad. R. des sciences. T. V. p. 128). — Loka in Suecia (BERNIUS von den Lokaquellen. Vid. et BERGMANNI opuscul. physico-medica. T. IV.).

31) Calomel (sexta pars grani in homine quamvis adulto, per nonnullas hebdomades continuata, effectu destitui non solet).

32) E. c. *aquae amarae* (FR. AMER. REUSS Naturgeschichte des Biliner Sauerbrunnens in Böhmen. Prag 1788. Ejusd. Die Mineralquellen zu Bilin. Wien 1808. Ejusd. Das Saidschitzer Bitterwasser, physikalisch, chemisch und medicinisch beschrieben. Prag 1791. Ejusd. Chemische Untersuchungen des Karolinen-Brunnens oder Saidschitzer Bades; in der Herrschaft Neudorf im Saatzter Kreise. Dresden 1798. — F. K. v. REILLY's Untersuchung des Bitterwassers zu Steinwasser in Böhmen. Prag 1791.), *fontes Carolini* (BECHER Untersuchungen des Sprudelwassers im Karlsbade. Prag 1771. Ejusd. Neue Abhandlungen über das Karlsbad. 3 Thle. Leipz. 1772. — J. F. Frhrn. v. RACKNITZ Briefe über das Karlsbad und die Naturprod. d. dort. Gegend. Dresd. u. Leipz. 1788. — M. H. KLAPROTH's chemische Un-

radix rhei palmati, salia media etc., primum

X 2

locum

tersuch. der Mineral-Quellen zu Karlsbad. Berl. 1790. — J. K. E. HOSER's Beschr. von Karlsbad. Prag 1797. — K. L. STÖHR Kaiser-Karlsbad und dieses weitberühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten f. Curgäste, Nicht-curgäste und Karlsbader selbst. Karlsbad 1813. — FR. SARTORI's Taschenbuch für Karlsbads Curgäste, wie auch für Liebhaber von dem Naturschönheiten etc. Wien, Prag u. Karlsbad 1817. — Freymüthige Blätter über Gebrauch und Einrichtung des Karlsb. für Curgäste und Karlsbader selbst von Irgend Jemand. Leipz. 1819. — W. A. LAMPADIUS gehörige Würdigung des Karlsbader Säuerlings, auf chem. u. sonst. Erfahr. gegründet. Freib. 1821. — J. BERZELIUS Untersuchung der Mineralwasser von Karlsbad. Aus d. Schriften der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften übersetzt von D. G. ROSE, herausgegeben mit erläuternden Anmerk. von D. GILBERT. Leipz. 1823.), f. Egerani (Böhmische Literatur für Hydrologie, in BALDINGER's n. Magazin für Aerzte. 15. B. — F. AMBR. REUS chemisch-med. Beschreibung des Kaiser-Franzenbades, oder d. Egerbrunnens etc. Prag u. Dresd. 1794. Ejusd. Anleitung zum Gebrauch des Egerbrunnens od. Fr. Bades. Prag u. Leipz. 1794. — J. K. E. HOSER's Beschr. v. Franzenbrunnen bey Eger. Prag 1799. — G. J. M. GRAUMANN's kurze Darstellung der heilsamen Wirkungen der Heilkraft in Kaiser Franzenbad u. Anleitung, z. Gebrauche dess. Prag 1817. — J. B. TROMMENDORFF's phys. chem. Untersuch. d. Mineral-Wasser d. Kaiser-Franzenbades bey Eger in Böhmen. Angestellt bey d. Quellen im August 1819. Leipz. 1820. — OSANN die Heilquelle zu Kaiser-Franzenbad bey Eger. Berlin 1822.), f. Burdscheid prope Aquigranum (KORTUM

locum occupant. Infantes saepe ab impetiginibus gastricis una *nutricis mutatione* liberantur. In genere curam impetiginum libenter, exemplo *HEBERDENII*³¹⁾, remedio purgante, etiam repetito, *puritatis*, ut ita dicamus, *internae gratia*, dummodo vires aegri aliaeque rerum positiones id permittant, ordimur.

C. impetigin. arthriticarum.

28. Cura impetiginum *arthriticarum* cautiissime, ac praemissis plerumque *ulceribus artificialibus* inchoanda est. Porro ad *regimen diæticum* maxime respiciendum. Carnes, imprimis pingues, sale, rebus aromaticis conditae fumoque induratae, quousque consuetudo fert, fugiendae. Contra ea *juscula testudinum, limacum, ranarum, viperarum ac lacertarum viridum*³²⁾ cum fructu adhibentur. Summopere vero ut *evacuationes alvi,*

uri-

vollständige physikalisch-medicinische Abhandlung über die warmen Mineralquellen u. Bäder in Aachen u. Burscheid. Dortmund 1798.), f. Rohitsch (J. A. SÜZS chem. physik. Untersuchung d. Rohitscher Sauerbrunnen in Steyermark, nebst Anleitung z. Gebr. dess. Grätz 1803.), f. Pöstényenses (WERNHERUS de admirandis Hungariae aquis Hypomnemation. Viennae 1554. — TOROKOS schediasma de thermis Pothoniensibus, Posonii 1755. — E. W. WALLICH über die Bäder in Klein-Pöstény, oder Pöstyen, auch Piestjan, im Neutraer Comitæ des Königreichs Ungarn. Wien 1825).

33) *Commentaria de morborum historia et curatione* p. 93.

34) *DAUBENTON et MAUDUYT in histoire de la soc. R. de médecine a. 1780.*

urinae et transpirationis pro re nata promoveantur, curandum est. *Purgantia* parum acria et *remediis amaris* nupta salibus mediis anteponimus. Attamen et haec salia in aquis mineralibus, praecipue si urinam promoveant³⁵⁾, conducunt. Eminentem enim *diuretica*, inprimis *juniperus communis* et *radix ononidis spinosae* hic occupant locum. Qui majori irritabilitate instructi sunt, a remediis narcoticis, urinam simul promoventibus, e. c. a *stipitibus solani dulcamarae*, bene se habent. Inter *diapnoica*, praecipue varia *antimonii praeparata*, *decocta*, ut dicunt, *lignorum*³⁶⁾, *extractum guajaci aquosum* et *sulphur* sese commendant. Adhibetur sulphur tum interne tum externe, et quidem hic, sub forma tam *balneorum*, sive *frigidorum*³⁷⁾, sive

35) Eminent hoc sub respectu fons S. Pellegrino, cujus laudes quondam cecinit JOSEPHUS PASTA, qui quae nuper commendatus fuit a L. CARRARA (*Saggio delle acque semitermali di S. Pellegrino nel Bergamasco. Bergamo 1820. 8.*) et a J. FACHERIS (*breve istruzione intorno all'acqua medicinale di S. Pellegrino. Bergamo 1824*).

36) E. c. ex lignis lauri sassafras, guajaci officinalis, juniperi communis, ex radicibus smilacis sarsaparillae, chiniae nodosae (smilacis chiniae) etc.

37) E. c. Baldohn in Curlandia (Ekmor's Beschreibung d. Baldohnischen Mineralwassers. Mitten 1795.), Smorodon et Widze in Lithuania, Mödling (J. SARENK physikalisch-mediceinische Abhandlung über die in Mödling in Oestreich unter der Enns, neu entdeckte Mineralquelle, ihre Bestandtheile, Gebr. und Wirkung in verschiedenen Krankheitsfällen. Wien 1817).

sive *thermalium*³⁸⁾, sive *artefactorum*³⁹⁾, quam *vaporis*⁴⁰⁾.

29. Cura

- 38) E. c. *Aquisgranum* (K. G. TH. KORTUM l. c. — G. REUMONT et J. P. J. MONHEIM *analyse des eaux sulfureuses d'Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle 1810.* — L. MEYER *Aachen und seine Umgebungen. Essen 1818.* — E. H. HÖPFNER *ein Wort zu seiner Zeit über die Mineral-Quellen und Bäder zu Aachen. Aachen 1819.*), *Gasteiner Wildbad* prope Salzburg (BARISANI *physisch-chemische Untersuchung des berühmten Gasteiner Wildbades. Salz. 1785.* — J. NIEDERHUBER *einige nothwendige praktische Erläuterungen über den nützlichen Gebrauch des im Hochgebirge des Erzstiftes Salzburg gelegenen Gasteiner Wildbades. Salz. 1792.* — J. E. Ritter v. KOCH-STERNFELD *das Gasteiner Thal mit seinen warmen Heilquellen in Salzburg gelegen. Salz. 1810.* — JOS. MITTERDORFER *Gastunia. Ein Taschenbuch für Gasteins Curgäste. Salz. 1820.*), — *Baden in Austria* (SCHENK *Abhandlung über die Bäder der Stadt Baden in Niederösterreich. Wien 1791.* Ejusd. *Kurze Beschreibung der warmen Quellen und Bäder der Stadt Baden in Niederösterreich. Ibid. 1794.* Ejusd. *Taschenbuch für Badegäste Badens in N. Oestr. Ibid. 1803.* Ejusd. *Medicinischeschirurgisches Archiv von Baden in N. Oestr. Ibid. 1804.* Ejusd. *Die Schwefelquelle von Baden in N. Oestr. Baden 1817.* — J. SERAPH. VOLTA's *chemisch-mineralogische Versuche über die Bäder und Gebirge von Baden; aus d. Ital. übers. von K. Frhrn. v. MEIDINGER. Wien 1792.* — A. ROLLET's *Hygieia, ein belehrendes Handbuch für Badens Kurgäste. Wien 1817.*), — *Landek* (MOGALLA *die Bäder bey Landek. Breslau 1788.*), *Bagnères* (CARRIÈRE *analyse des eaux minérales de Ba-*

29. Cura impetiginum ex *diathesi carcinomatosa* haud multum ab illa impetiginum arthriticarum differt. *Sulphur* usui tum interno, tum externo sub forma etiam vaporis commendari meretur. Item extractum *conii maculati*, decoctum herbae *vincae peruvicae* et *acidum nitricum*. *Mercurius*

C. impetig. carcinomatosa-tum.

gnères. [Vid. Hist. de la soc. R. de méd. 1779. à Paris.), Abano (MANDRUZZATO dei bagni d'Abano. Padova 1789.), Langensalza (Die neu entdeckten salinischen Schwefelbäder zu Langensalza u. Tennstädt im Königr. Sachsen, chemisch untersucht von TROMMSDORFF. Erfurt 1812.), Eilsen (J. HEINECKEN Eilsens Heilquellen und deren Umgebungen in einem Briefe dargestellt. Hann. 1808. — J. CP. GERHARD über die Gas- und Schlamm-bäder bey den Schwefelquellen zu Eilsen und deren ausgezeichneten Nutzen in . . . Hautkrankheiten und mehreren chronischen Uebeln. Berlin u. Stettin. 1. B. 1811. 2. B. 1812.).

39) *Unciae duae hydrosulphureti potasse prius in aqua fervida solvuntur ac dein balneo superadduntur. Lego de usu hepatis sulphuris in morbis cutis: Sammlung auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte. 13. B. p. 253.*

40) GALÈS *mémoires et rapports sur les fumigations sulfureuses, appliquées au traitement des affections cutanées. Paris 1816.* — J. DE CARRO *Anleitung zur Errichtung einer Räucherungsanstalt und zur Anwendung der Schwefelräucherungen insbesondere. Wien 1817.* Ejusd. *Praktische Beobachtungen über die Schwefelräucherungen. A. d. Fr. von Jos. WÄCHTER. Wien 1819.* Schwefeldampf-Bad-Anstalt unter der Leitung des —. BEER in Würzburg. Würzb. 1819. 2 Berichte von dem Erfolg. 1819 — 1820.

curius cane pejus et angue fugiendus. Arsenicum duntaxat externe locum invenire potest. Saepissime impetigines carcinomaticae noli me tangere constituunt.

C. Impet. scroph. 30. Methodus generalis scrophulis medendi, debito loco tradenda, impetiginibus *scrophulosis* quoque accommodata est. Sufficiat hic meminisse, *auxilia topica* (exceptis *balneis* pro re nata frigidis, marinis, tepidis, sulphureis et *ulceribus artificialibus*) etiamsi primo intuitu juvare videantur, fere semper tamen cum damno adhiberi, quae de re tot morbi oculorum et aurium, ab impetiginibus *scrophulosis* praepostere sanatis exorti, ultro testantur. Inter *remedia interna* nullum magis *scrophulae cutaneae* adaequatum est, quam *oxydum hydrargyri et antimonii sulphuratum*⁴¹⁾ in minimis dosibus diuque continuatis porrectum, praecipue si illi, in morbo inveterato, *extractum conii maculati* jungatur.

C. Impet. scorbuticarum. 31. Quae ex diathesi *scorbutica* originem nanciscuntur impetigines, nil nisi regimen et pharmaca huic diathesi accommodata, exposcunt. Inprimis conducunt juscula cum *herbis antiscorbuticis*⁴²⁾, *balnea frigida*, et *lotiones corporis* opae *aceti* sive *acidi nitrici diluti* institutae.

C. Impet. venerearum. 32. Cura impetiginum *venerearum* ex generabilibus

41) *Aethiops antimonialis*.

42) E. c. cum *herba veronicae beccabungae, fumariae officinalis, sisymbrii nasturtii, cochleareae officinalis* etc.

libus syphilidem pertractandi regulis desumitur. Solum hic animadvertimus: *muriatem hydrargyri oxygenatum*, *mercurium solubilem* HAHNEMANNI, *balnea tepida*, *decocta lignorum* ac *acidum nitricum* potiora impetiginum venerearum esse auxilia. *Arsenicum*⁴³⁾ nunquam tentavimus.

33. Impetigines, quas ex diathesi *nervosa* de- C. impetig nervo-
rivavimus, diversam pro re nata curam expetunt. sarum.
Spasmus; in cutim saeviens, remediis *externis emollientibus*, additis, si opus sit, *narcoticis*, tollendus. Intus remedia, quae leniter transpirationem movent, ac simul nervorum nimiam sensibilitatem obtundunt, e. c. *pulvis ipecacuanhae cum opio*, *antimonium cum extracto hyoseyami nigri*, propinantur. Praeterea ad secretiones a spasmo cohibitas respici, ac, secundum rerum positiones ad *hirudines*, ad *purgantia*, ad *diuretica* et ad *tonica* confugere oportet. Inter *tonica ferrum*, in primis in *aquis mineralibus*⁴⁴⁾ *acido carbonico* nuptum,

43) OTTO *Philadelphical medical museum* 1804. I. Vol. p. 47. *Sammlung auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte*. 22. B. 2. St. p. 242.

44) E. c. *fons Cudovensis* (G. PH. MOGALLA über d. Brunnen zu Cudowa. *Schlesische Provinzialblätter* 1797. 2. St. p. 463. Ejusd. *Die Gesundbrunnen zu Cudowa u. Reinerz. Bresl.* 1798.), — f. *Freudenthaliensis* (*Physicalisch-chemische Untersuchung des Freudenthaler Sauerbrunnens in Schlesien. Troppau* 1794. — F. J. PREUSS *der Sauerbrunn u. die Schlackenbäder in Karlsbrunn oder Hinnewieder bey Freudenthal. Bresl.* 1807.),

nuptum, tam pro potu quam pro balneo adhibendis,

— *f. Imnauensis* (KLAPROTH *Untersuchung der Mineralquellen zu Imnau*. Vid. CRELL's *chemische Annal.* 1792. 4. St. p. 333. — F. X. MEZLER's *vorläufige Nachrichten über den Kurort zu Imnau*. Ulm 1795. Ejusd. *Neueste Nachrichten von Imnau mit d. physisch-chemischen Untersuchung der dortigen Fürstenquelle*. Freib. u. Const. 1811.), — *f. Schwalbacensis* (H. C. M. FENNER's *gemeinnütziges Journ. über d. Bäder u. Gesundbrunnen in Deutschland*. Marburg. 1. Heft. Schwalbach 1799. 2. Heft. Fachingen 1801. Ejusd. *Ueber Schwalbachs heilsame Quellen*. Schwalb. 1800. Ej. *Schwalbach u. seine Heilquellen*. Darmst. 1817. — *Für Kurgäste, welche die Gesundheitsquellen zu Wiesbaden, Schlangenbad, Ems u. Schwalbach gebrauchen wollen*. Frankf. a. M. 1805. — JUST. FENNER's *Briefe über Schwalbach, dessen Quellen u. Umgebungen*. Frkf. a. M. 1807. — G. Frh. v. WEDEKIND *über d. Schwalbacher Stahlbrunnenwasser in Hinsicht seines med. Gebrauchs u. seiner chem. Bestandtheile*. Mainz 1815.), — *f. Spadanus* (SANBERG *essai sur les eaux minérales ferrugineuses de Spa*. Liège 1788.), — *f. Driburgensis* (J. F. WESTRUMB's *phys. chemische Beschreib. von der Lage u. den Bestandtheilen des Driburger Mineralwassers*. Erf. 1788. — BRANDIS *Anleitung zum Gebrauch des Driburger Bades u. Brunnens*. Münster 1792. — W. A. FICKER's *Driburger Taschenb. auf das J. 1811*. Paderborn. *Auf das J. 1816*. Ibid.), — *f. Pyrmontanus* (MARCARD *Beschreib. von Pyrmont*. Hannover 1784. Ejusd. *Kurze Anleitung zum innerlichen Gebrauch des Pyrmonter Wassers*. Pyrm. u. Hannover 1791. Ejusd. *Pyrmonter Brunnensbuch für Curgäste zu Hause u. an der Quelle*. Pyrm. 1805. Ejusd. *Ueber die*

dis, contentum, non neglectis animi pathematum moderamine, corporis debito exercitio, diætæ selecta, potissimum lactea, prima loca occupant.

34. Conspicua ingenii acies ad *complicationes* C. complicationum. impetiginum rite curandas requiritur. Nec regulæ generales hîc tradi possunt. Monebimus hinc solum, quod, cum diathesis *inflammatoria* aut *gastrica* saepe impetiginum alterius indolis sociata fiat, *cura præparatoria*, qua scilicet *complicationes* illae, tum *sanguinis detractio*, tum *alvi purgatione* abiguntur, haud raro reliquis remediis praemittenda sit. Praeterea adversus impetigines ex morbo complicato pullulantes commendari meretur
usus

koehlsalzsauren Mineralwasser zu Pyrmont u. deren Arzneysgebrauch. Hamburg 1810. — J. E. TEMPEL'S Beschreibung der neuentdeckten salzhaltigen Mineralquellen in Pyrmont u. von der Heilkraft derselben. Berlin 1794. — J. F. WESTRUMB von der neuentdeckten muriat. salinischen Mineralquelle zu Pyrmont. Hann. 1797. — E. FRANKENAU Pyrmont u. sein Gesundbrunnen im Sommer 1798. A. d. Dän. Altd. 1799. — K. TH. MENKE Pyrmont u. seine Umgebungen mit besonderer Hinsicht auf seine Mineralquelle, hist. geogr. phys. med. dargestellt. Pyrm. 1818.), — f. Schwelmensis (Ueber den Schwelmer Gesundbrunnen, von L. CASTRIGIUS u. C. H. STUCKE. Dortmund 1800.), — f. Krumbachensis (Das Krumbacher Heilbad, von MEZLER. Augsburg 1811. — Nachtrag zur Uebersicht der vielen reichhaltigen Mineralquellen im Königr. Bayern. Weimar 1813).

usus tum internus, tum externus *aquarum mineralium*, quae plurima principia hucusque laudata, eaque modicâ copiâ amplectuntur⁴⁵⁾. Maxime porro

- 45) Inter illas peculiari laude digni sunt fontes *Ems* (*Für Curgäste, welche die Gesundheitsquellen zu Wiesbaden, Schlangenbad, Ems u. Schwalbach gebrauchen wollen. Frankf. a. M. 1805. — K. PH. BRUCKMANN's neue verbesserte u. vollständige Beschreib. der gesunden warmen Bäder zu Ems. Frankf. a. M. 1772. — H. C. TILNIUS Ems u. seine Heilquellen für Bade- u. Brunnengäste u. eine Anleitung zu ihrem zweckmässigen Gebrauch. Wiesbad. 1816. — VOGLER die Heilquellen zu Ems; auch über Heilquellen im allgemeinen. Coblenz 1821.*), — *f. Marienbad* (*J. J. NEHR's Beschreibung der mineralischen Quellen zu Marienbad auf der Stifthererrschaft Tepl, nahe bey d. Dorfe Auschwitz. Karlsb. 1813. — M. FL. SCHMIDT's Anleit. z. Gebrauch der Mineralwässer. Ein Buch für Jedermann, der die Mineralwässer überhaupt u. besond. jenes der Marienbader Kreuzbrunnen gebrauchen will. Wien 1818. — F. A. REUSS das Marienbad bey Auschwitz in der Herrschaft Tepl, phys. chem. u. med. betrachtet. Prag 1818. — K. J. HEIDLER über die Gasbäder in Marienbad. Wien 1819. Ejusd. Marienbad nach eigenen Beobachtungen u. Ansichten. 2 Bde. Wien 1822. — FR. SARTORI's Taschenbuch für Marienbads Curgäste. Wien, Prag und Karlsbad 1819. — Dr. ZIEGLER über Marienbad in Böhmen und das Kreuzbrunnenwasser. 1820. — F. L. RICHTER Marienbad, ein Handbuch für diejenigen, welche diesen Curort besuchen. Prag 1821. — Dr. SCHEU Beobachtungen über die Wirkungen d. Bäder in Marienbad. Prag 1822.*) et *Borszék* (*L. WAGNER diss. inaugur. de aquis medicatis M. P. Transylvaniae. 1773.*

porro ad complicationem *veneream* et *scorbuticam* in impetiginibus curandis respiciendum est, quarum illa *sulphur*, haec *mercurium* fere semper excludunt.

35. Ad *revocandas* sive ad cutim *pellendas* ^{C. retro-} impetigines praepostere fugatas vel aegre prorumpentes, *causae* ^{cessus im-} retrocessus, vel defectus efflorescentiae, ratio habenda est. Porro *ulcera artificialia*, *balnea tepida*, maximeque *thermae* tum *simplices*, tum *sulphureae*, tum *limosae*⁴⁶⁾, denique

— H. J. V. CRANTZ *Gesundbrunnen der Oestr. Monarchie. Wien 1777.* — C. K. MATTIUS ISTVÁN *Med. Dr. Uj es uj Diacetica 5. Dar. 2. Rész. p. 81.* — *Siebenbürgische Quartalschrift. 1793. 3. Jahrg. 3. Hft. p. 179—193.* — S. BÉLTKI *conspectus system. pract. aquar. min. magni Princ. Transylvaniae indigenatum. Vindobonae 1818. p. 65. 70 et 85.* — S. PATÁKI *descriptio phys. chem. aquar. mineral. M. P. Transylvaniae jussu Exc. R. Gubernii. Pest. 1820. p. 16.* — *Die Heilquelle von Borszek, nach eigenen Erfahrungen in Kürze beschrieben von einem prakt. Arzte. Wien 1825).*

46) J. C. GEBHARD *über die Gas- u. Schlamm-bäder bey den Schwefelquellen zu Eilsen u. deren ausgezeichneten Nutzen in Lungenschwindsuchten, Lähmungen, veralteten Hautkrankheiten u. mehreren chronischen Uebeln. Berlin u. Stettin 1811. 2. B. Ibid. 1812.* — G. D. KIESER's *Entwurf einer Geschichte u. Beschreib. der Badeanstalt zu Nordheim, nebst einigen Bemerk. über Schlamm-bäder. Götting. 1811.* — „Auch hierinne zeichnen sich Franzenbrunn u. Marienbad vor vielen andern aus. Der Reichthum an Gasausströmungen aus

que *balnea ex gaz*⁴⁷⁾, indicata sunt. Absente impetu inflammatorio, et alterius generis irritationem systemati cutaneo inferre juvat. Huic fini inservient: *vestes lanae, tela cerata* cuti nudae impositae, — *frictio superficiei corporis*, — *embrocatio partis*, in qua impetigo desideratur, — *illinitio ope tincturae meloës cantharidum et camphora*⁴⁸⁾, — *caesio cutis ope urticarum*⁴⁹⁾ ipsaque *psorae insitio*. Ad *interna remedia* quod spectat, ea potissimum morbo accommodari debent, quo viscus a caussa impetiginosa labefactatum laborat.

Prae-

dem Boden dieser Orte ist so gross, dass durch zweckmässig getroffene Vorkehrungen in diesen nicht nur Bäder im Mineralwasser, sondern auch Gas-, Moor- oder Schlammäder in häufigen Gebrauch gezogen werden.“ (J. U. G. SCHÄFFER jun. l. c. p. 56).

47) „Was die Gasbäder anlangt: so haben auch diese ihre grossen Vortheile, und haben zuweilen grosse Heilungen sehr schnell, gleichsam an Wunder gränzende Wirkungen hervorgebracht. Da Marienbad so ungemein reich an kohlen-saurem Gas ist, indem es an sehr vielen Stellen in ungemein grosser Menge aus der Erde strömt, so gibt dieser Badeort die schönste Gelegenheit, die Wirksamkeit der Gasbäder als Heilmittel ferner zu prüfen und ihre Wirksamkeit genauer zu bestimmen, als bisher geschehen ist. (KREYSIG l. c. p. 225).“

48) HIRSCHEL Briefe über verschiedene Gegenstände aus dem Reiche der Arzneykunde. 3. Th.

49) CELSUS de medicina. L. III. c. 27. — ARÆTAEUS curat. acut. morbor. L. I. c. 2. — SPIRITUS Urtication in fieberhaften Krankheiten. (RUST's Magazin der gesammten Heilkunde. 20. B. 3. Heft. p. 424).

Praeterea saepissime *diapnoieis* locus est, inter quae *antimonium*⁴⁹⁾ iterum commendandum est.

CAPUT VII.

D e p e t i c u l i s .

§. XXXIX.

Definitio. Historia.

1. *Peticulae*¹⁾ sunt stigmata vel maculae, subrotundae, discretae, magnitudinis circiter lentium, coloris modo fuscii vel coccinei, modo lividi vel atrii, ut plurimum planae, aliquando prominentes, universam cutim, raro tamen faciem, saepissime jugulum, pectus et antibrachium obsidentes, digiti pressioni renitentes, diversis in morbis acutis conspiciendae.

2. Disceptatur, utrum medici antiquitatis *Historia*.
peticulas noverint, an ipsae primum seculo decimo

49) WERLHOFF exhibebat: R. Pulveris antimonii crudi unciam unam. Sacchari uncias tres. M. D. S. Bis de die cochlesre coffeanum. (Opp. med. T. III. p. 756).

1) *Synon.* Pestichie (a peste?); petechiae (vox barbarae); puncticulae; lenticulae; purpura (ubi rubent). — GERM. *Petechien, Petetschen, Pestflocken, Blutflecken.* GALL. *Petéchies, Péticules.* ITAL. *Petecchie.* ROSS. Пятна. POL. *Petocie.*

cimo quarto, aut saltem decimo sexto descriptae fuerint. Verba HIPPOCRATIS, quae juxta SPONIUM²⁾, LINDIUM³⁾ aliosque, ad peticulas spectant⁴⁾, vel obiter perlegere sufficiet, ut TRILLERO, illa ad miliaria revocanti⁵⁾, assentiat. Potius locus in GALENI libro⁶⁾ peticulis quadrat. Item alter ex HERODOTO apud AETIUM⁷⁾, de quo

argu-

2) Aphorism. novi. p. 136.

3) *Samml. auserles. Abhandl. für prakt. Aerzte.* 2. B. 4. St. p. 15.

4) Epid. I. Sect. III. aeger 2. edit. LIND p. 674. („Exanthemata cum sudore rubra, rotunda, parva, veluti vari, permanebant, non abscedebant.“) Lib. II. Sect. III. (Fiebant autem in febribus aestivis circa septimam, octavam et nonam diem aspredines in cute miliaceae, culicum (non pulicum) morsibus similes, non valde pruriginosae. Hae perseverabant usque ad indicationem). Et Epid. V. §. 33. p. 793. („Cutis sub pilis inter puncta velut culicum morsus“).

5) Exercitatio pathologico-philologica de febre miliari, potissimum feminarum, praeis medicis Graecis haud incognita, ad quaedam Hippocratis loca illustranda. Opuscul. med. Vol. II. p. 326. Edit. KRANSII, Francf. 1766.

6) Method. medendi. Lib. II. cap. 12. Edit. CHART. T. X. p. 124. („Qui evasuri erant, iis exanthemata nigra per totum corpus confertim apparuerunt, plurimis quidem ulcerosa, omnibus autem sicca“).

7) Teirab. II. Scrm. I. c. 129. p. 234.^o Coll. STEPHAN. et edit. GRAEC. ALDIN. Lib. V. p. 96. b. („In febriculis assidue fiunt pustulae circa labia et nasum, juxta febrium solutionem: verum in principiis febrium non simpliciorum, sed a pravis humoribus ortarum

argumento LANG⁸⁾, WELSCH⁹⁾, GRUNER¹⁰⁾ et C. SPRENGEL¹¹⁾, docte disseruerunt. Praeterea hoc ultimo opinante¹²⁾, peticulae seculo decimo quarto, sub nomine *punctilli magni*, a GADDESDEN clare descriptae sunt. RIOLANUS¹³⁾, JACOBUM DESPARS (alias DE PARTIBUS)¹⁴⁾, medicum Parisiensem, seculo decimo quinto demortuum, etiam peticulas descripsisse contendit. Jam omnium medicorum, praecuntibus potissimum HIERONYMO FRACASTORI¹⁵⁾; OCTAVIANO ROBORETO¹⁶⁾ et PETRO A CASTRO¹⁷⁾, attentionem sibi promeruerunt peticulae, quae febres seculo decimo sexto Italianam

circa totum corpus exoriuntur vibices culicum morsibus similes: in malignis autem et pestilentibus febribus exulcerantur, et quaedam ad carbunculorum speciem aecedunt¹⁸⁾.

8) Epistol. medie. XV. Lib. II. p. 561.

9) Curat. propr. dec. VI. eur. I. p. 287. August. Vind. 1698.

10) Morborum antiquitates p. 110.

11) Versuch einer pragmat. Geschichte d. Heilkunde. 3. B. p. 118.

12) SPRENGEL op. c. 2. B. p. 509.

13) Recherches sur les écoles de médecine. p. 217.

14) Comment. in Avicennam prima. Tract. 4. cap. 2.

15) De morbis contagiosis. Lib. II. cap. 6.

16) De peticulari febre Tridenti a. 1594. vagante. Trident. 1592.

17) Febris maligna puncticularis aphorismis delineata. Verona 1650.

Frank Prax. I. 1. 2.

liam depopulantes, concomitatae sunt; quarumque febrium, una cum literatura, in tractatu de typho rationem reddemus. Interea inquisitionem in peticularum formas et qualitates praemittere juvabit, de quo argumento legi potissimum merentur HASENÖHRL¹⁸⁾ (alias LAGUSIUS), BURSE-RIUS¹⁹⁾, BALDINGER²⁰⁾, J. J. REUSS²¹⁾, G. L. H. K. WEDENEIER²²⁾, J. W. H. CONRADT²³⁾, G. PALLONI²⁴⁾ et A. OMODEI²⁵⁾.

§. XL.

Symptomata. Necroscopia.

S. prodrom-
na.

1. Nunquam observare potuimus peticulas *symptoma* aliquod *prodromum* iis gentilitium praecessisse. Altera ex parte legimus apud RAMAZZINI¹⁾, in epidemia quadam Mutinensi peticulas annuntiatas fuisse a lassitudine lumborum et dorsi cum ardore faucium, genisque rubris; atque

18) Historia medica morbi epidemici, sive febris petechialis, quae a. 1757—59. Viennae grassata est. Viadob. 1760.

19) Instit. med. pract. T. II. cap. X.

20) Neues Archiv. 3. B. 4. St. p. 358.

21) Wesen der Exantheme. Aschaffenburg 1814. Erster Theil. Das Fleckfieber oder die Kriegspest.

22) De febre petechiali diss. inaug. Gott. 1812.

23) Animadversiones de febre petechiali. Heidelb. 1818.

24) Commentario sul morbo petecchiato. Livorno 1819.

25) Del governo politico-medico del morbo petecchiato. Milano 1822.

1) l. c. §. 17.

atque apud HASENÖHRL²⁾, in epidemia Viennensi, anxietatem circa praecordia, levem nauseam et vomituritionem iis praegressas esse: ast haec sunt symptomata prodroma multorum morborum acutorum, etiamsi in illis peticulae nunquam manifestentur; unde quonam jure prorupturis peticulis hic tributa fuerint, non intelligimus.

2. Quocunque demum in morbo peticulae<sup>§. eruptio-
nis.</sup> compareant, *eruptio* contingit aliquando ante ipsam febrilium symptomatum evolutionem; hinc inde prima, secunda, tertia, plerumque quarta morbi die, non raro tardius, septima scilicet, interdum vel decima quarta. Prorumpunt peticulae momento temporis, primum ad jugulum, ad pectus, ad internam brachiorum superficiem; dein ad dorsum, ad crura, ac tandem ad reliquas corporis partes, excepta plerumque facie. Interea vel in facie peticulas, praesertim in infantibus et feminis, inprimis ad palpebras, ad genas et circa mentum pluries vidimus, videruntque STRACK³⁾, CALLISEN⁴⁾, J. P. FRANK⁵⁾ multique alii. Quandoque peticulae ordine inverso crumpunt⁶⁾, aut eruptio ad unam alteramve partem limitata cer-
Y 2 nitur.

2) l. c. p. 265. 3) l. c. p. 18.

4) Acta Soc. Reg. Havn. T. I. p. 358.

5) Die sexta Maji 1794. igitur post publicationem tertii voluminis epitomes, ubi se nunquam peticulas faciei vidisse, affirmat auctor.

6) SAGARIUS syst. morbor. sympt. cl. X. ord. I. gen. 4. spec. 4.

nitur. Peticulae labia, orisque cavum, nec non fauces cooperiisse, feruntur quidem, ast omnibus rite perpensis, maculas, de quibus loquitur ingenius caeterum vir⁷⁾, non fuisse veras peticulas, sed ecchymomata, apparet. Peracta peticularum eruptione morbus pro re nata nunc suam pergit viam, nunc exasperatur, nunc lenitur.

Efflorescentia.

3. *Copia* peticularum admodum varia; saepissime innumerabiles sunt. Nihilominus cae vix unquam confluent⁸⁾ et constanter *figuram* satis regularem, subrotundam exhibent, etsi ad basin interdum parumper, veluti gutta atramenti, chartae emporeticae inspersa, diffluant. Aliquando *figuram* stellae induunt⁹⁾. Maculae, quae evidentè et ita difflunt, ut *figuram* regularem amittant, aut maculae magnitudinem lentium multum excedentes ad ecchymomata pertinent; verae enim peticulae solummodo punctula minuta, sive maculas, illis ex morsu pulicum similes, referunt, et

7) HERDER in HUFELAND's *Journal der pr. Heilkunde*. 9. B. p. 173.

8) Confluere licet raro peticulae monet S. G. VOGEL l. c. p. 289. („Zuweilen laufen doch zwey, drey und mehrere Flecken zusammen und machen breite Petechien. Dies geschieht am gewöhnlichsten auf dem Leibe, auf den Schulterblättern“).

9) BROCKLESBY *economical and medical observations*. Lond. 1764. p. 199. — BRÜCKMANN *prakt. Bemerkungen über die Wechselfieber* in HORN's *Archiv*. 1812. Jan. Febr. p. 134.

et vix unquam lentes magnitudine superant. Rarissime pruritu stipantur, vel epidermidem elevant, quo solo in casu, tactu percipi queunt. Contraea, saepe saepius peticulae ita sub cute se-pultae jacent, ut difficulter et nonnisi per obli-quam inspectionem cerni possint. *Color* earum utplurimum puniceus, fuscus est, interdum vero violaceus, lividus, ater, vel etiam purpureus, coccineus. Purpureus color praesertim peticulis super epidermidem prominentibus ac prurientibus proprius est, unde earum similitudo cum *morbil-lis*, quam, praeter ROBORETUM¹⁰⁾ atque STOL-LIUM¹¹⁾, et nos vidimus. Interdum in uno eo-demque aegrotante peticulae varii observantur coloris; attamen, cutim inde marmoris instar va-riegatam fuisse, in ecchymomate quidem, nequa-quam vero in peticulis observavimus. — *Efflo-ratio* peticularum per tempus paene indetermina-tum protrahitur. Nonnunquam primo nychthe-mero jam evanescunt, alias per totum morbi cur-riculum vigent, aut ad convalescentiam usque per-stant¹²⁾. Fugatae peticulae hinc inde redeunt iterumque redeunt, quin ob id morbi mutatio necessario contingat. Sunt tamen, qui sub re-gressu peticularum augmentum mali viderunt.

4. PETRUS A CASTRO de *desquamatione* post Desqua-
peti-^{matio.}

10) l. c. cap. XI. 11) l. c. p. 120.

12) Acta mea clinica, Vol. I. cap. 3. p. 51.

peticulas loquitur¹³⁾. Eam revera nuper post peticulas, morbillis similes, conspeximus. Hisce autem peticulis exceptis, nullam unquam post exanthema de quo agitur, observavimus desquamationem. In ea hinc versamur opinione, contrarium contendentes, a secessu epidermidis, convalescentiae post febres nonnullus in genere proprio, quatenus illam peticulis adscripserint, in errorem ductos fuisse.

Neuroscopia.

5. Vidimus quidem peticulas in cadaveribus superstites, nunquam vero, ut FORESTUS testatur¹⁴⁾, easdem post mortem primum comparentes. Probabili argumento hujusmodi peticulae nihil nisi ecchymomata, haud raro sub ipso mortis articulo prorumpentia, fuerunt. Affirmat DIEMERBROECK, peticulas apicem in cute habuisse, cum basi vero profunde, ita ut fere conum efficerent, ad ossa penetrasse¹⁵⁾. STOLLIUS vero hunc auctorem cum peticulis ecchymomata confudisse objicit¹⁶⁾, nequaquam vero negat, *peticulas* dari *internas* quas necroscopiâ ad pleuram, pericardium, cor ipsum, diaphragma, meninges demonstravit, quarumque existentiam et SCHLICHTHORST comprobavit¹⁷⁾. Hujusmodi autem peticulae internae nullam cum externis communicationem

13) l. c. sect. 4. §. 38.

14) Obs. et curst. medicæ. T. I. Lib. VI. obs. 37.

15) De peste. Lib. IV. hist. 32.

16) Rat. med. P. I. sect. cadav. 8.

17) Diss. de petechiis. Goett. 1783 p. 12.

nem alunt. Sedes peticularum in rete, a systemate vasorum capillarium efformatum, communi consensu locatur; idque jure: vidimus saltem injectionem vasorum capillarium cutis, e brachio hominis cum peticulis demortui, captae, ubi materies colorata, quae injectioni inservierat, tot circa illa vasa efformabat puncta, quot prius ibi animadversae erant peticulae¹⁸⁾. Morbos peticulares praeterea saepe inflammationes vel cerebri¹⁹⁾ vel arachnoideae²⁰⁾ socias habere, recentiores testantur.

§. XLI.

C a u s s a e.

1. Peticulae praecipue observari solent in aetate media, in maribus, in regionibus uliginosis et humidis, in locis occlusis, temporeque vernali et aestivo. C. praedisponen-tes.

2. Excitantur peticulae a contagiis pestis, typhi, variolarum, morbillorum, scarlatinae, nec non a causis aliorum morborum acutorum, praecipue primarum viarum impuritatibus. C. excitantes.

3. *Causa proxima* peticulae, communi, ut diximus, consensu, in sanguinis guttam, in rete mucosae.

18) Memorabile hoc praeparatum anatomico-pathologicum mihi illustris physiologiae in universitate Viennensi quondam professor PROCHASKA a. 1817. exhibuit.

19) JEMINA in BRERA *Giornale di medicina pratica*. Vol. 3. 1813.

20) RAUSS l. c.

mucosum effusam locatur. Quae opinio, praeterquam quod anatomiae pathologicae superstructa sit, confirmatur quoque ab analogia peticularum cum morsibus pulicum, cumque maculis scorbuticis; nec non a frequenti haemorrhagiarum cum peticulis connubio. Differunt vero medici quoad explicationem modi, cuius ope effusio cruoris peticulam gignens, contingit. Explicant nimirum hoc phaenomenon alii per solutionem et corruptionem sanguinis e propriis vasis transsudantis; alii per defectum oxygenii nimiamque principii carbonici in humoribus copiam; alii per solidorum laxitatem et atoniam; alii per virium vitalium dejectionem in systemate vasorum capillarium cutis praedominantem; alii per vasorum istiusmodi ruptionem¹⁾; alii per labefactionem medullae spinalis, utpote quae nervis suis potissimum cutis functiones regit²⁾; alii demum per stimulum specificum vasis capillaribus cutis illatum, illaque ad secretionem morbosam impellentem. Forte plurimae istarum explicationum pro re nata admittendae forent. Nulla vero (ultimâ quodammodo exceptâ) rationem reddit, cur peticulae figuram rotundam constanter retineant? cur vix unquam inter se confluant? et cur uno tem-

1) SWIETEN comment. §. 723.

2) ROBERT REID in *Transactions of the association of fellows and licentiates of the king's and queen's colleges of physicians in Ireland*. Vol. III. 1820.

temporis puncto in universo fere corpore mox comparcant, moxque evanescant?

§. XLII.

D i a g n o s i s.

1. Ante omnia peticulae a maculis quibus Distinet. morsus pulicum, ne dicamus de aliis insectis *), ^{pet. a morsib. pulicum.} ansam porrigunt, distinguendae sunt, quam diagnosis partem magni in arte viri ¹⁾ dilucidare non sunt dedignati.

Maculae a morsibus pulicum.

1. Exhibent in medio (saltem dum recentes sunt) punctum a punctura aculei relictum.
2. Sub digiti pressione nisi punctum in medio, saltem rubor totius peripheriae evanescit, ablataque compressione redit.
3. In omnibus cutis par-

Peticulae.

1. Punctum in medio non animadvertitur.
2. Sub compressione non evanescent.
3. Peculiaribus cutis locis

*) Teste A. HUMBOLD (*Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent*) ab ictu insectorum vulgo *Mosquitoes* et *Zancudos* (*Nemoceres LACRETELLII*) ecchymoma sub forma puncti ex nigro brunei relinquitur, excitata febre cum turbis primarum viarum.

1) RONORETUS l. c. cap. XI. p. 174. 175. — PETRUS A CASTRO l. c. Sect. III. §. 31.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| tibus indiscriminatim obveniunt. | cis praecipue addictae sunt. |
| 4. Lintea inde maculantur. | 4. Lintea immunia manent. |
| 5. Frictione ope pastae ex farina lupini albi et aceto evanescere dicuntur ²⁾ . | 5. Frictioni qualicunque resistunt. |

Caeterum peticulas cum maculis a pulicum mor-
sibus productis societatem inire posse per se
patet.

Distinct.
peticul ab
aliis ex-
anth. et
impetig.

2. Porro ut *peticulae* a *miliaribus rubris*, a *morbillis*, a *variolis* sub actu eruptionis, a *lentigine aestiva* et ab *ecchymomate* (cui peticulas sic dictas *chronicas* adscribimus) distinguantur oportet. Quoniam vero ad praecepta, quae huc spectant, intelligenda, una peticularum notio mi-
nime sufficit, sed et illa reliquorum morborum
requiritur, hanc diagnosis partem in sequentibus
capitibus passim trademus.

Peticulae
num ex-
anthem.
prim. an
secundar.

3. Interea magna se exhibet nosologorum
quaestio, utrum scilicet *peticulae exanthema si-
stant symptomaticum seu secundarium*, an *exan-
thema essentiale seu primum*? — Dum peti-
culae seculo decimo sexto a medicis Italiae, nisi
primum, saltem accuratius descriptae sunt; egre-
gii viri ab illis, utpote a symptomate externo eo-
que

2) PETRUS A CASTRO l. c. — Pudet me hoc experi-
mentum nunquam repetisse.

que evidentissimo, ita commoti fuere, ut totum inde repetierint morbum. Seculo autem decimo octavo medici (praeceuntibus BERGIO³⁾, JOUBERTO⁴⁾, MACERIDIO⁵⁾ et CULLENIO⁶⁾), aliter sentire et peticulas pro febrium *symptomate* duntaxat declarare inceperunt; quae opinio ad praesens usque aevum in Anglia⁷⁾, Gallia⁸⁾ et quodammodo in Germania⁹⁾ praevaluit. Secus in Italia¹⁰⁾. — Innititur opinio, peticulas *exanthema symptomaticum* constituere, sequentibus argumentis: 1^o Peticulae symptomatibus *prodromis* carent, saltem talibus, qualia stadium invasionis variorum, morbillorum et scarlatinae exhibere solet; 2^o peticulae *tempore indeterminato* erumpunt; quum exanthematum vix dictorum eruptio plus minus

3) Act. acad. sc. Suec. Vol. XXVIII.

4) *Histoire de la société R. de medec. a. 1776.* p. 529. Paris 1779.

5) *Introduct. meth. in theor. et prax.* T. II. cap. 11.

6) *Gener. morborum.* Ord. II.

7) Inter medicos qui typhum circa a. 1817 in Hybernia et Scotia saevientem descripserunt, nec unus est, qui peticulas super reliqua symptomata extolleret.

8) In scholis PINELIS et BROUSSAIS peticularum ut *symptomatis* febrium quaestio fit.

9) Exceptis scholis Goettingensi et Heidelbergensi, reliquae Germaniae, quod sciam, peticulas neutiquam pro morbo sui generis habent.

10) A. PALLONI, A. OMODEI fereque omnes, qui de typho a. 1817. Italiam depopulante rationem reddiderunt, in peticulis morbi essentiam quaesivere.

minus *certis* diebus alligata sit; 3^o peticularum efflorescentiâ peractâ, in reliquis symptomatibus nulla fit mutatio, enim vero nec remittunt, uti post eruptionem variolarum benignarum, nec invalescunt, uti post illam morbillorum et scarlatinae accidere solet; et 4^o peticulae saepe post eruptionem mox iterum evanescent, quin ideo visceribus insidias struant, uti in variolis, morbillis et scarlatinâ, dum cuti praepostere valedicunt, contingit.

Continua-
tio argu-
menti.

4. Argumenta haec nonnisi certos inter limites valere BURSERIUS¹¹⁾, J. P. FRANK¹²⁾ contendunt. Ad epidemias provocant, ubi peticulae utique symptomata prodroma habebant, ubi illarum eruptionem utique levamen febris sequebatur, verbo, ubi peticulae, nisi in omnibus, saltem multiplici sub respectu sese instar variolarum, morbillorum et scarlatinae gerebant. Placuit itaque egregiis viris mediam inire viam atque *peticulas* admittere tum *symptomaticas*, tum *primarias*.

Continua-
tio argu-
menti.

5. Divisio haec peticularum orthodoxis nosologis nostri aevi minime arridet. Quis unquam, ajunt, variolas, morbillos et scarlatinam modo ut symptoma, modo ut malum primarium vidit? Et, si istiusmodi exanthemata semper ut primaria et nunquam ut secundaria obveniunt, cur aliter respectu ad peticulas contingeret? Malunt
ita-

11) l. c. §. 309.

12) Epit. de cur. hom. morbis. T. III. §. 314.

itaque eas duntaxat peticulas, quae inter reliqua symptomata eminent, ut genuinas, exanthematibus primariis adscribere, reliquas autem, quae vulgo symptomata dici solent, pro peticulis spuriiis, sive *maculis peticularibus* (*peticuloide?*) declarare, itaque e peticularum numero plane eliminare et ad ecchymomata remittere; quod nobis rationi maxime consonum videtur. Restaret solum, ut docti illi viri simul criterium, cujus ope peticulae genuinae a spuriiis ad *lectum aegrorum* distingui possint, in medium afferrent. Tale quidem criterium in *contagio* locatum esse contendunt, utpote quod unis peticulis genuinis proprium sit. At in praxi exercenda natura morbi aut contagiosa aut non contagiosa non semper ita in propatulo est, ut illico diagnosis illi superstrui possit. Requiritur hinc criterium obvium, a forma exanthematis desumptum, — quod hucusque non habetur. Sunt enim peticulae genuinae interdum peticulis spuriiis adeo similes, ut gutta aquae alteri. Contrarium contendentes sane a figura, quam peticulae in una alterave epidemia solito constantius obtulerunt, in errorem ducti sunt¹³⁾. Alii criterium genuinas peticulas a spuriiis

- 13) Quis, observatis multis febrium peticularium epidemiis, subscriberet verbis cl. PALLONI? „*Infatti le macchie petecchiali sono esattamente circoscritte e rotonde, come minutissimi punti, o morsicature di polci, e l'esantema petecchiale è d'ordinario più grande, più irregolare nella sua forma, e più rassomigliante ai*

riis distinguendi *in peculiari morbi curriculo* invenire putant. Ast boni viri inde in circulum vitiosum incidunt; ad demonstrandum enim adhibent, quod prius jam demonstrandum fuisset. Quibus omnibus rite perpensis ut tandem viam e labyrintho inveniamus, sequens exhibemus filum Ariadnaeum.

Finis ar-
gumenti.

6. Proposito nostro innixi, in morborum definitionibus stabiliendis duntaxat characteribus illorum obviis standi; *peticularum* nomine indiscriminatim omnes salutamus maculas, quae cum notis in peticularum definitione traditis¹⁴⁾, obveniunt. Dein convenimus libenter, inter peticulas ita definitas magnum exstare discrimen, quod nisi probe stabiliretur, omnis peticularum doctrina vana foret. Quoad modum autem differentias

inter

morbilli, o se prende talvolta la forma punticolare, questi punti sono circondati da un' areola rossastra. Le prime sono di un rosso smorto, e più spesso lividastre, perchè nascenti da ecchimosi, e non da infiammazione; e l'esantema petecchiale è di un rosso vivo infiammato, di rado livido e nerastro nella sua degenerazione. Le prime sono appianate e levigate l'altro, tanto allorchè è maculoso, quanto allorchè è punticolare, è scabro al tatto, rilevato e diviso in solchi formati da elevamento di epidermide. Qualche volta accade, di vederlo più appianato, e comparisce a pena sotto l'epidermide; e sono questi i casi nei quali, senza un' attenzione a tutto il resto, confonder si potrebbe con le macchie pulicolarie." (l. c. p. 8).

14) §. XXXIX. No. 1.

inter peticulas et peticulas eruendi, ab antecessoribus in eo differimus, quod quaestionem de peticulis symptomaticis et primariis plane evitamus. Hujus enim generis divisiones scholasticas eoque duntaxat admittendas esse censemus, quousque doctrinae claritatem promovent, neutiquam vero in casu contario. Morbos probe nosse, quibus peticulae familiares sunt; peticularum proprietates istis in morbis exacte eruere, et una duce experientia medendi rationes rerum positionibus accommodatas stabilire; en scopum nostrum! Ad quem consequendum mox de peticulis in febribus intermittentibus et continuis, utpote morbis, quorum doctrina jam praemissa est, agemus; ad tractatum autem de peste et de typho doctrinam peticularum istis in morbis familiarium, remittimus, et sic in posterum respectu variolarum, morbillorum, scarlatinae etc.

7. Monuimus ¹⁵⁾ non solum sub stadio frigoris febrium intermittantium interdum maculas cum peticulis similitudinem alentes in conspectum venire, sed etiam exstare febres intermittentes, quarum potissimum symptomata *peticulae* sistunt. Febres hujusmodi propter periculum quo stipari solent, *perniciosae petechizantes* audiunt. Descriptae sunt a BARTHOLINO ¹⁶⁾, Mo-

Peticulae
in febri-
bus inter-
mittent.

RAN-

15) P. I. Vol. I. Sect. I. Cap. II.

16) Tertianae epidemicae petechialis a. 1652. in Dania ob-

RANDO¹⁷⁾, WERLHOFIO¹⁸⁾, BURSERIO¹⁹⁾, NOTARJANNIO²⁰⁾, aliisque inter Italos nostri aevi²¹⁾. Illarum plurimas ipsi quondam in Insubria conspeximus. Praeviis binis paroxysmis, qui primum frigore pertinaci, dolore tensivo dorsi, lipothymiis, dein calore cum praecordiorum anxietate, pulsu parvo depresso stipantur, tertia accessione, rarius tardiori, ingruente *peticulae*, vel rubicundae, vel livescens, circa collum, pectus, humeros copiosae superveniunt. Succedente apyrexia, *peticulae*, ut observavimus, una cum reliquis symptomatibus pro tempore evanescent; juxta aliorum observationes²²⁾, solae remanent, donec novus paroxysmus cuncta priora mala revocet; sicque ad brevi expectandam mortem aut sanationem usque. Febris ista perniciose petechizans potissimum in locis uliginosis, tempore autumnali, et in hominibus ad scorbutum proclivibus²³⁾ observari solet. Magna est illius cum febre inter-

servata. Vid. THEOPH. BONATI Polyanthes. T. I. p. 252. Genév. 1691. fol.

17) De quibusdam tertianis perniciosis commentatio.

18) Observationes in febr. praecipue intermitt. Sect. III.

19) Institut. med. pract. T. I. §. 177.

20) *Sulle febbri di mutazioni.* Napoli 1788. §. 12. 17. 20. 44.

21) Cfr. OMODEI op. c. T. I. p. 118. — PUCCINOTTI storia delle febbri intermittenti perniciose di Roma. p. 306 sq.

22) BURSERII l. c.

23) WERLHOF l. c. — PUCCINOTTI l. c.

intermittente scorbutica affinitas, imo suspicatur BURSERIUS ²⁴⁾ febrem tertianam scorbuticam a WEDELIO visam, ad petechizantem revocandam esse. Quodsi perpendamus symptomata scorbuti saepe cum lienis affectionibus nexum habere, non mirabimur, illa in febribus intermittentibus, utpote saepe lienis affectione stipatis, obvenire. Verosimile praeterea est, peticulas in febribus intermittentibus, quammaxime ad conditionem ecchymomatum scorbuticorum accedere, et ab iisduntaxat propter curriculum acutum differre. De febribus intermittentibus petechizantibus loqui non desinamus, quin moneamus, eas facile cum typho confundi posse. Quod accidit, dum aegri febribus intermittentibus correpti ad nosocomia, ubi typhus regnat, deportantur. Irruente nimis in eos contagio typhode, saepe peticulae in conspectum veniunt, quae, antequam accessionis novi morbi habeatur notitia, facile a febre intermittente repetuntur. In tractatu de typho fusius docebimus, posse etiam remissiones conspicuas, quibus typhus peticularis interdum primis morbi diebus stipatur, incautis pro febre intermittente petechizante imponere.

8. Si proclivitatem febrium inflammatoriarum ^{Peticulae in febrib. inflammatoriis.} ad haemorrhagias perpendamus, illas non frequentius peticulis stipari, miramur. Sub valido nempe cruoris, vigentibus febribus inflammatoriis, im-

petu,

24) l. c. §. 178.

Frank Prax. I. 1. 2.

petu, imprimis si calidum regimen et usus cardiacorum stimulantium superaccedat, sicque ut SWIETENII verbis²⁵⁾ utamur, ignes addantur ignibus, nil aliud expectandum praeterquam quod sanguis vasorum cutis capillarium vim superet, ac in vicinum recte Malpighii effundatur.

Peticulae
in febrib.
rheumati-
cis.

9. Et quid miri, si causa *februm rheumaticarum* alioquin systemati dermoideo aequae ac arteriis et venis infensa, in vasis cutis capillaribus secretionem morbosam cruoris, aut saltem seri illius eliceret, indeque superficiem externam corporis peticulis macularet?

Peticulae
in febrib.
gastricis.

10. Ex nexu viscerum abdominalium cum cute facillime origo *peticularum in febribus gastricis* praesertim biliosis intelligitur²⁶⁾. Imo fateamur oportet, nos nullibi peticulas formosiores, quam istis in febribus vidisse; videlicet purpureas, super cutim, morbillorum vel variolarum erumpentium instar elevatas lacteque florentes. Facile hinc intelligitur, cur tirones in arte medica, dum

25) l. c.

26) SCHULZE diss. de ventriculi et intestinorum in omni genere morborum habenda ratione. Halae 1735. — S. G. VOGEL l. c. p. 291. („Die Petechien sind sehr oft eine Wirkung fauler Unreinigkeiten in den ersten Wegen; daher sie in faulen Gallenfiebern eine gemeine Erscheinung sind, wenn es damit bis auf einen gewissen Grad gekommen ist, die nöthigen Ausleerungen versäumt, und zur Unzeit hitzige, schweisstreibende Mittel gebraucht worden sind, auch wenn man zur Unzeit zur Ader gelassen hat“).

dum hujus generis peticulas prima vice vident, eas vel pro morbillis, vel pro variolis vel pro typho, proclamant. Hisce erroribus quomodo occurrendum sit, debitis tradetur locis. Praeter peticulas prominentes et purpureas, febres gastricae praesertim eae, quae in nervosas tendunt, alias adhuc agnoscunt planas et lividas.

11. Peticulae quae in febribus *nervosis*, ex Peticulae in febrib. nervosis. inflammatoriis, rheumaticis et catarrhalibus evolutis, oriuntur, item illae quae, febres nervosas primarias concomitantur, ut plurimum stigmata potius quam maculas constituunt. Adparent potissimum juxta curriculum vasorum majorum, solitariae, coloris longe saepius luridi quam floridi.

§. XLIII.

P r o g n o s i s.

1. Quum exanthema, a nobis nomine uni- Generatim. versali peticularum comprehensum, maculas variae admodum indolis amplectatur; *prognosis* illud *generalem* haud admittit. Id solum valet, peticulas, quocunque in morbo comparuerint, flocci pendendas non esse. Quae inter illas rubrae vel fuscae sunt, minus periculosae quam lividae et atrae esse solent; at non sine exceptione. Periculo etenim magno peticulae etiamsi rubrae stipatae erant apud Ludwicum²⁷⁾. In genere probe notandum ex solo peticularum *colore*

Z 2 incer.

27) Adversaria medicinae practicae. Vol. I. P. I. p. 35.

incertissimum proferri iudicium. Mutatur enim iste color vel unius horulae spatio per cubiculi auctam vel imminutam temperaturam, per animi pathema, per potum meracum; aliasque causas adhuc ignotas.

P. peticular. febr. intermitt. petechizantis. 2. Prognosis *febris intermittens petechizantis* ex ipsa illius descriptione elucet. Caeterum huic morbo epitheton *perniciosi* non omni in casu convenire putamus. Convenit nimirum, dum et reliqua symptomata periculum vitae denotant, dumque peticulae paroxysmis alligatae sunt. Contra peticulas quae in solitis febribus intermittentibus prorumpunt, quae per apyrexiam protrahuntur, quaeque potius effectum complicationis fortuitae cum scorbuto, quam morbi acuti ipsius sistunt, sine praecipiti saltem discrimine extitisse, vidimus.

P. peticul. in febr. inflamm. et rheumaticis. 3. In febribus *inflammatoriis* et *rheumaticis* peticulae tantum non portenderent periculum, imo, si cum magno levamine erumpunt, ut reliquae haemorrhagiae pro *criticis* haberi possent; verum dum sanguis illis in febribus jam sua vasa in cute derelinquere incipit, quis, simile quid etiam in partibus internis, puta circa pulpam cerebri, medullae spinalis etc. non contingere spondet? Ac re quidem vera apparitio peticularum in febribus inflammatoriis et rheumaticis ut plurimum transitus illarum in morbos longe peiores (e. c. in febres nervosas) indicium est.

4. Pe-

4. Peticulae rubrae et prominentes, in *fe-* P. peticul.
in febril.
gastr.
bribus gastrico-biliosis erumpentes, circa septi-
mam diem, aut sponte, aut superveniente levi
diarrhoea foeculenta, evanescere solent. Quando-
que desquamationis, ut monuimus, vestigia inde
relinquuntur.

5. In *febribus nervosis* peticulae maxime ti- P. peticul.
in febril.
nervosis.
mendae sunt, dum in morbo adhuc recenti com-
parent; dum vix evolutae cum aliorum sympto-
matum augmento, jam iterum evanescunt; dum
eruptio ad unum duntaxat cutis locum limitatur;
dum sub cute latent et disfluunt, dum minimae
et copiosae sunt, dumque colore nigro et viola-
ceo instruuntur.

§. XLIV.

C u r a.

1. Peticularum praesentia nil in morborum Genera-
tim.
cura immutat; eadem enim indicationes, quae
et alias sub simili rerum positione locum obti-
nuissent, valent.

2. Exemplo esto *febris intermittens petechi-* C. febr.
intermitt.
petechi-
zant.
zans; in qua *cortex cinchonae* solitam vim exe-
rit, dummodo complicationes, si opus fuerit,
antea remotae fuerint. Hoc sub respectu maxime
ad primarum viarum puritatem respiciendum.
Quodsi morbus in longum protraheretur, etiam
diathescos scorbuticae ratio habenda esset. Praeter
aëris puritatem et siccitatem, victum facilis di-
gestionis, succos vegetabilium subacidos, atque
vinum,

vinum, nobis connubium *cinchonae* aut cum radice *acori calami*²⁸⁾ aut cum *elixirio vitrioli Mynsichti*²⁹⁾ inprimis profuit.

C. peticul. in febr. inflamm. et rheumaticis. 3. *Febris inflammatoria*, etiamsi peticulis insignita, *phlebotomiam* exposcit, si alioquin indicata sit. Loquimur tamen potius de indicationibus, quae ex phlogosi viscerum, quam de iis, quae ex una febris vehementia pullulant. Hae enim, praesentibus peticulis, dubiosae sunt. Aurea hic tradidit praecepta BURSERIUS noster³⁰⁾. Phlebotomiâ non aperte indicatâ, saltem ad *cucurbitulas cruentas* confugiendum³¹⁾. Porro ne quis putet, eruptionem cutaneam regimen refrigerans

28) R. Pulveris cinchonae drachmas sex — radicis calami aromatici drachmas duas. M. Divid. in octo partes aequales. Cap. ter de die dosis. Quodsi *sulphas chininae* exhiberi placuerit, id fiat sub forma pulveris, superbibendo infusum calami aromatici.

29) Ad libram decocti cinchonae scrupulum unum elixirii, addito syrupo cinchonae. — Aut quod magis aridet, alternatim nunc decoctum ad uncias duas, nunc elixirium ad guttas sex vel octo, cum aquae cochleasi.

30) l. c. §. 355. („Inprimis ad faucium inflammationem respicere oportet. Si haec magna, venae sectio sine periculo omitti non potest“).

31) BURSERIUS l. c. §. 356. („Ubi vero non satis perspicua videatur phlebotomiae indicatio, et tamen symptoma aliquod capiti aut pectori infestum postulet, ut ei succurratur, tutissime sanguis per *cucurbitulas scarificatas* detrahatur“).

gerans respirare³²). Ast ne quid nimis! praesertim in provectioni morbo, adpropinquante criscos tempore.

4. Transpirationis negotio inprimis studendum est in *peticulis febrium rheumaticarum et catarrhalium* comitibus. C. peticul.
in febr.
rheum. et
catarrh.

5. Sub *gastrica febris, peticulis stipatae, natura*, consuetae indicationes et contraindicationes vigent³³). Contraindicantur potissimum nimiae et praeposterae alvi evacuationes, quippe quae curriculum morbi perturbare illiusque vim ad tubum intestinale determinare solent. Ad felicissimum exitum obtinendum, nobis semper satisfecit aut *serum lactis tamarindinatum* aut parvae *tartari emetici* doses. C. petic.
in febr.
gastricis.

6. Febre gastrica in nervosam transeunte, item in febre *nervosa* primaria, peticulae, nec consuetis indicationibus (lotione aegrotorum frigida non excepta) obstant, nec novis ansam porrigunt. Laus frictionibus cutis, ope unguenti mercurialis adversus peticulas impertita, debillimo hypothesis tum antiquiorum³⁴), tum recentiorum³⁵) fundamento innititur. Idem de illi-
tione

32) REUSS (l. c. §. 169.) pulchre de hoc objecto locutus est.

33) Legatur REUSS l. c. §. 180—198.

34) AMBR. PARÉ l. c. lib. XII.

35) GIANNINI della cura delle febbri. Milano 1805. p. 369. — ERERA in memoria della società Ital. delle scienze. T. XVIII. Fasc. 2.

tione cutis ope *acidi nitrici* vel *muriatici oxygenati* axungiae immixti, scopo corpus oxygenio locupletandi³⁶⁾ valet. Caeterum et *simplicem cutis frictionem*³⁷⁾ et *acida mineralia* in febribus, peticulis stipatis, cum fructu adhiberi posse, non negamus.

Monitum. 7. Complementum doctrinae peticularum (hic summatim tantum traditae) in tractatu de *typho* invenietur.

CAPUT

36) FALLONI l. c. p. 167.

37) Illuatri medicus quondam Russiarum Imperatricis Annae J. B. FISCHER in pretiosissimo opusculo de febre miliari Rigae a. 1767 edito p. 77. sic scribit: „Momentum, in omnibus fere exanthematicis observandum, mihiq̃ue inprimis in febribus petechialibus solenne, quod petechiarum excretionis non primaria habeatur ratio, sed sustentatio toni systematis nervosi, per analeptica antipyretica, et *frictiones*. Frictione haerens in extremitatibus vasculorum sanguis morbidus, partim attenuatus sub seri forma per cutim transit, partim ad massam redit absque periculo. Nam, si vires vitae per nervos frictione modesta roboratos, et per reliqua interna subsidia aulevantur, extravasatus et correptus in peripheria sanguis per debita organa eliminabitur: deficientibus autem vitae viribus, stagnans, uti in peripheria, ita in majoribus ramis sanguis, deleterium dabit finem.“

CAPUT VIII.

De miliaribus.

§. XLV.

Definitio. Historia.

1. *Miliaria*¹⁾ sunt papulae, saepeque pu- Definitio.
stulae, figurae seminum milii, in puerperio et
in diversis morbis acutis, praeviis plerumque fe-
bris exacerbatione, repetito horrore insignitâ,
pectoris oppressione, motibus spasmodicis et su-
doribus copiosis ac foetidis, prorumpentes.

2. HIPPOCRATEM miliaria descripsisse, duce Historia.
TRILLERO monuimus²⁾. Absoluta tamen illorum
notio ortum duxit a seculo decimo septimo, quo
accurate de iis, praecedente COYTARO³⁾ locuti sunt:
RIVE-

1) *Synon.* Purpura; purpura alba; purpura miliaris; em-
physis miliarium. *ITAL.* Febre migliare; migliarina;
miarola. *HISP.* Calentura miliar; millos. *GERM.*
Friesel; Hirsen-Fieber. *BELG.* Gierstkoorts; de beete
Koorts; de Brandende. *GALL.* La miliaire. *ANGL.* Mi-
liary fever; rash. *ROSS.* Просовидная сыпь. (*PO-*
LON. Fryzle, prosowa wysypka. *DAN.* Frisler; Hirse-
feber. *SUXC.* Friesel; Hvita frisel).

2) Cap. VII. §. XXXIX. No. 2. (5).

3) Cfr. SCHNURER *Chronik der Seuchen.* 2. Th. p. 133.

RIVERIUS⁴⁾, FORESTUS⁵⁾, HOPPIUS⁶⁾, HENTSCHEL⁷⁾, MAJOR⁸⁾, FASCH⁹⁾, THIELE¹⁰⁾, WEDEL¹¹⁾, RAYGER¹²⁾, BRUNNER¹³⁾, et praecipue NEUCRANTZ¹⁴⁾ ac WELSCH¹⁵⁾, quorum ultimorum auctorum ille miliaria *Lubecae*, hic *Lipsiae*, in perniciosa puerperarum morbo regnantia, descripserunt. Magis magisque miliarium doctrinam, seculis sequentibus, praeter *memoriarum aetis academicis insertarum*¹⁶⁾ atque *dissertationum inauguralium*¹⁷⁾

4) Prax. med. Lib. XVII. sect. 3. cap. I. obs. 24.

5) De symptomatibus febrium. Lib. VI. obs. 59.

6) Diss. de purpura. Lips. 1652.

7) Diss. de purpura. Wit. 1664.

8) Diss. de purpura. Kilon. 1673.

9) Diss. purpuram puerperarum exponens. Jen. 1674.

10) Diss. de purpura epidemica scorbutica. Witeb. 1685.

11) Diss. de purpura puerperarum. Jenae 1690.

12) De febre maligna cum exanthematibus miliaribus.

In: Miscell. acad. nat. curios. Dec. 1. a. 3. 1692. p. 496. Dec. 3. a. 5 et 6. 1697 et 1698. Append. p. 122.

13) De febre maligna miliar. Ibid. Dec. 3. a. 7 et 8. 1699 et 1700. p. 341.

14) De purpura liber singularis. Lubec. 1648.

15) Historia medica novum istum puerperarum morbum continens, qui ipsis *der Friedel* dicitur. Lipsiae 1655.

16) J. CH. MENTZEL de puerpera, febre maligna miliar. sive purpura alba cum vesiculis pellucidis cum crystallinis laborante. In: Misc. acad. nat. cur. Dec. 3. a. 9 et 10. 1701—1705. p. 320. — F. J. GRÜNWARD nova febris miliaris, sub exitum anni 1733 et initium anni 1734, in celsissimo Alpium Penninarum Bavariae

lium 17) auctores, illustrarunt quoque D. HAMIL-
MIL-

jugo epidemice grassantis historia. In: Act. acad. nat. curios. Vol. VI. Append. p. 37. — J. R. ZWINGER historia purpuræ albae et rubrae, seu febris miliaris apud nos observatae anno 1736. In novis actis Helveticis. Vol. I. p. 108. — BARAILLON *mémoire sur la fièvre miliaire*. In: *Hist. et mém. de la société R. de méd.* a. 1776. p. 193. a. 1777 et 1778. p. 198. — VARNIER *essai sur la fièvre miliaire, qui regne souvent dans plusieurs cantons de la Normandie*. Ibid. a. 1779. p. 281. — ANFAUVRE *dissertation sur la question: Existe-t-il véritablement une fièvre miliaire essentielle et distincte des autres fièvres exanthématiques, et dans quelle constitution doit-elle être rangée?* Ibid. a. 1780 et 1781. p. 47. — SCHAUZ et HASSERT *précis historique et pratique sur la fièvre miliaire, qui a régné épidémiquement dans plusieurs communes du département du Bas-Rhin pendant l'année 1812*. In: SEDILLOT *rec. périod. de la soc. de méd. c. de Paris*. T. 48. p. 71.

- 17) EYSEL diss. de febre purpurata. Erf. 1702. Ejusd. diss. de purpura. Erf. 1715. — AMMON diss. de febre miliari. Altd. 1707. — JACOBI diss. de febre purpurata. Erf. 1709. — ALBERTI diss. de purpura cum febre complicata. Hal. 1710. Ejusd. diss. de dysenteria, cum purpura et petechiis complicata. Hal. 1718. Ejusd. diss. de purpura puerperarum. Hal. 1728. — VESTI diss. de purpura puerperarum. Eiford. 1711. — GNARIUS diss. de aegra, purpura alba miliari laborante. Giess. 1712. — JUCH diss. de febre miliari, vulgo purpura rubra et alba. Erf. 1716. — BERGEN diss. de purpura. Francf. 1716. — BAIER diss. de febre miliari. Altd. 1717. — BOETTICHEN diss. de purpura rubra, vulgo *dem rothen Friesel*. Helmsl. 1718.

MILTON *), CAMERARIUS¹⁸⁾, LINDNER¹⁹⁾, SALZ-
MANN²⁰⁾,

— COSCHWITZ diss. de morbillis cum *purpura alba* et peripneumonia complicatis. Hal. 1722. — DAUTSCHBEIN diss. de febre miliari, quae *der Friesel* dicitur. Hal. 1722. — DE PAK diss. de *purpura puerperarum*. Erf. 1724. — FR. HOFFMANN de purpurae genuinā originē, indole et enatione. Hal. 1725. Ejusd. de febre purpurata maligna. Hal. 1718. Opp. suppl. II. 2. p. 40. Ejusd. de *purpura scorbutica* etc. Hal. 1732. Ibid. p. 466. — LUDOLFF diss. de *purpura puerperarum*. Erf. 1728. — BUXBAUM diss. de febre miliari puerperarum. Erf. 1729. — LASSIUS diss. de *purpura puerperarum*. Erf. 1729. — STAMZ diss. de febre exanthematica cum peripneumonia hoc tempore in Saxonia inferiore epidemice grassante. Erf. 1731. Ejusd. diss. de *purpura epidemica*. Ibid. 1732. Ejusd. diss. de pleuritide vera maligna cum *purpura alba* feliciter curata. Ibid. 1738. — GOELIERE diss. sistens observationes aliquot practicas clinicas circa febrem vesicularem. Frauef. 1732. Ejusd. diss. de *purpura alba confluyente*. Hal. 1740. — BRODHAG diss. de *purpura alba*, morbo apud nos incognito. Basil. 1733. — GERIKE diss. de morbo miliari, alias *purpura* dicto. Respond. D. SAFFT. Helmstad. 1733. — F. SALEMANN diss. exhibens historiam purpurae miliaris albae, cum primis Argentoratum et viciniam infestantis. Argent. 1736. In: HALLERI coll. diss. Pr. V. n. 175. — NEBEL diss. de *purpura miliari rubra chronica*, scorbutica. Heidelb. 1737. — JUNKER diss. de *purpura alba maligna et benigna*, seu chronica. Hal. 1738. — ERNINOER diss. de *purpura miliari, rubra, chronica, scorbutica*. Heidelb. 1740. — SEIF diss. de *purpura*, morbo antiquo. Goett. 1741. — LÜCKEN diss. de pur-

MANN ²³), QUESNOY ²¹), TRUMPH ²²), BAR-
KER ²³),

pura retrograda, per vesicatorii nlcus soluta. GÖTT.
1743. — STOCK diss. scorbutica in purpura, in pur-
puram febrilem malignam ipsis petechiis conjunctam,
conversa, feliciter adhibita curatio. Jen. 1744. —
MENTZLER diss. de venesectionis in purpura abusu
et usu. Argent. 1744. — EMELE diss. de purpura.
Giess. 1744. — PRINARD diss. sur la fièvre miliaire
maligne. Bonon. 1747. — REEN diss. de febribus pur-
puratis, vulgo *Frieselfiebern*. Harderov. 1748. —
GÜNTHER de prophylaxi purpuræ puerperarum. Ar-
gent. 1748. — HAMBERGER diss. de exanthematibus
speciatim de purpura. Jen. 1749. — GMELIN diss. de
febri miliari. Tub. 1752. — HALLER diss. de pur-
pura. Goett. 1752. — BÜCHNER diss. de purpura
puerperarum symptomatica ex uteri inflammatione.
Hal. 1754. Ejusd. de prophylactica purpuræ albae per
balnea curatione. Hal. 1767. — DELIUS diss. de pur-
pura rubra et alba cum diarrhoea ac fluxu hæmor-
rhoidali curata. Erlang. 1756. — ROSEN diss. exhi-
bens symptomata purpuræ chronicæ et scorbuticæ.
Upsal. 1756. — SCHLERETH diss. de efflorescentiis
cutaneis s. exanthematibus in genere, et de purpura
miliari alba ac rubra Buchonise epidemica in specic.
Fulda. 1756. — BÜTTNER diss. de purpura rubra et
alba. Kil. 1760. — MAUCHANT diss. sistens thera-
pism purpuræ, receptiori tutior solidiorque. Tub.
1762. — COLLIN diss. de miliaribus rectaque his me-
dendi ratione. Vind. 1763. — GÜNTHER diss. de pur-
pura miliari. Argent. 1764. — ARAND diss. de pur-
pura puerperarum. Goett. 1765. — BOEHMER diss.
an purpura arte exstirpari queat. Hal. 1766. — BOSE
diss. de morbo miliari. Lips. 1767. — NICOLAÏ diss.

KER ²³⁾, RÜBEL ²⁴⁾, WAGNER ²⁵⁾, BECKERS ²⁶⁾,
FRI-

de purpura. Jen. 1767. — OETINGER diss. an miliaria alba systematis nervosi soboles? Tub. 1768. — PAPIUS diss. sist. historiam febris miliaris. Wurzeb. 1768. — PLANCHON diss. sur la fièvre miliaire. Tournay 1770. — SCHRADER diss. de praeclaro venesectionis usu in quibusdam febribus biliosis putridis et exanthematum speciebus. Rintel. 1770. — ALBRECHT diss. de purpura alba benigna et maligna. Erf. 1772. — REDER diss. sistens epidemiam, ut Mellenstadii se exhibuit. Erf. 1773. — DUPNÉ DE LILLE diss. sur la fièvre miliaire des femmes en couche. Paris 1779. — HARTMANN diss. de purpura puerperarum. Arg. 1779. — WIEL diss. sistens miliaria arthritica. Goett. 1783. — HOLLENHAUGH diss. de purpurae puerperarum prophylaxi etc. Friburg. 1784. — KRAUSZ diss. de exanthemate miliari. Lips. 1789. — GROSSMANN diss. de exanthemate miliari. Lips. 1789. — GUTBERLET diss. sist. observationes de febre miliari idiopathica. Wurceb. 1790. — HECKER diss. de exanthemate miliari et pemphigo. Erf. 1791. — MAERCKER diss. critica in naturam exanthematis miliaris febrilis. Hal. 1792. — LEHMANN diss. de exanthematis miliaris natura atque differentiis. Francof. 1800. — FONTAINE-BRIQUEVILLE diss. sur la fièvre miliaire essentielle. Paris an X. — FREYER diss. sist. notiones quasdam de purpura. Gött. 1802. — P. S. FROM diss. sur la fièvre miliaire. Paris an XI. — ARNOUX diss. sur la fièvre miliaire essentielle. Paris 1805. — CAVELLE diss. sur la fièvre miliaire essentielle. Paris 1805.

*) Tractatus de febre miliari. Accessit febris miliaris historiarum fasciculus. Lond. 1710.

18) Agra purpura alba majori laborans. Tub. 1723.

FRIDERICH²⁷⁾, PELARGUS²⁸⁾, REINHARD²⁹⁾, ALLIONI³⁰⁾, DE AUGUSTINIS³¹⁾, J. FORDYCE³²⁾, FANTONI³³⁾, MOLINARIUS³⁴⁾, J. B. DE FISCHER³⁵⁾, HANNES³⁶⁾,

- 19) *Betrachtungen des rothen u. weissen Friesels. Schweidnitz* 1735.
- 20) *Historia febris miliaris albae Argentoratum et viciniam ante biennium infestantis. Argent.* 1736.
- 21) *L'art de guerir par la saignée. Paris* 1736.
- 22) *Observationes patholog. practicae de purpura per annos 1737 et 1738 in confinis Goslariae epidemice grassante. Norimbergiae* 1740.
- 23) *Observations on the present epidemic fever. Lond.* 1741.
- 24) *Observationes vom Friesel und Fleckenfieber. Frankfurt.* 1742.
- 25) *De medicamento quodam ad puerperarum febres mali moris etc. Lubec.* 1742.
- 26) *Abhandl. vom Friesel. Bielefeld* 1747.
- 27) *Abhandl. vom dem Lieberfieber, nebst Gedanken von dem Friesel.* 1748.
- 28) *Med. Jahrgänge I. 1. p. 86. — II. p. 437. — III. p. 542.*
- 29) *Febris miliaris purpuratae libri tres. Glogov.* 1758.
- 30) *Tractatus de miliarium origine, progressu, natura et curatione. August. Taurinorum* 1758. (Altera editio a. 1792. Versio germanica auctore F. L. WIGAND. Mühlh. 1767. et auctore J. JAC. RÖMER. Winterth. 1794). Cui accessit ejusdem auctoris conspectus praesentaneae morborum conditionis. 1793.
- 31) *Observationes circa febres miliares regnantes Mediolani* 1758.
- 32) *Historia febris miliaris et de hemicrania. Accedit de morbo miliari epistola CAROLI BALGUY. Lond.* 1758.
- 33) *Specimen observationum de acutis febribus miliaris,*

NES³⁶⁾, SCHULZ A SCHULZENHEIM³⁷⁾, BRÜNING³⁸⁾, GASTELLIER³⁹⁾, W. H. S. BUCHHOLZ⁴⁰⁾, BARETTA⁴¹⁾, BARALDI⁴²⁾, DAMILANO⁴³⁾, J. J. WERNISCHER⁴⁴⁾, SAALMANN⁴⁵⁾, SCHMIDTMANN⁴⁶⁾, KREY-
SIG⁴⁷⁾,

cul praemissa est diss. de antiquitate et progressu febris miliaris. Nissae 1762.

34) De miliarium exanthematum indole et tractatione. Vindob. 1764.

35) De febre miliari, purpura alba dicta, e veris principiis enata et confirmata tractatus, per longam experientiam collectus. Riga 1767.

36) *Brief an Baldinger über den Friesel. Leipzig und Wesel* 1770.

37) *Vom Friesel etc. Lübeck* 1772.

38) *Constitutio epidemica Esseniendiensis anni 1769. 70. sistens historiam febris scarlatino-miliaris anginosae. Wesel.* 1772.

39) *Essai sur la fièvre miliaire. Paris* 1773. — *Sur la fièvre miliaire des femmes en couche. Montarg.* 1779.

40) *Nachrichten von dem jetzt herrschenden Fleck- und Frieselfieber. Weimar* 1773.

41) *De miliaris natura, differentia et curatione. Mediol.* 1778.

42) *Storia di una costituzione endemico-epidemica di febbri migliari. Modena* 1781.

43) *Abhandl. über den Friesel im Piemontesischen. Götting.* 1782.

44) *Frage, warum entstehen so viele Faulfieber, warum sind die Frieselfieber so selten? Wien* 1786.

45) *Descriptio febris urticatae, scarlatinae et purpurae. Münster.* 1790.

46) *Vid. HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. III. B. p. 449.*

SIG⁴⁷⁾, DE HAEN⁴⁸⁾, BURSERIUS⁴⁹⁾, S. G. VOGEL⁵⁰⁾, J. P. FRANK⁵¹⁾, A. DALMAZZONE⁵²⁾, ADELMANN⁵³⁾, STOSCH⁵⁴⁾.

§. XLVI.

Symptomata. Necroscopia.

1. Imminentia sub februm curriculo milia-^{8. prodrom.}ria, praegrandi exacerbatione annuntiari solent. Orbitur haec horripilationibus iisque repetitis, a quibus aegroti praecipue molestantur, dum sese ex uno in alterum latus convertunt, stragula vel quidquam remonent aut brachia denudant. Subsequens aestus, oppressione pectoris, in latere potissimum sinistro¹⁾, peculiari anxietate, jactatione,

47) *Abhandl. über d. Scharlachfieber nebst Beschreib. einer sehr bösartigen Frieselkrankheit. Leipz. 1802. (HUSELAND's Journ. der pr. Heilk. 13. B. 3. St. p. 41).*

48) *Theses de febribus. Vindob. 1760.*

49) *Instit. Vol. II. cap. XI.*

50) *Handb. der prakt. Arzneywissenschaft. 3. Edit. 3. B. Stendal 1820.*

51) *Epit. Vol. III. p. 129.*

52) *Migliare epidemia osservata nei paesi di Sale e Dumerana negl' anni 1821—22—23. (Repertorio medico-chirurgico di Torino dell' anno 1824. compilato dal Dott. G. RICCI. No. 51.).*

53) *Die Frieselkrankheit im Bezirke Geroldshofen. (Rheinisch-Westphälische Jahrbücher für Medicin u. Chirurgie von HARLESS. 9. B. 3. St. 10. B. 1. St.).*

54) *Ueber das Friesel (HUSELAND's Journ. der pr. Heilk. 1824. 2. Heft. p. 58).*

1) „Fere omnes pectoris oppressione cum sensu veluti
Frank Prax. I. 1. 2. A a

tione, doloribus vagis, inprimis dorsij, lumborum, stupore in apicibus digitorum atque crampis manuum et surarum stipatur. Sudor isque copiosissimus, rorosus, interdum viscidus et lintea flavo colore tingens²⁾, acidum vel quid corrupti³⁾ seu potius specifici spirat, ac rarissime desideratur⁴⁾. Praeter enarrata prodroma, dantur alia certis solummodo epidemiis vel aegrotis propria. Hujusmodi sunt: pulsus post novem, undecim aut sexdecim ictus intermittens⁵⁾, stillicidium sanguinis e naribus⁶⁾, deglutitio impedita⁷⁾, sitis absentia⁸⁾, potus aversio⁹⁾, hydrophobia¹⁰⁾, vox tremula¹¹⁾, motus convulsivi¹²⁾, somnus perturbatus,

constrictionis aut ponderis circa sternum, et praesertim in latere sinistro thoracis molestiore angustantur¹³⁾ (BURSERIUS l. c.).

2) ADELMANN l. c. hist. morb. 32.

3) COMMERC. LITERAR. Norimb. 1741. p. 283.

4) S. G. VOGEL (l. c. p. 308.) duo exempla miliarium absque sudore erumpentium elarrat; nil simile praxis mea suppeditat.

5) GASTELLIER l. c. p. 83. 84.

6) GMELIN l. c. p. 45.

7) BRENDL de cognoscendis et curandis morbis. T. II. p. 253.

8) BARAILLON in *Mémoires de la soc. R. de médecine. T. I. p. 193. Paris 1779.*

9) BURSERIUS l. c. §. 392.

10) KREBS in BALDINGER's *Magazin für Aerzte. 6. B.*

11) „Aegri quasi cum tremore loquuntur.“ (HAMILTON l. c. p. 67).

12) GMELIN l. c.

tus, agrypnia, pavores sub somno¹³⁾, cum cordis palpitazione¹⁴⁾, pulsu interea minimo¹⁵⁾, li-
pothymiae¹⁶⁾, molesti mingendi conatus et urina
pallida¹⁷⁾.

2. Incerto admodum tempore miliaria *prodire* Eruptio.
solent; nunc enim in primo morbi limine¹⁸⁾,
nunc die tantum trigesimo quarto¹⁹⁾, plerumque
tertio, quarto²⁰⁾, quinto, sexto, decimo, unde-
cimo²¹⁾, aliquando, ut vidimus, vigesimo pri-
mo, interdum in ipso articulo mortis²²⁾. *Eru-*
ptio, praevisio cutis pruritu, locum habere solet,

A a 2

pri-

13) HAMILTON l. c. BURSERIUS l. c. §. 399.

14) „Somnia terrifica cum magna cordis palpitazione
somnum interrumpentia, ad scrobiculum constrictionis
sensus et ex hac causa respirandi angustia.“ (AL-
LIONI l. c.) „Queritur a quibusdam in corde stimulis
videlicet puncturis undeque ipsius cordis palpitatio-
nem persentit.“ (FANTONI l. c.).

15) „Ho osservato nella nostra epidemia malato, cui il
cuore tumultuava con moti abnormi, avere il polso
quasi spento ai carpi.“ (DALMAZZONE l. c. p. 107).

16) „Vor Schwindel und Ohnmachten aber darf man
sich nicht aufrichten.“ (STORCH *Kinderkrankheiten*.
p. 129).

17) HAMILTON l. c. p. 66. — FRANK l. c. p. 134.

18) KREYSIG l. c. p. 61. 19) BURSERIUS l. c. §. 394.

20) „Tertio interim, aut quarto die, raro serius. . .“
(ALLIONI l. c. p. 47).

21) „Quantum autem assequi possum, eas opinor, deci-
mo vel undecimo plerumque pullulare.“ (HAMILTON
l. c. p. 68).

22) Gmelin l. c. p. 47.

primum ad latera colli, ad mammas, ad regionem epigastricam, ad superficiem internam brachiorum et inter digitorum interstitia, dein ad dorsum, ad abdomen inferius atque ad reliquum demum corpus, rarissime tamen ad faciem et nunquam ad partem capillatam capitis. Interdum tamen miliaria et alio ordine prorumpunt. Ut plurimum eruptio per repetita conamina, rarissime uno temporis puncto per universum corpus²³⁾, contingit.

Efflorescentia.

3. *Copia* miliarium plerumque innumerabilis. Nihilominus rarius et nunquam in universa corpus superficie²⁴⁾ confluant. Cutis, cui miliaria insident, color ut plurimum non mutatur. *Volumen* miliarium diversum est. Tam exigua ea invenimus, ut oculorum aciem fugerent et, rite monente MEAD²⁵⁾, non nisi tactu perciperentur. Alias miliaria magnitudinem seminum milii excedunt atque ad eam lentium accedunt. Vidimus talia descripsitque CAMERARIUS²⁶⁾. Nunquam vero maxima illa miliaria, de quibus hinc inde in fastis medicis mentio fit²⁷⁾, quaeque procul dubio ad *bullas* pertinebant, observavimus. Miliaria, quae sub forma *papularum* prorumpunt, ut-

23) KREYSIG l. c.

24) Miliaria in nonnullis locis confluentia vidi cum GORLICHE et STÖRK (ann. med. I. p. 66).

25) Monita et praecept. pract. p. 14. 26) l. c.

27) *Samml. auserles. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 1. B. 1. St. p. 64. — BURSERIUS l. c. §. 387.

ut plurimum, saltem ab initio, colore rubro instructuuntur: ut plurimum dicimus, nam et *alba* observata fuere²⁸⁾. Miliaria contra ea formam *pustularum* referentia, plerumque *alba* sunt. Miliaria huiusmodi nonnunquam *basi rubra* et *apice albo*, suppurato obveniunt. Liquidum in miliaribus pustulosis contentum nunc est diaphanum, coloris margaritae (*Miliaria crystallina*)²⁹⁾, nunc serosum (*M. aquosa*)³⁰⁾, nuncque purulentum, quasi lacteum (*M. purulenta, lactea*)³¹⁾. Juxta STÖRKII experimentum illud liquidum linguae gustandi gratia admotum, sensum puncturae excitat³²⁾. Ipsa tamen in cute nunquam effectum erodentem inde conspiciere potuimus. Saepe variae miliarium formae simul uno eodemque in aegro occurrunt³³⁾. Peracta miliarium eruptione, febris vel eodem pacto continuat, vel incrementum, vel infringitur, quod ultimum interdum ita evidenter contingit, ut ea fere *critica* dici queant. Miliaria autem in totum critica non vidimus, viderunt quandoque M. COLLIN³⁴⁾, QUARIN³⁵⁾ etc.

28) BECKER l. c.

29) STORCH prax. Stahlia. p. 744. — HAMILTON l. c. cap. I. Quondam miliaria alba *Hydatides crystallinae* appellabantur. (MENZELIUS in Eph. nat. cur. Dec. III. a. 9. obs. 181.).

30) Collect. Wratislav. a. 1724 mense Majo p. 485.

31) Ephem. nat. cur. Dec. III. a. 7. 8. obs. 206.

32) COLLIN l. c. p. 34. 33) KREYER l. c. p. 60.

34) Epistola ad BALDINGERUM, qua demonstratur, pu-

etc. *Duratio efflorescentiae* plane incerta, nunc enim ad paucas solum horas, nunc ad plurimos dies protrahi solet.

Desqua-
malio.

4. *Miliaria papulosa*, sensim sensimque in *furfura*, raro in *squamas*, desinunt. *Miliaria pustulosa* interdum flaccida fiunt, resorpto scilicet liquido, quo distendebantur, alias disrupta, *squamas* duriores, fere *crustas* exhibent. Hinc inde exanthema hoc, nullo relicto vestigio, evanescit. Convalescentes sub minimo motu perturbationes in sanguinis circuitu pati, animoque dejectos esse contenditur³⁵⁾.

Necroscopio.

5. *Cadavera* exhibuerunt: *miliaria*³⁷⁾, calorem diutius solito perdurantem³⁸⁾, adspectum flavum³⁹⁾, vasa encephali sanguine modo fluido, ichoroso foetidoque repleta⁴⁰⁾, modo nigricante et coagulato distenta⁴¹⁾; plexus choroideos pallidos⁴²⁾, serum flaviusculum in vaginis nervorum
paris

stulas miliares male factitias et symptomaticas dici. Viennae 1765.

35) L. C. 36) ALLIONI L. C.

37) FISCHER L. C. („Aeger die duodecimo, rugiente ante multum ventre, moriebatur. Cum denudaretur tunc corpus, mirum copiosis illud obsitum offendebatur miliaris“).

38) DAMILANO L. C.

39) KREYSIG in HUFELAND's *Journal* L. C. p. 84.

40) THEDEN cit. a S. G. VOGL L. C. p. 394.

41) HAMILTON L. C. p. 74.

42) Idem, ibidem.

paris vagi effusum⁴³⁾; idem liquidum in pericardio praeter modum collectum⁴⁴⁾; sphacelum pulmonum⁴⁵⁾; miliaria hepatis et intestinorum superficiem cooperientia⁴⁶⁾; vesiculam felleam bile turgentem⁴⁷⁾; cavitatem tubi alimentarii liquore flavo repletam⁴⁸⁾; membranas serosas omnium cavitatum veluti miliaribus notatas⁴⁹⁾; aliàs tandem nil plane morbosum⁵⁰⁾.

§. XLVII.

C a u s s a e.

1. Sententiae, *clima* inter *caussas* miliarium C. praedisponentes primo stare loco, libenter sub-
scribimus¹⁾. Ignoramus autem, quo pacto clima hoc exanthema provocet. Sane non *calore*; nam regio-

43) ANFAUVRE l. c. 44) FANTONI l. c.

45) ANFAUVRE l. c.

46) ELLER observationes de cognoscendis et curandis morbis. p. 131.

47) ANFAUVRE l. c. 48) Idem, ibidem.

49) STOSCH (l. c. p. 83.) observat. citat. SNEYEN: „Das-
s besonders die serösen Ueberzüge der zur Respiration
und Circulation dienenden Organe, des Herzbeutels,
Herzens selbst, der zu diesen Organen bestimmten Ner-
ven, oder vielmehr deren seröse Ueberzüge sind, die
sich zum Theil mit Prieselbläschen bedeckt, zum Theil
auf andere Art ergriffen vorgefunden haben.“

50) FISCHER l. c. p. 33. — GASTRELLIER l. c.

1) Spatio enim decem annorum centena exempla milia-
rium Ticini et Vindobonae vidi, contra duplici tem-
poris curriculo quinque tantum Vindobonae.

regiones exstant septentrionales, interque has ipsa Polonia²⁾, quibus miliaria non sunt aliena; et altera ex parte meridionales, e. c. Hispania, Sardinia, ubi vix aut ne vix quidem observantur³⁾. Alioquin miliaria rarissime aestivo apparent tempore⁴⁾. Qui aliter sentiunt, illa cum *hydroâ sudamine* confuderunt. Miliaribus aequo pacto qui planitiem Pedemontanam ac qui montes Austriae inhabitant, afficiuntur. Grassantur saepe in locis humidis et uliginosis, e. c. Taurini⁵⁾, Mantovae⁶⁾; at Venetiarum urbs, etsi aquis circumdata, iisdem fere penitus immunis est⁷⁾. Sunt porro loca saluberrima, quibus una miliaria non parcent⁸⁾.

Ge-

2) Medici Poloni in primitiis medicis. Et: CHA. HEINR. ERNDT historica relatio febris pestilentialis in aula R. Poloniae a. 1817—21 grassari deprehensae. In Eph. nat. cur. cent. V. obs. 30.

3) ALLIONI l. c. p. 31.

4) „Vero frequentior; minus frequens autumnis; rarius advenit aestate et summo hieme.“ (ALLIONI l. c. p. 34).

5) „Augusta Taurinorum jacet ad Padî et Duriae minoris confluentem secus editos colles ad orientem positos. Venti quibus atmosphaerae vapores dissipantur, rari sunt. Aer autumnis et hieme nebulosus, semper mollior et gravior.“ (ALLIONI l. c. p. 16).

6) F. ASTI anno medico terzo Mantovano, p. 83.

7) ALLIONI (l. c. p. 31.) testimonio medici Veneti Arcadii CAPPELLO innixus.

8) Bernenses etiam purpuram albam habent, ait ALLIONI (l. c. p. 16.), quamvis A. HALLER illi testatus

Generatim in pueris⁹⁾ et senibus rarius cernuntur. Aggrediuntur juvenes cujusvis temperamentum, sed prae ceteris sanguinei. Idem de hominibus constitutionis imbecillis et laxae¹⁰⁾ contenditur, ast immerito¹¹⁾. Feminae prae maribus exanthemati miliari obnoxiae sunt et maxime puerperae. Caeterum subjacent miliaribus, „qui vino abstinent et utuntur¹²⁾; nobiles euchymis, variisque cibis,

sit, Bernensis urbis aërem ex purioribus esse, et saluberrimum. — SCHMIDTMANN fatetur: „*Ausser dem Friesel kenne ich; hier (im Hochstift Osnabrück und in der Grafschaft Ravensberg) keine einheimische Krankheit.*“ (HUFELAND's Journ. der prakt. Heilk. 3. B. p. 450).

9) Nihilominus STORCH miliaria morbis infantilibus adscripsit (*Kinderkrankheiten*. 3, Th.).

10) HAMILTON l. c. p. 64. („Accedunt constitutio corporis imbecillis, sive ea naturalis est, sive ex evacuationibus supra modum factis, victu nimis parvo adventitia“). STORCH (l. c. p. 130.) ait: „*Kinder, welche zu diesem Friesel geneigt sind, sind mehrentheils von zartem Gewebe, weichem Fleische und blasser Farbe.*“

11) ALLIONI (l. c. p. 35.) constitutionem debilem et laxam magis miliaribus patere negat. Ae re quidem vera judaei Lithuaniae tum ex nativa constitutione, tum lege regiminis vitae, laxioris habitus homines sunt censendi. Deberent hinc prae aliis ad miliaria dispositi esse (quod de judaeis Poloniae contenditur in *Primitiis medic. Polon.* Vol. II. p. 249.), et tamen nec unum in illis hujus exanthematis vidi exemplum!

12) STORCH (*med. Jahrgänge*. 2. Jahrg. p. 215.) testatur,

cibis, rusticisque aquâ, et secalino pene solum pane nutriti; homines coffea¹³⁾ abutentes, aut minime¹⁴⁾.“

C. exci-
tantes.

2. Miliaria, utut endemica, duntaxat accedentibus necessariis *caussis excitantibus* evolvuntur¹⁵⁾. Spectant huc nebulae et imbres copiosi¹⁶⁾, transpiratio suppressa, studia diuturna, moestitia, iraque vehemens¹⁷⁾; laesiones nervorum¹⁸⁾, inprimis medullae spinalis¹⁹⁾, orgasmus venereus²⁰⁾; violenta placentae extractio*), lactis secretio

infantes a matribus ebriosis et menstruantibus natos, inprimis miliaria experiri.

13) FRID. HOFFMANNUS (syst. med. rat. T. IV. P. V.) edixerat, abusum coffeae ad miliaria disponere. Magni viri opiniones nunquam spernendae!

14) ALLIONI l. c. p. 35.

15) Vere ADELMANN (l. c. p. 2.): „*Ueberhaupt scheint der Friesel eine Krankheit zu seyn, die nur gewisse Districte, und auch diese nur zu gewissen Zeiten, liebt.*“

16) PLANCHON (l. c.), ALLIONI (l. c. p. 36.), ANFAUVRE (l. c.) exemplis ab annis 1759 et 1763. desumptis id comprobant.

17) HAMILTON l. c. p. 64. — ALLIONI l. c. p. 36.

18) Miliaria visa sunt a BURSERIO post fracturas (l. c. §. 404.) a WERLHOFF post laesiones tendinum et a J. P. FRANK post vulnera (Epit. l. c. p. 141).

19) Puellam curavi, quae accepto ictu ad spinam vertebralem, in horrorem aquae incidit, sociis copiosis miliaribus.

20) „Plures neonuptarum tales casus, novum *genus februm neonuptarum miliarium* constituerent et medico-

cretio cohibita²¹⁾; neglecta evacuatio meconii²²⁾,
 aliarumque saburrarum²³⁾; regimen sudorife-
 rum²⁴⁾; exsiccatio praepostera tineae capitis²⁵⁾,
 deglutitio arsenici²⁶⁾, muriatis superoxygenati
 hydrar-

rum mentes ad meditationes quasdam prophylacticas
 persuaderent." (FISCHER l. c. p. 49.) Interea suspi-
 cor, impetiginem psydraciam neogamorum dicendam
 pro miliaribus imposuisse.

*) ALLIONI l. c. 21) GASTELLINI l. c.

22) STORCH *med. Jahrgänge*. 2. Jahrg. p. 175.

23) HAEN thes. de febribus.

24) Opinio HAENII (l. c.) originem miliarium ex regi-
 mine sudorifero, neglecta simul primarum viarum
 evacuatione, explicantis, falsa quidem est, ut COLLIN
 (l. c. p. 49.), TIRACOT (*lettre à Mr. HINZEL*. p. 51. 52.
 61. 64.) aliique demonstrarunt; utque nostri aevi ex-
 perientia comprobavit. Nunquam enim methodus
 calefaciens, neglecta simul tubi alimentarii evacuatione,
 magis praevaluit, quam tempore methodi Brunonianae,
 et tamen miliaria frequentiora non fuere quam olim.
 — Verum negari minime potest, ea, agro et constitu-
 tione annua faventibus, per regimen quoque sudorife-
 rum provocari posse. Ipse ALLIONI (l. c. p. 36.) ca-
 lefacientium abusus in febribus, causis miliaria ex-
 citantibus adnumerat. Caeterum cavendum ne papu-
 lae aut pustulae, quae a quocunque forti et protracto
 sudore, praecipue in hominibus cui tenera instructis,
 excitari possunt, quae HIPPOCRATI (Aph. 21. Sect. III.)
 jam notae fuere, quaeque ad hydroam sudamen perti-
 neant, cum miliaribus confundantur.

25) STORCH op. c. 1. Jahrg. p. 147. 2. Jahrg. p. 457.

26) SAUVAGES Nosolog. T. I. p. 401. — DECRANGE in
Recueil périodique. No. 31.

hydrargyri²⁷⁾, acidi nitrici²⁸⁾; inflammationes internae²⁹⁾, maxime vero contagia pestis, typhi, scarlatinae, morbillorum, variolarum, et, ut plurimi putant³⁰⁾, *peculiare* quoddam *miliare* dicendum, quo de argumento infra. Interea fate-mur, nos effectus contagiosos duntaxat in iis miliari-bus animadvertisse, quae morboꝝ alioquin contagiosos concomitabantur. Qui miliaribus in-discriminatim vim contagiosam tribuere malunt, observationes parvi omninò ponderis afferre so-lent³¹⁾.

3. Caus-

27) FANTONI novum specimen observat. de ortu febris miliaris.

28) DEGRANON l. c.

29) JAM STORCH (*Kinderkrankheiten* l. c. p. 131.) scrip-sit: „Auch pflegt er (der Friesel) gerne auf innerliche brandige Entzündungen zu folgen, und könnte daher ein Brandfriesel genannt werden.“ Accessit KREYSIG (l. c. p. 88.) dicens: sollte der Frieselausschlag, beson-ders derjenige, welcher sich zu epidemischen Krankhei-ten gesellt, nicht ein Symptom von einem andern innern Zustande irgend eines Eingeweidcs seyn, und dessen Ent-stehung einer consensuellen Reizung der Haut zu ver-danken haben?“

30) ALLIONI l. c. p. 33. — BURSERIUS l. c. §. 427. — SCHALL et HASERT l. c. — ADELMANN l. c.

31) En exemplum ab ADELMANN (l. c. p. 89.) allatum: „Hoffmann, Lehrer, verlor im May 1817 seine Frau am Frieselfieber. Da er während ihrer Krankheit und nach ihrem Tode in demselben Bette lag, so wurden allmählich viele Frieselbläschen an seinem Körper sichtbar, er empfand grosse Schwäche und schwitzte

3. *Causa proxima* miliarium quaesita est C. proxima, in succis nervorum³²⁾, in acida humorum conditione³³⁾, in putredine sanguinis³⁴⁾, in principio subtili cum causa hydrophobiae affinitatem alente³⁵⁾, in vermibus et insectis³⁶⁾, in laesa excretionem uteri³⁷⁾; in phlogosi cutis³⁸⁾, in affectione cordis et vasorum majorum³⁹⁾. Certum est

beständig. Er wurde nicht bettlägerig und war nach wenigen Tagen bey'm Gebrauche des Haller'schen Sauers wieder gesund. Im November 1818 zog er einen Schlafrock an, dessen sich seine Frau bedient hatte und der bisher in einer Truhe aufbewahrt worden war. Seit dieser Zeit merkte er immer einige Frieselbläschen an beyden Armen, so oft er sich erhitzt." Vivant hujus generis miliaria!

32) BRUNNER l. c.

33) FR. HOFFMANN. RAMAZZINI.

34) DAMILANO. GASTELLIER.

35) ALLIONI comment. de rebus etc. Vol. VIII. p. 606.

36) GORLICHE diss. observationes aliquot practico-clinicas, circa febrem vesicularem exhibens. Erf. 1732.

37) BREITELD in HORN's Archiv für medic. Erfahrung. 3. B. 1. Heft. p. 129.

38) MONTFALCON in dict. des sciences médicales. T. 33. p. 402. („Phlegmasie cutanée, qui concilie dans l'éruption de petites pustules“).

39) Plurimi recentiorum, inter quos DALMAZZONE, qui ait (l. c. p. 106.): „Se io pondero l'osservazione già fatta dal Fantoni, che nelle puerpere ite a morte per migliare, l'autopsia diè per risultato l'evaso siero sanguinolento nella cavità del pericardio; se osservo che l'autopsia in quelle, che perirono per esantemi, non es-

est et jam dudum animadversum⁴⁰⁾, in morbis miliaribus stipatis systema tum nervorum (et maxime medullam spinalem⁴¹⁾), tum vasorum sangu-

clusa la migliare, ci rivela strati di fibrina concreta aderenti alle pareti dei vasi non che ulcerazioni nelle tonache interiori; se osservo che il professor TESTA rinvenne manifesti segni di pregressa aortite in conseguenza d'esantemi; se rifletto che il KREYSIG vuole che gli esantemi gettino il primo fondamento per le malattie del cuore, risvegliando nel tessuto delle membrane parziali infiammazioni; se m'arresto sulla genesi di tali concrezioni sanguigne aderenti alle pareti dei vasi, quali comprendo formate sotto l'influenza dello stato patologico delle loro membrane interne, qual prodotto analogo alle pseudo-membrane interne, alle morbose vegetazioni delle parti infiammate; se infine osservo, che l'angioite vien costituita da un processo flogistico de' vasi arteriosi, e venosi, non esclusa l'infiammazione del cuore stesso, io entro in pensiero che la sola conditione patologica de' vasi è forse l'unica causa delle migliari, e de' sintomi precordiali, che muove, sia perchè il principio vitale vien messo in condizione violenta, e disordinata dal contagio migliare per l'azione di lui sull'organo circolatorio reso così inoperoso e paralitico, lo che si può anco arguire dalla morte la più inopinata, e repentina, sia per il processo infiammatorio, che entro i vasi stessi vi concita, e si svolge snaturandone materialmente i tessuti."

40) „Diximus a miliarium miasmate ea omnia primum produci posse morborum genera, quae ab inflammatione arteriarum sanguinearum et lymphaticarum ac nervorum irritatione pendent.“ (ALLIONI l. c. p. 68).

41) FISCHER (l. c. p. 74.) scenam, quam in miliaribus

guiferorum (et maxime cor) inprimis pati; utrum autem miliaria ex affectione harum partium propullulent, alia est quaestio, cujus solutio limites experientiae excedere videtur.

§. XLVIII.

D i a g n o s i s .

1. Nullum novimus exanthema, quod tot in ^{Facilis} diagnosi erroribus locum dedisset, quam miliaria. ^{confusio.} Jam priusquam efflorescant, symptomata illis prodroma, saepe pro effectū hysteriae proclamantur¹⁾. Peracta porro eruptione facile confunduntur (ne dicamus de papulis et pustulis cataplasmatibus²⁾ aut frictionibus³⁾ excitatis) cum *peticulis*, cum *bullis*⁴⁾, cum *urticaria papulosa*, tum acuta tum chronica⁵⁾, cum *zostere*, cum *exan-*
the-

plexus nervorum meseraicorum ludunt, adeo extollit, ut ex his in consensum acto paris vagi nervorum ramulo ad praecordia, anxietatem, vigilias, deliria, convulsiones, aestus volaticos, sudores etc. repetat.

1) „Urina, nonnunquam ut aqua communis pallida, ... quo symptomate decepti juniores medici, frequenter ad vapores, uti vulgo loquuntur, referunt.“ (HAMILTON l. c. p. 66).

2) Contingit, ut medici immemores partium, quibus sub morborum curriculo cataplasmata prius admovebant, papulas et pustulas istorum culpā ortas, pro miliaribus proclamant.

3) FISCHER l. c. p. 43. 4) Ut supra monui.

5) *Urticationem* pro miliaribus sane habuerunt WIEL (l. c.), E. ROSEN (l. c.), S. G. VOGEL (l. c. p. 386.)

*themat mercuriali*⁶⁾, cum *scarlatina* milif
cum *morbillis*, cum *rubeola*, cum *hydroa*
*strophulo*⁸⁾ et cum *herpete* miliformi. Mi
porro difficultates miliarium diagnosin c
dant, dum ea cum alijs *exanthematibus* c
cantur, quod saepissime cum *peticulis*,
tinâ, *morbillis* et *variolis* contingit.

Dist. a pe-
ticulis.

2. Errori *peticulas* cum *miliaribus* c
dendi tunc solum locus est, dum *peticulae*

aliquae, utpote qui de *exanthemate* miliari, h
feminisque fluore albo et metrorrhagiâ labor
nec non arthriticis familiari loquantur. E. St
edixerat imo: „die Nesselsucht und der Fries
einerley.“ (STORCH *Kinderkrankheiten* l. c. p.

6) FISCHER l. c. p. 45.

7) STORCH (*Kinderkrankh.* l. c. p. 147.) facta ena
observationum de miliaribus infantum, addit
könnte zwar mehrere Begebenheiten zum Nach
recommandiren; allein ich finde bey vielen, da
Verstoss in Diagnosi geschehen und Sch.
für Friesel et vice versa angesehen worden.“

nere mihi omnes casus miliarium suspecti su
feruntur faucium inflammationem sociam h
Eo magis arduum est, miliaria a scarlatina m
distinguere, ubi haec illis praecessit, uti in e
Wittenbergensi a KREYSIGIO descriptâ acciden

8) Huc sane spectant miliaria sine febre, quorum :
(*Kinderkrankh.* p. 144.) ut symptoma dentitionis
minit (*Zahn-Friesel*), dicens: „Solchen .
ist er nicht beschwerlich, es sey denn, dass er il
wenig Zucken verursacht, und bleibt an ihnen)
ständig, so lange sie Zähne hecken.“

cutem, morbillorum instar, elevatae, dumque miliaria rubra et papulosa sunt. Ast *peticulae morbilliformes* super universam corporis, infra caput positi, superficiem sat aequali ratione dispersae atque omnino inter se distinctae cernuntur; contra *miliaria rubra papulosa* maxime ad latera colli, ad epigastrium et brachia obveniunt, idque confertim. Porro et symptomata prodroma miliaribus gentilitia, et notio morborum regnantium diagnosin illustrant.

3. Ubi *peticulae cum miliaribus societatem* Complicatio peticularum et miliarium. *ineunt* (quod praeter alios⁹⁾ jam dudum O. RO-BORETUS Tridenti, P. A CASTRO Veronae et P. SALIUS DIVERSUS¹⁰⁾ Valenciae, viderunt nosque Vindobonae conspeximus¹¹⁾), primum apparent *peti-*

9) Cum peticulis miliaria complicabantur in constitutione epidemica Wemdingensi a. 1689. et in Donawerdensi (ROSIN. LENTIL. miscell. med.-pract. nat. cur. Dec. 3. ann. 5 et 6. append. p. 132.), in Wratislaviensi a. 1715. (GODOFR. KLAUNNING obs. circa febr. malign. petechialca. Eph. nat. cur. cent. 3. obs. 63.) itemque in constitutione annua 1737. Wratislaviae et Silesiae (FABR. FERD. PAULI hist. febr. catarrhal. malign. in Act. nat. cur. Vol. VI. obs. 66.), nec non a. 1756. *Vevey* (TISSOT *lettre à Mr. HIRZEL*. p. 5.), a. 1758. *Vindobonae* (STÖRCK ann. med. I. mens. Jul. et Ang.), a. 1783. *Mantuae* (ASTI l. c. p. 83.) etc.

10) In opp. in tractatu nostro de typho citandis.

11) In nosocomio universali civili ab ann. 1796 usque ad a. 1804. Idem et postea contigisse ex HILDEBRANDII opere (*Ueber den ansteckenden Typhus. Wien.*

Frank Prax. I. 1. 2.

Bb

peticulae¹²⁾, dein ocyus serius miliaria. Interdum his comparentibus illae evanescent, longe autem saepius mixta exstant. Peticulae sic miliaribus junctae utplurimum sat profunde in cute latitare et potius stigmata quam maculas referre solent. Color est illis bruneus, lividus, nunquam (saltem juxta nostras observationes) floridus. Eruptio miliarium et hîc praevis consuetis signis prodromis locum obtinet, inter quae saepissime horror, pectoris oppressio, anxietas et motus spasmodici. Miliarium hujusmodi forma pustulosa, colorque albus. Absoluta illorum eruptione, symptomata ad miliaria spectantia saepe evanescent, caeterum autem morbus pro re nata suam pergit viam. Sunt tamen, qui supervenientibus exanthemati miliari peticulis, symptomatum pristinorum observarunt mutationem¹³⁾.

Miliaria
num ex-
anth. pri-

4. Distinctionem miliarium a reliquis morbis cutis, ad capita sequentia remittendo, arduam

2. Edit. 1815. p. 50.) elucet. Dolendum est auctorem a connubio peticularum et miliarium ita in errorem ductum fuisse, ut ex eo *peculiare exanthema*, sub nomine *typhodes* stabiliverit.

12) „Prima, scribit ALLIONI (l. c. p. 83.) morbi facies est febris peticularis.“

13) „Symptomata peticularum, inquit ALLIONI (l. c.), mutantur. Urinae, quae primum turbatae et crassae fuerant, diluuntur; *Gramf* aliqualis persentitur; surditas recedit; bombus in tinnitum mutatur; sopor in vigiliis, aut coma vigil; prostratio corporis tollitur, pulsus elevatur et frequentior est.“

duam aggredimur quaestionem: *num miliaria ad* ^{mar. an} *exanthemata pertineant symptomatica, an pri-* ^{sympto-} *maria; seu aliis verbis: num detur febris milia-* ^{maticum.} *ris essentialis, nec ne* ¹⁴⁾? Miliaria pro exanthemate symptomatico declarant HAEN, SCHULZ & SCHULZENHEIM, WHITE, CULLEN aliique. Altera ex parte stant COLLIN, TISSOT, BARILLON etc. In media via inveniuntur GERIKE, ALLIONI, BURSERIUS, S. G. VOGEL, J. P. FRANK etc. Ad nos quod spectat, hic uti relate ad peticulas ratiocinandum esse existimamus. Elusâ itaque nosologorum tyrannide, miliaria eousque pro *symptomaticis* habenda, quousque sub decursu morborum locum obtinent, qui juxta morem receptum facile ad febrium et inflammationum stabilitas species revocari queunt; contra illico pro *primariis* declaranda, ubi talia symptomata socia habent, qualia adlatis morbis non quadrant. Absit enim ut naturam inter cancellas systematis coercere velimus. Altera vero ex parte etiam optandum, ne cancellas, quippe quae optima doctrinae adminicula sunt, sine necessitate transgrediamur. Interea morbos, quorum sub curriculo miliaria apparent, ad trutinam vocando, duplex rem judicandi sese exhibet modus. Qui enim miliaria inter exanthemata primaria locant, et a specifico contagio repetunt; hi, quoties miliaria per se,

Bb 2

mor-

14) Legi de hoc argumento quoque meretur ANFAUVRE
l. c.

morbum non constituere fateri adigentur
 ties *complicationem* illorum cum aliis n
 admittere debebunt. Contrà fautores doc
 miliarium symptomaticorum, illa semper d
 ex morbo, cui addicta sunt, repetent.

Miliaria
 in febr
 bus inter
 mittentib
 us.

5. *Febris intermittens miliaris* a SAU
 SIO¹⁵⁾ et CULLENIO¹⁶⁾, falso testimonio¹⁷⁾
 xis, statuta, fortuito tamen aliorum observa
 bus confirmatur¹⁸⁾. Verum observationes h
 modi non adeo clarae sunt, ut inde dubia,
 ad lectos aegrotorum experti sumus, dilui
 sent. Vidimus nimirum febres intermitt
 cum exanthemate miliformi; at cum tale
 thema duntaxat vigente sudoris stadio erup
 idque sine oppressione pectoris sineque mo
 spasmodicis, semper suspicio, illud potius
droam sudamen, quam genuina miliaria co
 tuisse, relinquebatur. Praeterea probe n
 dum, exstare febres continuas, miliaribus
 tas, quae ob conspicuas remissiones cum
 m:

15) Nosolog. method. class. II. ord. 3. gen. 10. spec.

16) Gen. morbor. class. I. sect. 1. gen. 1.

17) Provocarunt nimirum ad WALTHIERUM, qui
 febre miliari *continua*, non de tertiana locutu
 Vid. RONCALLI Europ. medicin. p. 151. ubi
 TRIERI epistola.

18) Acta Berolinensia. Dec. II. Vol. 7. p. 102. (
 tana cum miliaribus albis), ALLIONI l. c. p. 80. (
 tidiana).

mittentibus falsam alant similitudinem quod FISCHE-
SCHERUM¹⁹⁾ et BURSERIUM²⁰⁾ non latuit.

6. *Febres inflammatoriae simplices*, miliaria ^{Miliaria}
socio non habent. Secus autem quando hae fe- ^{in febrib.}
bres complicationem gastricam agnoscunt, transi- ^{inflam-}
tum in febrem nervosam minantur, aut visce- ^{matoriis.}
rum phlogosi stipantur, idque potissimum in lo-
cis et sub constitutione annua, alioquin miliaribus
faventibus, in puerperis, et post abusum
venae sectionum.

7. Eâdem sub rerum positione longe adhuc ^{Miliaria}
facilius miliaria in *febribus rheumaticis*, praeser- ^{in febrib.}
tim arthritide affectos detinentibus, prorumpunt, ^{rheumati-}
iisque characterem nervosum imprimunt²¹⁾. ^{cis.}

8. Maxime autem miliaria *febribus catarrha-* ^{Miliaria}
libus addicta sunt, et quidem non solum *nervo-* ^{in febrib.}
sis, sed et *insontibus*²²⁾. Morbus hîc usque ad ^{catarrha-}
sextum, septimum, octavum diem, quo illi (prae-
viis quadam anxietate et quibusdam motibus spas-
modicis) sub continuis sudoribus miliaria (modo
rubra,

19) l. c. p. 62. („Hinc fit, quod febrem intermitten-
tem aliquando mentiatur febris miliaris“).

20) Op. c. Vol. II. §. 178. („Nec obstat, ab initio fe-
brem illam (miliarem) primis diebus sub tertianae in-
termittentis specie luisse, cum hoc saepe eidem so-
lenne sit“).

21) Cap. II. §. X. No. 7.

22) In nosocom. universali civili Vindobonensi, maxime
vere a. 1800, pluries febres catarrhales, miliaribus sti-
patae, admodum benignas observavi.

rubra, modo alba semper valde conspicua et ad apicem saepe purulenta) associari solent, nil peculiare exhibet. Peracta eruptione, nisi aeger frigori sese exponat (quo in casu et tussis saeva et anxietas praesto sunt) jam convalescentia ingruit, tamen ante decimum quartum morbi diem vix omnibus numeris absoluta. Longe vero aliter res in *febris catarrhalibus nervosis seu malignis*, procedit. Sub summa enim virium jactura, sopore, sudoribus frigidiusculis et foetidis, praevio cutis in pectore et dorso rubore, miliaria, peticulis lividis jam pridem praesentibus, adsociantur, parum prominentia moxque evanescentia.

Miliaria
in febr.
gastricis.

9. Inter *febres gastricas* frequentissime *pituitosa*, miliaria exhibet; saepe *aphthis* nupta. Confirmatur inde tum affinitas febrium pituitosarum cum catarrhalibus²³⁾, tum illa miliarium cum aphthis. Ne interim haec affinitas, aliorum ad exemplum²⁴⁾, nimis extollatur!

Confirmatio
argu-
menti.

10. Miliaria in *febris biliosis* non vidimus, viderunt alii²⁵⁾. Observata praeterea est epidemia miliaris affectione hepatis insignita²⁶⁾. Sy-

stemati

23) Cap. IV. §. XXIV. No. 7.

24) „Mehreren Aerzten scheint die Materie des Fricsele und der Schwämmchen einerley zu seyn, deren verschiedene Erscheinungen nur von der Verschiedenheit des Sitzes entstehen.“ (S. G. VOOEL l. c. p. 381).

25) BOUCHER in Journ. de médecine. Sept. 1781. p. 272.

26) KREYSIG in HUFELAND's Journ. l. c. p. 85.

stemati nervoso abdominali in miliaribus gignendis permultum tribuit expertissimus FISCHER²⁷⁾.

11. In genere malum non invenies, cui miliaria magis addicta forent, quam febribus, labefactione systematis nervosi insignitis²⁸⁾. Mil. in febre nervosa, peste, typho etc. Loquimur non solum de febribus nervosis proprie dictis, sed etiam de peste²⁹⁾, de ephemera sudatoria miliari SAUVAGESII deque typho, ad quem sane maxima ex parte febres sic dictae miliares antecessorum spectant. Ast de istis morbis, aeque ac de aliis miliarium evolutioni faventibus (puerperio non excepto) in curriculo hujus operis debitis in locis quaestio fiet³⁰⁾.

§. XLIX.

P r o g n o s i s.

1. Miliaria nunquam flocci pendenda sunt. Generatim. Insidiosum enim sistunt exanthema. Nec ipsa excipi

27) l. c. p. 71. (Contendit „quod plexus mesentericus cum turbis hypochondriaciis communiter morbi sodalis sit, idque eo magis, quando viscera abdominis jam antea status fuerint morborum“).

28) Nervorum febrim et morbum esse febrim miliarem jam BRAUNNEUS (Ephem. nat. cur. Dec. III. a. 7. 8. obs. 206.) fatus est. Consentit FISCHER (l. c. p. 71).

29) „Mili licet suspicari (miliaria) pestis seminum esse, quod ea ratione propter coeli diversitatem degeneravit.“ (ALLIONI l. c. p. 122). Haec etiam est opinio, quam protulit LE PECQ DE LA CLOTURE (Journal de médecine. Décembre 1786. p. 436).

30) Cfr. P. I. Vol. II. Sect. I et II.

excipl merentur *miliaria critica*, saepe plus quem solvunt, morbo timenda. Caeteris p *bonum*: dum miliaria in primo haud com morbi limine; — dum iis comparentibus, ptomata prodroma (excepto *moderato* sude evanescent, vel saltem multum remittur dum ipsa morbi symptomata ab eruptione rium leniuntur²⁾ praecipue dum pulsus ex tracto fit expansus et urina ex pallida tin dum miliaria non admodum exigua sunt⁴ dumque eruptio nec pauca et partialis est copiosa et universalis. Contraria *mala*, quoque repentina, sine nota causa, in mutatio, vel magna anxietas et jactatio⁵⁾,

1) „Quo effusior sudor in principio, cum pulsu vel plane minimo, eo majus periculum.“ (AL L. c. p. 48).

2) Nem cum aeger valde periclitatur „post expulsi persistunt et crescunt symptomata.“ (ALLION: p. 48).

3) Vice versa „citrinus urinae color, qui subito i lozem transit, de metuenda metastasi medicum net.“ (HAMILTON l. c. p. 83).

4) „Si optime vertat, pustulae cito grandescunt et pido sero replentur, cum aliqua cutis inflamm quae plenior et tumefacta cernitur.“ (ALLIONI p. 48).

5) „Quo majores anxietates et brachiorum ardore gravior morbus, imprimis si modestis alvi subd nibus non cedunt.“ (FISCHER l. c. p. 106).

lia 6), vel mortis timor. Eruptiones miliarium, per plura conamina operatae, morbum plerumque longum praesagiunt. Ex colore quidem miliarium decerni nil potest; rubra tamen, saltem ad basin, albis praeferuntur. Contra ea, pellucida, crystallina et lactea deteriora haberi solent 7). Diarrhoea modica ut plurimum proficua 8); serosa autem et vires prosternens mala 9). Nullum denique exanthema facilius quam miliaria, subsidet ac evanescit; quo in casu morbus maxime ingravescit; ac praevis immanibus angustiis, accedentibusque tum phlogosis, tum gangraenae viscerum indicibus, mortem properat. Fugantur autem miliaria innumeris causis; inprimis ab efflatu aurae frigidiusculae 10) et animi pathematibus 11). Nec magna hic requiritur occasio; sufficit

6) „Aegri quo magis somnolenti, eo facilius convalescunt.“ (HAMILTON l. c. p. 184).

7) „Ein rother Friesel verhält sich wie gutartige Blattern und ist von keiner sonderlichen Gefahr; etwas gefährlicher aber ist der weisse Friesel . . . und noch gefährlicher ist der helle Friesel.“ (STORCH Kinderkrankh. p. 136).

8) „Alvum in secunda periodo moderate fluere utile est.“ (ALLIONI l. c. p. 54).

9) „Diarrhoeae pertinaces, inprimis cum delirio, male.“ (FISCHER l. c. p. 108).

10) HAMILTON hist. 5. 11. Historiae febrium miliarium ex frigore mortalium.

11) J. CH. REINMANN de febre purpurea alba maligna, insigni timore exacerbata, et pessimis symptomatibus,

cit interdum clysterem administrasse¹²⁾, v. deligasse¹³⁾, mitram sibi imposuisse¹⁴⁾, v. imprudenter protulisse.

P. miliarium in febrib. intermitt. 2. In *febris intermittentibus* miliaria rexiac tempore perstantia, ob id timenda quia ab ingruente futuri paroxysmi frigore solent, quod tum in tertiana¹⁵⁾, tum in tana¹⁶⁾ observatum est.

P. mill. in febrib. inflamm. 3. Miliaria in *febris inflammatoriis* mum displicent, quoniam aut praetervisam plicationem gastricam, aut transitum morbi febrem nervosam, aut reconditam phlogosi errores in cura commissos indicant. Magni momenti ratio, si aeger fuerit alioquin pumis, viribus fractus, visceris qualiscunque detentus.

P. mil. in febrib. rheumat. et catarrh. 4. Omnium minime timenda sunt in *febris rheumaticis et catarrhalibus*. enim hic non significant malignitatem, ni

mortem praesagientibus stipata, tandem felicitate. (Nova acta nat. cur. T. II. p. 354).

12) Primit. phys. med. Vol. II. p. 22.

13) STORCH *med. Jahrgänge*. 4. Jahrg. p. 267.

14) BAUNNER l. c.

15) „Aliquando mihi contigit videre tertianarum simplicem pene omnino intermittentem, secundo tertio paroxysmo miliares pustulas attulisse, eius tempore, cum rediret accessio, retrocedente pustulis, aegrum periisse.“ (ALLIOT p. 79).

16) Act. Berolin. l. c.

ab aliis symptomatibus, praecipue a peticulis, ab evacuationibus colliquativis et a virium dejectione comprobetur. Igitur non mirum, ei medicus, cui miliaria non nisi istis in febribus benignis obvenerint, se nunquam aegrum hoc exanthemate adfectum amisisse, gloriatur¹⁷⁾. *Critica* caeterum ea duntaxat miliaria dici poterunt, quibus comparentibus, febres rheumaticae vel catarrhales simul cum symptomatibus localibus tolluntur. Alias enim miliaria potius illarum in febrem nervosam transitum aut saltem longam durationem indicant¹⁸⁾.

5. Miliaria in *febris gastricis et nervosis*, P. mll. in ut saepe fieri solet, sine levamine evidenti pro-^{febr. ga-} rumpentia, morbum magis magisque intrlicant; ^{stricis et} nec satis; etiam felici in casu, imperium ipsam in convalescentiam et ultra exercent.

6. Qui enim morbis miliaribus stipatis gra-^{Reliquae} viter laborarunt, tandem corripuntur tumoribus extremitatum inferiorum¹⁹⁾, difficili sudatione, aut ex quocunque motu facillimâ, furunculis²⁰⁾, summa nervorum mobilitate et in timorem magna pro-

17) BÜCKING I. c. p. 63.

18) „Salus ordinario non redit, nisi post decimum quartum diem, aut vigesimum.“ (ALLIONI I. c. p. 50).

19) „Tumor femorum, tibiæ, pedumque non semper indolens.“ (HAMILTON I. c. p. 70).

20) ALLIONI I. c. p. 55.

proclivitate²¹⁾, epilepsia²²⁾, memoriae infirmitate²³⁾, delirio melancholico²⁴⁾, paralyti²⁵⁾, claudicatione²⁶⁾, ischiatico dolore²⁷⁾, hydrophobiae specie²⁸⁾.

§. L.

C u r a.

Genera-
tim.

1. Symptomatibus prodromis, indole morborum regnantium ac conditione aegrotorum adventum miliarium praesagientibus, quaevis frigus suscipiendi occasio ab universâ corporis superficie arcenda¹⁾. Praeprimis sudores patienter tolerandi, quin tamen stragulorum vi eliciantur²⁾. Indusium sudore frigescente madidum, cum alio, dummodo sicco et calido, commutandum. Sunt qui ad eruptionem miliarium sollicitandam, *frictiones*

21) Idem, ibidem.

22) BARAILLON *observation sur une espèce d'épilepsie, qui reconnoit pour cause le virus exanthématique miliaire. (Histoire de la société R. de méd. a. 1776. Hist. p. 225).*

23) HAMILTON l. c. Cfr. hist. 13. — ALLIONI l. c. p. 55.

24) ALLIONI l. c. p. 55. — BURSERIUS l. c.

25) HAMILTON l. c. hist. 2. — ALLIONI l. c. p. 55.

26) ALLIONI l. c. 27) Idem, ibidem.

28) Idem l. c. p. 56.

1) S. G. VOGEL (l. c. p. 402.) suadet et faciem tenui lintheo obtegendam.

2) „Stragulis aegri tegendi sunt, ad calorem naturalem et lenem diaphnoen servandam, non autem ad illos suffocandos.“ (FISCHER l. c. p. 92).

ctiões cutis, ope panni lani, *suffumigio succini* imbuti, et applicationem *cucurbitularum siccarum* suadent. Verum, quum horum auxiliorum administratio, aegri denudationem exposcat, quin segni miliarium officinae calcaria addat, illa omitimus. Ne vero hujus officinae facultas praepostere deprimatur, a pharmacis narcoticis (ad quorum exhibitionem tumultus systematis nervorum, miliaribus erupturis socius, invitare solet), libenter abstinemus, quin tamen *futuri* phaenomeni gratia *praesentes* indicationes negligamus. In genere respectu administrationis pharmacorum (in morbo benigno ut plurimum supervacaneorum, et in maligno saepe inutilium³⁾) *moderate incedimus*⁴⁾.

2. Ne secus sub *miliarium eruptione* et *efflo-* Continua-
tio argu-
menti.
rescen-

3) FANTONI scribit (l. c. p. 224.): „Quaedam tempestatum atque morborum constitutiones sunt, in quibus occumbet magna pars aegrorum, quacunque ratione curentur.“

4) SAFTT (l. c. p. 21.) istam inculcans moderationem suadet, ut quaseratur potius, *utrum medicamentum necessarium sit, quam quodnam*. Pulchre et BURSENIUS (l. c. §. 443.): „At non possum in universum satis inculcare, simplicissimam medendi methodum compositae et generosiori esse plerumque praefereendam, felicisque illos aegros e morbo evadere, qui naturae opus non turbaverint, et diluentibus, temperantibus idoneoque dietetico regimine plus confisi sint, quam medicamentorum farragine, aut multiplici operationum adhibitione.“

rescentia. Sudor hic minime pellendus, sufficit enim levis corporis mador⁵⁾, nisi natura ipsa criticum cum symptomatum allevatione agat sudorem. Tepidum omne bibatur. Valent praeterea quae visui sunt jucunda, quae aures demulcent, blandiloquia, consolationes, et omnia, quae animum debitos inter limites erigunt⁶⁾. His praestitis viam regiam curae patulam esse putamus. Haec pro varia morborum, miliaria socia habentium indole, vario modo instituenda.

C. mil. in
febr. in-
termitten-
tibus.

3. Si miliaria in febribus intermittentibus obveniunt, ante omnia latens forte complicatio congruis auxiliis, videlicet antiphlogisticis, si morbus fuerit inflammatorius⁷⁾; evacuantibus, si gastricus⁸⁾, abigenda, et tunc demum ad *cincho-*
nam,

5) „In totum autem rejicere regimen diaphoreticum non sim author.“ (FISCHER l. c. p. 84).

6) „Et quaecunque commovent spiritus animales, sive grata, sive ingrata fuerint, noxia sunt.“ (HAMILTON l. c. p. 89).

7) „Spasmodus inflammatorius sanguinis non raro cum intermittentibus febribus consociatur, quae venaesectionem exostulat. Haec nisi fiat, in continuam febrem degenerant, aut quotidianam, quam dolores, rheumatismi atque varii decubitus ad varias partes sequuntur.“ (ALLIONI l. c. p. 167).

8) „Curationem per evacuantia in miliarium cum intermittentibus complicatione peragi posse planum est.“ (ALLIONI l. c.).

nam, citius in casu perniciosae, ocyus aliàs deveniendum 9).

4. Miliaria *'phlebotomiam, in febribus inflammatoriis, rheumaticis et catarrhalibus, dummodo caeteroquin indicata fuerit, minime excludunt, imprimis in aegrotis robustis, bonoque habitu praeditis, certisque anni aërisque constitutionibus, sique febris ingens, pulsus validus, durus, magnus; calor urens, facies rubra, respiratio anxiosa et capitis dolor vehemens*¹⁰⁾. Imo et sine istis notis inflammatoriis, genuina visceris cujusdam phlogosis hisce in morbis venaesectionem exposceret. Neque timendum, inde miliaria concidere aut evanescere¹¹⁾. Caeterum probe retinendum, miliare exanthema *per se sanguinis* mis-

C. mil. in febribus infl. rheumat. et catarrhal.

9) „Plurimae iterataeque observationes me docuerunt, miliarium miasmati corticem peruvianum nocere. Febres intermittentes facile in continuas mutantur . . . tot, uno verbo, infortunia, atque morborum diutissimas successiones ex usu corticis observavi, ut non suadeam ejusdem usum, nisi quando vero timendum sit, ne frigoris aut rigoris reditus pustulas retropellet. . . . Tunc autem quisque videt, cortice peruviano succurrendum esse.“ (ALLIONI l. c. p. 165, 166).

10) ALLIONI l. c. p. 160. — DE AUGUST. l. c. (In epidemia Novariensi a. 1755. tanta erat inflammatoria diathesis, ut nullus miliaribus correptus evaderet, nisi sanguis detractus fuisset. — SELLÆ med. clinic. 2. edit. BURSERIUS l. c. §. 433.

11) COLLIN l. c. p. 62. — BURSERIUS l. c. §. 434.

missionem minime postulare¹²⁾. Medici igitur prudentis erit, in casu dubio, sine praeconcepta opinione, genium morbi cautâ venaesectione explorare, deindeque juxta effectum, viriumque vitalium conditionem, aut illam repetere, aut omittere. *Cucurbitulae scarificantes* ob refrigerationis periculum vix locum obtinent. Idem de *hirudinibus* valet, nisi placeat, illas gingivis aut ano, ob congestiones in vasis encephali et abdominis, admove¹³⁾. Et tamen medici temerarii non desiderantur, qui aut applicationem linteorum, *aqua frigida* madefactorum, ad extremitates¹⁴⁾, aut frigidam lotionem¹⁵⁾, aut affusionem¹⁶⁾ commendare audeant! Gloriantur se non

12) HAMILTON l. c. p. 89. („Raro etiam sanguinis emissio permittenda, nisi ex urgente aliquo symptomate, e. c. asthmate, pleuritide, vel simili indicaretur“). — MEAD monit. et praecept. med. Sect. IV. p. 13. 14. (monet „quo minori copia missua fuerit sanguis, eo citius utplurimum finiri morbum; deficientibus enim extremis diebus viribus, pustulae, inquit, retrocedunt et aeger moritur“). — COLLIN l. c. p. 72. — GASTELLIER l. c. p. 362.

13) Primit. med. Pol. — FISCHER l. c. p. 87.

14) HORN's *Archiv für med. Erfahrung.* 5. B.

15) „Temeraria sane est lotrix illa methodus cum frigida, quam praedicatam legimus in appendice. Vol. X. Eph. nat. cur.“ (FISCHER l. c. p. 77).

16) MARCUS *Entwurf einer speciellen Therapie.* 3. Th. — REUSS l. c. — DOLET ADELMANN (l. c. p. 36.), incolas, inter quos praxin exercet, adeo sanâ ratione do-

non omnes aegrotos interfecisse¹⁷⁾! — *Nitrum* etiamsi diathesi inflammatoriae accommodatum, ob vim tam refrigerantem, quam diureticam, sub miliarium praecipue alborum curriculo, suspectum est pharmacon¹⁸⁾. Nec mirum, si verum est, jam *emulsionem refrigerantem* cum detrimento adhibitam fuisse¹⁹⁾, lotique profluvio exanthema a cute diverti. Quousque igitur status inflammatorius viget, vix alia tuto adhiberi queunt
phar-

tatos esse, ut affusiones frigidas non admiserint, provocatque inter alios ad S. G. VONZ, qui saltem huic curandi rationi non adversatur. Revera egregius vir suam contra admissionem frigoris aversionem acrius manifestare debuisset.

17) „Frigus externum, aut regimen quocunque modo frigidum periculosum est; et mortis causa nonnunquam subitanese; tum etiam, cum pleraque symptomata, optatum morbi eventum promittunt.“ (HAMILTON l. c. p. 105).

18) „Suspectum idcirco ejus (nitri) usum habeo, dum pustulae erumpunt, nisi vehemens sanguinis et bilis potissimum impetus attemperantia, et quae compe-
scent, expostulet. . . . Prima periodus plerumque nitri usum permittit, sed in altera caute hoc praesidii genus impendendum.“ (ALLIONI l. c. p. 188). Idem jam FR. HOFFMANN (l. c. §. 3.) docuit, imprimis si miliaria fuerint *alba*. In miliaribus enim *rubris*, sub sestu, medicamenta diaphoretica leniter nitrata, ut accommodata admittit.

19) HAMILTON l. c. hist. febris miliaris ex sumtâ emul-
sione lethalis.

Frank Prax. I. 1. 2.

Cc

pharmaca²⁰⁾, praeter ptysanas, additis *acidis vegeta-*

20) Licet hucusque a nemine *digitalem purpuream* in morbis, exanthemate miliari stipstis, vel adhibitam vel propositam videamus, id tamen habita ratione theoriae, miliaria ex affectione cordis et vasorum majorum repetentis, brevi fore, expecto. Medicis, qui talia moliuntur, considerandum relinquo, num liceat aegrotorum vitam experimento, uni theoriae utnt plausibili innixo, submittere? Sed concessio, theoriam omnino veritati consonam esse, eritne etiam syllogismus rationi consonus: miliaria ex affectione cordis et vasorum sanguiferorum prodeunt, digitalis in has partes specificam exercet vim, ergo indicata est. Quid, si specifica digitalis in cor et vasa sanguinea vis generis foret deprimentis, sique inde consumi naturae, orisui versus cutim moliendi, obstaculum poneretur? — Affulget caeterum lux. Ocyus enim serius morbus miliaribus stipatus atque ita constitutus, ut alioquin usum digitalis absolute exposcat, adveniet, tunc et medicus praxin religiose exercens, a prudenti experimento non alienus erit. Interea observationem juvenis Borussi mense Martio a. 1822. a me Vilnae, socio D. BERNARD curati, silentio non praetereo. Aeger gravi laborabat peripneumonia. Necessariae venae sectiones, cucurbitulae et hirundines adhibitae fuere, at paucio cum levamine. Terreabant quummaxime anxietas, jactatio, tussis, subsultus tendinum etc. Quum extravasatum forte in cavitatem pericardii suspicaremur, digitalem purpuream praescripsimus, at incassum. Post biduum en endores acidi, profusi, nullum levamen afferentes. Mox miliaria praedixi et interea remediis emollientibus standum esse suasi. Paulo post miliaria revera in conspectum ve-

*getabilibus*²¹⁾ et saccharo ad gratum saporem. Quodsi faucium affectio aut tussis acidorum usui obstarent, *linctus*, in morbo rheumatico sive catarrhali provectiori, nisi sudor alioquin urgeat, *lenibus* diapnoicis²²⁾ junctus²³⁾, exhibetur. Sicuti febres rheumaticae aut catarrhales in genere, quamprimum indolem inflammatoriam methodi antiphlogisticae ope amiserunt, *vesicatoria* exposcere solent; ita etiam in casu, quo miliaribus stipantur²⁴⁾. Qui usum vesicantium in morbis, miliaribus insignitis, reprobant²⁵⁾, ea sub contrariis rerum positionibus, quibus ipsa adversantur e. c. vigente in primo dictarum febrium li-

Cc 2 mite²⁶⁾,

nerunt. Peractâ repetitis conaminibus illarum efflorescentiâ, aegrotus integrae sanitati restitutus est.

21) „Denique adhibenda sunt subacida, ut sunt aurantia, medica et punica mala, acetosa, acetosella aliaque similia.“ (ALLIONI l. c. p. 151).

22) „Animadvertemus efficacissima diaphoretica (quae calefacientia et aromatica sunt), hac in aegritudine non convenire. In prima periodo eruptionem promptiorem in aegri detrimentum faciunt: in altera vero febrim, calorem adaugent.“ (ALLIONI l. c. p. 188).

23) R. Mucilaginis gummi arabici, syrupi violarum ââ unciam unam, aquae florum tiliae uncias sex. Capiatur paullatim.

24) Scribit HAMILTON (l. c. p. 87.): „Nullum itaque aliud remedium, spirituum animalium commotionem magis sedat, somnumque conciliat, aut spiritus depressos levare solet.“

25) DAMILANO l. c. p. 115. — BANALDIUS l. c. p. 31.

mite²⁶⁾, adhuc statu inflammatorio, vel morbo complicationem saburralem aut biliosam agnoscere²⁷⁾, adhibuerunt.

C. mil. in febribus gastricis. 5. Quoties enim miliaria *febrem gastricam* sociam agnoscunt, ante omnia puritati primarum viarum studendum. Orditur ideo cura ab *emetico*²⁸⁾, nisi aut status viscerum abdominalium inflammatorius, aut impotentia aegri ad vomitum, aut genius epidemicus²⁹⁾ impedimento sint. Sua-
detur

26) Vesicatoria „in amplissimi etiam morbi *prima periodo* noxa non carere“ opinatur ALLIONI (l. c. p. 187.), qui caeterum, sicut et KREYSIG (l. c. p. 108.) illa nec commendat, nec vituperat. Vesicatoria duntaxat quarto vel quinto morbi die post sanguinis missionem applicuit MOLINARIUS (l. c. p. 449).

27) Non mirum ait BURSERIUS (l. c. §. 437.), BARALDIO vesicatoria nocuisse, „quod miliaria in ejus aegrotis cum tritaeophia biliosa, et quasi ardente complicabantur, ac proinde non egebant calcari ullo, nec ullo incitamento, sed potius freno et moderamine.“

28) De epidemia milliari Wittenbergensi ait KREYSIG (l. c. p. 184.): „Die Brechmittel thaten gewiss in sehr vielen Fällen sehr gute Dienste.“ S. G. VOGEL (l. c. p. 398.) monet: „Brechmittel sind, wenn nichts dringendes dagegen spricht, beynahe immer die Hauptmittel, nicht allein in Absicht ihrer ausleerenden Eigenschaft, sondern auch ihrer wohlthätigen Wirkung auf die Haut.“

29) In epidemia a BRAUNINO (l. c.) descripta, multum detrimenti attulerunt emetica. Nec semper profuere apud KREYSIG, qui (l. c. p. 105.) ait: „Wirklich hat auch die Erfahrung gezeigt, dass viele von denen ge-

detur praeprimis emesis ad anxietatem miliaribus sociam mitigandam³⁰). Ut autem vomitus hic excitetur, radix *ippecacuanhae* (adultis ad scrupulum et ultra³¹) porrecta), tartaro emetico anteponenda, ne videlicet alvi profluvium, miliarium eruptionem impediens aut illorum curriculum perturbans, oriatur³²). Quae tamen non ita intelligenda sunt, ac si in casu, ubi saburra inferius locata est, magisque intestina occupat, blanda *laxantia*³³), quocunque sub morbi stadio, adhiberi haud possent. Scopo tamen tutissime incedendi, evacuationesque potius sensim sensimque praeparandi, quam qualicunque demum vi excitandi, *resolventia* adhibere solemus, in-

primis

storben sind, welche sogleich im Anfange Brechmittel genommen haben.“

- 30) „Nicht selten gibt ein Brechmittel einige Hülf. wenn zumal ein Theil der Angst und Beklemmung seinen Grund in gallichten oder schleimicht-gallichten Unreinigkeiten des Magens hat.“ (S. G. VOOGL I. c. p. 400).

31) Monet nempe KRETSIO (l. c.): „Als etwas eigenes muss noch bemerkt werden, dass ziemlich viele Kranke sehr schwer zum Brechen zu erregen waren.“

- 32) „Brechmittel haben in den meisten Fällen einen grossen Vorzug vor den abführenden Mitteln, die in der Folge d. Krankh. weit mehr die Kräfte ergreifen u. weit leichter den Ausschlag zurück treiben.“ (S. G. VOOGL I. c.).

33) Serum lactis vel simplex vel cum tamarindis coctum, flos cassiae, cremor tartari, tartarus solubilis, et praecipue oleum suadente BURSERIO (l. c. p. 436).

primis ea, quae ex connubio substantiae alcalinae cum acido vegetabili emergunt, addito vehiculo nervis amico³⁴). Nec cauto *calomelani* hic (potissimum si affectio hepatis simul lateat, methodo antiphlogisticae rebellis) adversamur usui³⁵). Nisi inde jam alvus moveatur, *clysteribus emollientibus*, communi consensu probatis³⁶), debitis, ut refrigerium evitetur, cautelis, utimur.

6. Mi-

34) R. Subcarbonatis potassae aut lapidum cancrorum scrupulos duos, succi citrini recenter expressi quantum sufficit ad saturationem, aquae cerasorum nigrorum uncias sex, syrupi citri unciam unam. M. Secunda quavis hora unciam unam.

35) Teste GMELINIO (op. c.) specificum J. G. WAGNERI (de medicamento quodam ad puerperarum febres mali moris epistola. Lubecae 1747.) nil nisi *calomel* erat. ALLIONI (l. c. p. 140.) a pharmaco ex connubio *stibii* cum *mercurio* emergente atque a БОЖНААВЕ adversus variolas commendato (aphor. 1392.) etiam in miliaribus magnam utilitatem augurabatur. Revera *Kermes, calomelano* nuptus profuit in miliarium epidemia, descripta a GARNER (Sammlung von Beobachtungen. 4. B. p. 176. 204). Maxima autem laus *calomelani* a KRETSIO impertita fuit (l. c. p. 110—117.); quod ut *ecceproticum* concedo, ut *specificum* nego. Candida saltem est confessio ADELMANNI (l. c. p. 25.): „Ich glaubte in dem versüßten Quecksilber ein spezifisches Mittel gefunden zu haben, wozu mich GMELIN, ALLIONI und KRETSIO verführten. . . . Aber ich betrog mich bey allen diesen Ansichten, wenn auch ein Kranker davon kam, so starben dafür wieder zwey andere.“

36) „Tutissima autem omnium in toto morbi curriculo

6. Miliaribus in febribus nervosis comparen-
 ribus, quatenam inter consueta aliasque indicata C. miliar.
in febrib.
nervosis.
 pharmaca tunc aut eligi aut ommitti debeant,
 quaeritur. Qui febres nervosas (saltem eas quas
 ex gastricis oriuntur) insimul cum miliaribus e
 putredine repetunt, *acidis mineralibus* favent³⁷).
 Contra, qui miliaria ex conditione acida sangui-
 nis explicant, cane et angue pejus illa fugienda,
 et pharmaca generis oppositi eligenda esse sua-
 dent³⁸). Quid experientia? Docet, acida mine-
 ralia miliaribus non quadrare³⁹). Quadratne *cin-
 chona*? Eam nunquam profuisse vidimus, —
 quo-

ad alvum laxandam, apertamque servandam, nemine
 discrepante, reputantur enemata emollientia.“ (BUR-
 SERIUS l. c. §. 436.).

37) ALLIONI (l. c. p. 152.) monet: „Corruptiva porro
 humorum natura requirit, non modo usum aubacido-
 rum sed . . .“

38) HAMILTON (l. c. p. 85.) scribit: „Ad sanguinis suc-
 cique nervosi aciditatem (unde coagulationes sanguinis,
 et seri secretiones proveniunt) edulcorandam, medica-
 menta, vulgo alcalina dicta, et praecipue testacea sunt
 eligenda: e quibus sunt oculi cancrorum, margaritae
 praeparatae et similia.“

39) Ipse ALLIONI tandem debitum experientiae tributum
 persolvit, monens (l. c. p. 151.): „Acida mineralia
 eo quod nimis valide sanguinis motum compescant,
 suspecta habeo, nisi parva dosi exhibita, multa aqua
 diluta, et partitis vicibus data.“ — BURSERIUS l. c.
 §. 438. et multae propriae observationes.

quousque morbus acute decurrebat⁴⁰⁾. Secus autem, ubi in longum trahebatur, viresque praeter modum languebant⁴¹⁾. Quadratne *opium*? Generatim sententiae viri experti⁴²⁾ subscribimus „saepius nocere, quam prodesse.“ Mirum sane, ab opio hic nec vigiliis⁴³⁾, nec convulsiones sedari⁴⁴⁾. Interea hoc magis de recentiori morbo, deque miliaribus, aut saburris nuptis⁴⁵⁾, aut puerperii comitibus, quam de provectoribus febribus nervosis intelligendum. Enim vero dum hic reliquae circumstantiae, praesertim diarrhoea vires exhauriens⁴⁶⁾, opium exposcebant⁴⁷⁾, id praesentibus miliaribus aequali cum successu praescripsi-

40) ALLIONI cinchonam in genere rejicit, asserens, miliare missima a cortice peruviano non corrigi.

41) Sic et GASTRELLER (l. c. p. 363.) profitetur.

42) ALLIONI l. c. p. 189.

43) ANT. DE AUOUSTINIS (l. c. p. 72.) in epidemica miliarium constitutione 1755. opium ad vigiliis adhibitum nocuisse refert.

44) „Neque convulsiones, cum pendeant ex nervorum cutis irritatione, tanquam ex spina cuti infixae, opii auxilio tolluntur.“ (ALLIONI l. c. p. 190).

45) „Ut autem antispasmodicorum virtuti nihil obster, opus erit, ut primarum viarum, ab excrementis crassioribus, ibi forsan coacervatis, fiat evacuatio et succedens abstersio.“ (FISCHER l. c. p. 81).

46) Ad diarrhoeam miliarium comitem cohibendam, prae aliis parvas radices *rhei* doses jam commendat FISCHER (l. c. p. 101).

47) Cap. V. §. XXXI. No. 40.

scripsimus; praescripserunt alii ⁴⁸⁾. Maxime nobis pulvis *Doveri* profuit. Opium enim hic correctivo indigere jam dudum intellectum est ⁴⁹⁾. Alias et mitissima narcotica effectum exerunt ⁵⁰⁾.

7. Quodsi validissima hucusque recensita Continuatio argu-
auxilia febribus nervosis, quatenus miliaribus menti.
stipantur, non quadrant, quoniam, bone Deus, illis demum pharmaca quadrabunt? Nulla, si specifica indiscriminatim adhibenda expetis, plurima, si juxta indicationes speciales tibi incedere proponis. Praesto enim sunt *vinum* ⁵¹⁾, *serpentaria* ⁵²⁾, *camphora* ⁵³⁾, praecipue *moschus* ⁵⁴⁾, alia-

48) MOLINARIUS l. c.

49) „Si theriaca aut alia opiata usurpanda viderentur, opportune id fit post apposita vesicatoria, quas parvos opiatorum effectus inhibent.“ (HAMILTON l. c. p. 100).

50) DE AUGUSTINIS (l. c.) refert, emulsa ex seminibus papaveris vigilias, convulsiones, deliria et inquietudines in epidemia sua miliari sedasse.

51) „Vinum non oligophorum, sed probum, vinosum, lymphatum et saccharatum, in juseuli forma interdum praebetur.“ (FISCHER l. c. p. 94). — „Quando vires dejectae sunt . . . apud nos vini aliquid largiri in usu est, et vere nil praestantius vires erigit.“ (BURSERIUS l. c. §. 442).

52) GASTELLIER l. c. p. 363.

53) DE AUGUSTINIS (l. c. p. 69. 70.), GASTELLIER (l. c. p. 362.), BURSERIUS (l. c.) *camphorae* hic non favent; ego illius *auram* pluries cum fructu adhibui, dum cutis erat subfrigida, pulsus mollis, viresque dejectae.

54) „Pluries *moschum* adhibui cum magna utilitate; meam ego ipse vitam hoc remedio bis servavi.“ (AL-

aliaque⁵⁵⁾, sub fisdem rerum positionibus, ut in tractatu de febribus nervosis docuimus⁵⁶⁾, adhibenda.

Finis ar-
gumenti.

8. Ex tractatibus *pestis, typhi, puerperii* etc. palam fiet, miliarium istis in morbis praesentiam, nil respectu indicationum therapeuticarum immutare. Concludere mehercle inde licet, non juxta miliaria sed juxta morborum, quem concomitantur, curandum esse⁵⁷⁾. Quodsi hoc argumentum, tanquam testimonium naturae symptomaticae miliarium, ea de causa admitti nequeat, quod exanthemata primaria e. c. variolae, morbilli

tionis l. c. p. 143. not.). Celeberrimus quondam in febribus miliaribus erat pulvis *Touquinensis* (VOGEL in acad. praelect. §. 141.). En formulam: R. Moschi optimi grana sedecim. Cinabaris nativi, coccinellae 33 grana viginti quatuor. M. f. pulvis, dandus pro una dosi, aut in duas dividendus.

55) Ne iterum dicam de vesicatoriis, — pulvis bezoardicus (BURSERIUS l. c.), crocus, essentia succini, spiritus cornu cervi. (HAMILTON l. c. p. 97.) etc.

56) Cap. V. §. XXXI.

57) Pulchre S. G. VOGEL (l. c. p. 395.): „Man behandelt die Krankheit (*Friesel*) bald als ein entzündliches, bald als ein gastrisches, bald als ein fauliges, bald als ein Nervenfieber u. s. w. Man sieht auf epidemische Constitution, auf die individuelle Beschaffenheit des Körpers, auf das *juvans* und *nocens*, auf das Stadium der Krankheit, auf die Verwicklung, auf die dringendsten Symptome u. s. w. Man bekümmert sich um den Ausschlag, in Absicht seines Aussehens, seiner Menge u. s. w. selbst wenig.“

billi et scarlatina, juxta indolem febriſ curari debent; docet id ſaltem, praxin medicam minus detrimenti accepturam, ſi pathologi exanthemata, quot quot ſunt, pro ſymptomaticis declararint, quam ſi exanthematum primariorum numerum praeter neceſſitatem auxerint.

9. *Miliaria retrogreſſa* juxta praecepta generalia⁵⁸⁾ curanda. Quum cauſa retroceſſus varia ſit, varia quoque, pro re nata eſt therapia. Accomodetur potiſſimum oportet conditioni viſcerum inde affectorum et virium vitalium; ubi erroris in diaeta cauſa vitium gastricum — *emetica* aut *purgantia*; ubi culpâ refrigerii genuina viſceris phlogosis — *methodus antiphlogiſtica*, deindeque *diapnoica*; ubi ex morbo vel e nimis evacuationibus virium vitalium languor — pro re nata *vesicatoria*, *camphora*, *moſchus*, *ſpiritus cornu cervi*, *vinum*, *ſerum lactis vinosum*, *pulvis Doveri* etc.; ubi per animi pathema ſpaſmi — ſub febre vehementi, *pulvis antispasmodicus ruber Stahl*i, — aliàs gutta una alterave *laudani liquidi Sydenhami*. Cutis frictiones dummodo moderatae, ſinapiſmi et fomenta⁵⁹⁾ nullibi nocent.

58) Cap. VI. §. XXXVIII. No. 13.

59) „Eo tempore, quo ſudor diſparet, et cutis praecallida redditur, nil utilius obſervavi ſotu per lintea callida et humida convenienter adminiſtrato, et involventia brachia et tibias, quibus ſudor et exanthematum elatio alliciuntur.“ (ALLIONI L. c. p. 183).

bunt. Balnea tepida⁶⁰⁾ nemini commendabimus⁶¹⁾.

CAPUT IX.

D e b u l l i s.

§. LI.

Definitio. Historia.

Definitio. 4. *Bullas*¹⁾ nuncupamus vesicas magnitudinis

60) *Journ. de méd. Avril 1787.* — GOSSET v. HUFFLAND's *Annalen der französ. Literatur.* 2. B. p. 333.

61) „Balnea tepida utilia dicuntur fuisse; tempestate calida fortasse id fieri poterit. Quae ipse vidi experimenta, votis non responderunt; maxime enim sensilis cutis est eo in statu, et ex leviuscula aura depressio pustularum multum cietur.“ (ALLIONI l. c.).

1) *Synon.* Febris bullosa, febris ampullosa, morbus bullosus, febris vesicularis, febris pemphigodes seu pemphingodes; pemphigus, pemphix, pemphigus acutus, pyreticus, affectus pustularis pruriginosus, affectus pustularis scorbuticus, febris synocha cum vesiculis; synochos vesicularis. GERM. *Blasenfieber, Blasenkrankheit, Heidenpocken.* BELG. *Bleinuitslag.* DAN. *Blaerefeber.* SUEC. *Blädderpest.* ANGL. *Bullous fever, Vesicular fever, Bladdery fever, Vesicular eruption, Fire bladders.* GALL. *Fièvre vésiculaire, pemphigus pyrétiqne, pemphigus apyrétique; maladie vésiculaire, fièvre pemphigode.* ITAL. *Penfigo; febbre flittenoide.* HISP. *Burbuja.* LUSIT. *Febre com borbulhas.*

nis circiter amygdalarum, plerumque sero flavescente repletas, in nonnullis morbis febrilibus erumpentes.

2. De febre, bullis stipata, jam apud HIP. Historia. POCRATEM legitur²⁾; at divi senis verba interpretari est arduum³⁾. Nec facilior est interpretatio locorum huc verosimiliter spectantium in operibus CELSI⁴⁾, AETII⁵⁾ et RHazes⁶⁾. Major quodammodo lux ex FERNELIO⁷⁾ et SCHENKIO⁸⁾ affulget. Primus autem qui de bullis sub nomine *hydatidum*, exacte scripsit, est CAROLUS PRISO⁹⁾. Earum quoque obiter meminit MORTON, de febre sporadica, cum *vesiculis aqueis* per collum et pectus sparsis, loquens¹⁰⁾. Absolutam bullarum descriptionem THIERY¹¹⁾ et LANGHANS¹²⁾ dederunt; quorum ille epidemiam a 1736 in exercitu Gallo-

rum

2) In sexto epidem. libro. Sect. I.

3) Vid. edit. Hippocr. CHARENTI T. IX. p. 38. et FOESSI oecon. Hipp. p. 297.

4) De re medica. Lib. V. cap. 28.

5) Tetrab. IV. serm. III. cap. 62. p. 807. edit. Basil. fol. 1542.

6) Lib. XXVII. Tract. 7. T. II. fol. 319. Venet. fol. 1542.

7) Univera. med. Lib. VII. cap. 4. p. 324. edit. Paris. fol. 1567.

8) Obs. med. rarior. Lib. VI. obs. 121.

9) De morbis a serosa colluvie et diluvie ortis. Obs. 149.

10) Appendix secundae exercitationis. p. 163. Opp. omnia. Genevae 1727.

11) *Médecine expérimentale*. p. 134. Paris 1755.

12) Acta Helvetica. T. II. p. 260.

rum *Pragae* regnantem, — hic epidemiam, *Helvetiam* depopulantem, descripsit. Maxime medicorum attentionem ad bullas traxit SAUVAGES¹³⁾. *Pemphigi*¹⁴⁾ iis nomen imposuit, quod dein plurimi de bullis scriptores ita adoptarunt, ut modo arduum foret, literaturam febris bullosae, utpote morbi acuti, ab illa pemphigi, utpote morbi chronici, separare. De utroque morbo legantur: CHR. SELIGER¹⁵⁾, J. FR. FÜRSTENAU¹⁶⁾, O. F. W. FRENZEL¹⁷⁾, GOELICKE¹⁸⁾, JUNKER¹⁹⁾, D. STEWART²⁰⁾, SCHRÖDER²¹⁾, S. DICKSON²²⁾, SIMONS²³⁾, FEICHTMAYER²⁴⁾,

13) Nosol. cl. III. ord. I. gen. 3.

14) Ἄ ΓΝ. πύμφιξ, bulla, seu vesica.

15) De febre pemphigode sive bullosa. (Miscell. acad. nat. cur. Dec. I. a. 8. 1677. p. 93).

16) Febris acuta vesiculoso-erysipelacea. (Acta acad. nat. cur. Vol. 9. p. 57).

17) De peculiari quadam febris malignae catarrhalis exanthematicae, purpuraceo-pustularis specie, vesicali ulcerosa. (Acta acad. nat. cur. Vol. 10. p. 260).

18) Diss. observationes aliquot practicae circa febrem vesicularem. Francf. 1782.

19) Diss. conspectus pathologiae medicae de pemphigo.

20) DUNCAN medical comment. Vol. VI. a. 1778.

21) Historia febris bilioso-pituitoso-putridae, quae ab initio Decembris 1783. in variis Hassiae regionibus epidemice grassata est.

22) Transactions of the R. Irish Academ. Vol. I. Dublin 1787. Et Samml. auserlesener Abhandlungen für prakt. Aerzte. 13. B. p. 133.

23) London medical Journal. 1788. p. 310.

MAYER²⁴), SALABERT²⁵), J. E. WICHMANN²⁶),
RING²⁷), BLAGDEN²⁸), BRAUNE²⁹), BURGMANN³⁰),
L. HOLLBERG³¹), J. UPTON³²), HALL³³), MICHAEL-
LIS³⁴), GARN³⁵), HENNING³⁶), W. GAITSKELL³⁷),
N. VALLOT³⁸), JACQUEMIN³⁹), CHRISTIE⁴⁰), CON-
RADT⁴¹),

- 24) HUFELAND's *Journ. der prakt. Heilk.* 10. B. 3. St. p. 97. — 11. B. 4. St. p. 139.
- 25) *Journ. de méd.* Vol. 72. a. 1790. p. 66. Et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* l. c. p. 544.
- 26) *Beytrag zur Kenntniss. des Pemphigus.* Frf. 1791.
- 27) *London medical Journ.* Vol. II. Part. 3. p. 234. Et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* l. c. p. 624.
- 28) *Medical facts.* Vol. I. p. 105. Et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 14. B. p. 673.
- 29) *Versuch über den Pemphigus und das Blasenfieber.* Leipz. 1795. — *Ueber die Erkenntniss u. Behandlung des Pemphigus.* Freib. 1823.
- 30) *Diss. de febre bullosa et pemphigo.* Gött. 1796. 4.
- 31) *Casus pemphigi.* *Svenska Vetensk. Acad. Nya Handl.* A. 1797. p. 310.
- 32) *Case of pemphigus.* *Mem. of the med. soc. of London.* Vol. 3. p. 532.
- 33) *Transactions of medicine for the year 1798.* by DUNCAN. Vol. 3. p. 386. Et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 18. B. p. 483. *Medical records and researches.* p. 283. Et *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 192.
- 34) HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 3. B. p. 187.
- 35) *Ibid.* 6. B. p. 359.
- 36) *Ibid.* 21. B. p. 121.
- 37) *History of a case of Pemphigus.* (*Mem. of the med. soc. of London.* Vol. 4. p. 1).
- 38) *Observation sur le pemphigus ou la fièvre vésiculaire.*

RADT⁴¹⁾, CH. BOBBA⁴²⁾, CONSERUCH⁴³⁾, BRÜCKMANN⁴⁴⁾, SAVARY⁴⁵⁾, HÉBREART⁴⁶⁾, J. MOUTON⁴⁷⁾, ROBERT⁴⁸⁾, KRAFT⁴⁹⁾, S. GILIBERT⁵⁰⁾, RIDAULT DE VILLIERS⁵¹⁾, BRACHET⁵²⁾, WANT⁵³⁾, A. MORASCHIK⁵⁴⁾ et W. A. HAASE⁵⁵⁾.

§. LII.

(SEDILLOT *recueil period. de la société de méd. de Paris*. T. 4. p. 292).

- 39) *Observation sur une maladie singulière de la peau (pemphigus)*. Ibid. T. 30. p. 264.
- 40) *London med. Journ.* Vol. 10. Part. 4. p. 36. Et *Samml. auserl. Abh. f. pr. Aerzte*. l. c. p. 491.
- 41) *Diss. affectus cutanei rarioris historia*. Regiom. 1800.
- 42) *Mémoire sur le pemphigus ou exanthème vésiculaire*. Stuttg. 1802.
- 43) *HUFELAND's Journ. der prakt. Heilk.* 27. B. 1. St. p. 108.
- 44) *HORN's Archiv für med. Erfahrung*. 1811. p. 62.
- 45) *Journ. de médecins*. Vol. 22. Septembre 1811. p. 203.
- 46) *Observations sur le pemphigus* (SEDILLOT *rec. périodique de la société de méd. de Paris*. T. 43. p. 376).
- 47) *Observations sur une maladie vésiculaire; et réflexions sur cette observation*. Ibid. T. 43. p. 41. 45.
- 48) *Journ. de méd. par CORVISART etc.* 1812. Mars p. 227 sq. Juin p. 107. Juillet p. 209. Août p. 322.
- 49) *Pemphigus. Zur Bereicherung der Diagnostik*. (HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 37. B. 1. St. p. 95).
- 50) *Monographie du pemphigus, ou traité de la maladie vésiculaire*. Paris 1813.
- 51) *Recherches et observations sur le pemphigus, son hist. et sa synonymie*. (*Journ. génér. de méd.* T. LIV. p. 3).
- 52) *Observations sur le pemphigus*. (Ibid. T. LX).
- 53) *The medical and physical journal, conducted by FOTHERGILL*. London 1814. April.

§. LII.

Symptomata. Causae.

1. Bullae quidem absque certis symptomati-
 bus *prodromis*¹⁾, nullae determinata morbi die²⁾
 erumpunt, plerumque tamen aeger in loco, quo
 eruptio imminet, de dolore conqueritur. Accedit
 levis cutis rubor, sat late diffusus, aliquando sub-
 lividus, cui *eruptio* bullarum, ut plurimum celer-
 rime, hinc inde postridie tantum, succedit. Bul-
 lae, ab initio, saepissime pisi magnitudine cer-
 nuntur; maxima autem earum pars rapide ad vo-
 lumen circiter amygdalarum increscit. Minores
 nucis avellanae, et majores nucis moschatae in-
 star, nunquam vero ampliores, conspeximus, con-
 spexerunt alii. Serum fere semper flavescens, in-
 odoratum continent. Bullas tamen, liquore puri-
 formi repletas, vidimus. Ex serosis eae cruentae
 et ichorosae factae sunt apud STEWART. Absoluto

Sympto-
mata.

eru-

54) Diss. de pemphigo. Viennae 1815.

55) Ueber den chronischen Blasenausschlag oder die chro-
 nische Blasenkrankheit. (Zeitschrift für Natur- u. Heil-
 kunde. 1. B. 3. Heft. Dresden 1819—1820.).

1) Praecessisse bullas sitim, pectoris et praecordiorum
 oppressionem (REIZ memorabilia clinica. Vol. I. Fasc.
 2. p. 117.) et dysuriam (SALABERT et SAVARSKY)
 narrant.

2) Omni jure DICKSON opinionem CULLENII, qui perio-
 dum eruptionis inter primum et tertium diem morbi
 collocavit, improbat. Bullas decimo sexto morbi die
 comparuisse vidi, atque URTON febrem eruptionem
 secutam esse adnotat.

Frank Prax. I. 1. 2.

Dd

eruptionis opere, pruritus et cutis rubor evanescent, excepto interdum halone rubro, sat diu bullas ambiente. Nulli quidem corporis parti bullae parcent; saepissime tamen crura sibi eligunt; frequenter pectus; collum et brachia, nonnunquam, ut observavimus, dorsum, alias genas, frontem, partem capillatam capitis³⁾, orificium meatus auditorii⁴⁾, orisque cavum⁵⁾ adoriuntur. Imo, faucium dolor et diarrhoea cruenta, quibus aegri bullis affecti hinc inde laborant, exanthema hujusmodi tunc vel oesophagum cum reliquo tubo intestinali occupare verisimile reddunt. Suspicio haec quodammodo ab observationibus UPTONI et ROBERTI confirmatur⁶⁾. *Copia* bullarum aliquando exigua est et tantum ad octo, decem, quatuordecim vesiculas extenditur; alias longe hunc numerum, quin tamen eae inter se confluant, excedit. Saepe in decursu morbi nihil immutat bullarum adparitio, nonnunquam cuncta inde symptomata vel augentur, vel imminuuntur, vel evanescent. Exanthema hoc non diu, et raro ultra nychthemera formam descriptam retinet. Enim vero saepe bullae, tum ex aegri decubitu, tum sponte, rumpuntur, vel resorpto sero, relinquuntur vacuae. Quocunque in casu, cuticula, quae circumferentiam bullae prius effecerat, flaccida reddi-

3) BLAGDEN l. c. 4) HALL l. c.

5) BLAGDEN, LANGHANS et DICKSON ll. cc.

6) ll. cc.

redditur, atque sensim sensimque corrugatur, relictæ basi, instar carnis crudæ, rubra vel exsiccatura, vel tenuissima obscuraque crusta cooperienda. Quo tempore primæ bullæ evanescent, erumpunt novæ, atque ita res plures per dies, ne dicamus unam alteramve per hebdomadem, contingunt.

2. Infantes, juvenes, et feminae⁷⁾, bullis Causæ. præcipue subjiciuntur. Eas connatas viderunt P. LEDEL⁸⁾, OSIANDER⁹⁾, vel quarto a nativitate die erumpentes RING. Casum febris biliosæ pusionis novem mensium, dentibus adhuc orbat, ipsi vidimus¹⁰⁾. MICHAELIS infantis sex mensium, ubera

D d 2

ma-

7) PELARGUS *med. Jahrgänge*. 1. Jahrg. p. 20. 2. Jahrg. p. 436. Memorabile porro exemplum febris bullosæ, inter foenifices sexus duntaxat sequioris erumpentis, describitur ab EV. DANIEL in *the London medical repository*. Vol. VI. Octob.

8) Vesiculæ serosæ in foetu (totum corpusculum vesiculis copiosis, serosa lymphæ refertis, erat notatum, a matre generationis tempore in dies fere ebria). *Miscell. acad. nat. cur. Dec. 2. a. 2. 1683. p. 63.*

9) *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde u. Geburtshülfe.*

10) Vilnæ. Hic infans die 7. Aprilis 1815. derepente febre correptus est, cum alvo viridi et urina pauca. Die 8. Aprilis, ad latus thoracis dextrum et sub axilla sinistra, rubores comparuere, quos mox vesiculæ magnitudinis amygdalarum, instar illarum, quæ vesicatoriis excitari solent, subsequuntur sunt. Hisce vesiculis sponte disruptis, serum effluxit acre. Accessit paullo post simpla ecchymosis, epidermide simul, ut

matris, herpete faciei detentae, eugentis ac bullis adfecti meminit. Hae apud GARN variolas, et apud STEWART morbillos prope secutae sunt. Ut plurimum vero bullae morbos febriles ex inedia, ex humorum jactura et ex contagio comitantur¹¹⁾. Ipsas igitur bullas, quamvis contagio destitutas ac nequidem per insitionem communicandas¹²⁾, pro contagiosis declaratas fuisse, non mirum est.

§. LIII.

in gangraena, secedente. Die 9. novae vesicae, pemphigo omnino similes, ad dorsum, brachium, palmarumque manus sinistrae erupuerunt. Febria interea continuabat. Aegrotulus ubera respuebat, faciem exhibuit luridam et vix guttam lotii emittebat. Nullus tamen in regione vesicae urinariae tumor animadvertitur. Post paucas horas obiit.

11) Magna inedia laborabat exercitus Gallorum tempore epidemiae supra allatae. Aegri SAUVAGESII bullis affecti, erant milites egeni et mendicantes. Aegra HENRINNOIR ergastulo inclusa erat. Proprii aegri omnes nosocomiales fuerunt, à nonnulli nimis venae sectionibus exhausti.

12) „Mr. HUSON a inoculé à cinq enfans la matière des vésicules de deux pemphigus, et les piqûres se sont promptement effacées sans donner lieu à la formation d'aucune vésicule (Recherches historiques et médicales sur la vaccine, troisième édition page 144). Mr. MARTIN, auteur d'une observation sur la complication du pemphigus et de la vaccine, dit, qu'on inocula la matière des vésicules à plusieurs enfans sans qu'il en résultât aucune éruption (Journ. de médecine, chirurgie et pharmacie. t. 2. p. 225). Ainsi donc le pemphigus n'est point contagieux, et les faits qu'on voudroit citer en faveur de

§. LIII.

D i a g n o s i s.

1. Bullae confundi possunt: cum *vesicis acetalibus*, cum *miliaribus*, cum *erysipelato pustuloso*¹⁾, cum *carbunculo*²⁾, cum *variolis abnormibus*, cum *varicella*³⁾, cum *zostere*, cum *hydroa* et cum *pemphigo*⁴⁾.

Facilis
confusio.

2. Ac.

L'opinion contraire, prouvent seulement, qu'il peut s'associer quelquesfois avec des maladies contagieuses, telles que le typhus, ou bien seulement avec des maladies épidémiques, telles que la fièvre bilieuse." (GILIBERT et MONTFALCON in *Dictionnaire des sciences médicales*. T. 40. art. *Pemphigus*).

1) Sic plurimi immerito ad bullas referunt casum de *erysipelate vesiculoso faciei totius*, quem J. W. GULDENBRAND in observationibus de *erysipelate* in act. Reg. soc. med. Hafniensis. Vol. I. p. 142. insertis, enarrat. Alii in eundem errorem respectu ad vesiculas, quae *erysipelas oedematodes hydropicorum* comitantur, includunt. (*Dict. des sciences médicales* l. c. p. 151).

2) Verosimiliter ad carbunculos potius pertinent bullae ex anatome *porcorum*, anginā gangraenosā demortuorum, de quibus BUSCH in BALDINOER's *neuem Magaz.* 10. B. p. 230. — Item illae in aegro *macellarii officio* fungente ortae, de quibus HENNING in HUFELAND's *Journal* 1813. Sept. p. 89 sq.

3) Sic dictas bullas, quae proxime sequuntur aut *variolas* (GARN l. c. — HUFELAND *Bemerkungen über die natürlichen u. inoculirten Blattern.* 3. Aufl. Berlin 1798. — CULLEN's *Anfangsgründe u. s. w.* 3. Ausg. 2. B. p. 219. in der *Anmerk. des Uebers.*) aut *vaccinam* (BREMER in HUFELAND's *Journal* 1815. Mai. p. 93. — *Medicinisch - chirurgische Zeitung.* 25. *Ergänzungsband.*

Distinctio
a vesicis
accidentali-
bus.

2. Accidit interdum, ut aegri, sive delirantes, sive soporosi, loca vesicatoriis occupata digitis scalpant, atque hos, cantharidibus conspurcatos, aliis cutis partibus admoveant, qua ratione, ut *vesicae* oriantur, *bullis* plane similes, contingit. Caveri igitur oportet, ne hae pro symptomate morbi habeantur.

Distinctio
a miliari-
bus.

3. Maxima illa *miliaria*, de quibus fasti medici loquuntur, proprie ad *bullas* pertinuisse, jam monuimus⁵⁾; cui errandi occasione sequentem hic utriusque exanthematis comparisonem opponimus.

Miliaria.

a. Symptomata *prodroma* fere constantia agnoscunt.

Bullae.

a. Symptomatibus *prodromis* certis destituntur, ac nunquam copioso et specifico sudore praecedunt.

b. Mor-

1822. No. 642. — WOLFF junior, in: *Magazin der auel. Literatur der gesammten Heilk.* Hamburg 1823. p. 245.), potius ad haec exanthemata spectare existimo.

4) Quum morbus vesicularis de quo tractatur, dum acute decurrit, omnino ab illo, cui curriculum chronicum competit, differat, placuit WICHMANN illi nomen *bullarum* imponere, hunc nomine graeco *pemphigi* salutare. Multum isti morbos denominandi rationi obiecti sane posset! Interea, quum jam recepta sit, eam retinemus.

5) Cap. praeced. §. XLVI. No. 3.

- | | |
|---|---|
| b. Morbus puerperis familiaris. | b. Unum solummodo exemplum in puerperis habemus ⁶⁾ . |
| c. Raro in infantibus locum obtinent. | c. Saepius in aetate infantili obveniunt. |
| d. Eruptio solummodo pruritu annuntiari solet. | d. Eruptio dolore ardente plerumque praesagitur. |
| e. Efflorescunt ut plurimum ad latera colli, ad pectus etc. | e. Efflorescunt ut plurimum ad crura. |
| f. Saepe papulas referunt. | f. Constanter vesiculas exhibent. |
| g. Maximum volumen illud lentum est. | g. Minimum volumen illud amygdalarum vel pisi majoris est. |
| h. Colore sive rubro, sive albo, sive mixto instruuntur. | h. Colorem flavum, fere aurantiacum referunt. |
| i. Facile retrocedunt. | i. Nullum retrocessus exemplum habetur. |

4. Bullae societatem inire solent cum febribus ^{B. exanthema} intermittentibus, cum gastricis et nervosis, nec ^{symptomaticum.} non cum arthritide, peripneumonia et dysenteria.

5. Bullas a febribus intermittendis haud alienas esse jam PISO observavit, bisque eas in tertiana duplici vidit BRAUNE. Nunquam vestigium earum

6) FICK diss. de febre vesiculari ab obstructione loquiorum. Jenae 1726.

earum hic deteximus, ac suspicamur, *hydroa*, febribus intermittentibus familiare, cum bullis confusum fuisse.

B. in febre gastrica.

6. In *febris gastricis* bullas viderunt SCHRODER, FINKE⁷⁾ et CHRISTIE. Neque complicationem inflammatoriam hic respuunt, testante SALBERT.

B. in febre nervosa, peste et typho.

7. Bullae prae aliis morbis in *febris nervosis*⁸⁾, in *peste* et in *typho* obveniunt. Huc epidemiae a THIERY et LANGHANS descriptae et casus a SELLE⁹⁾ nec non a nobis observati, pertinent.

B. in arthritide.

8. In *arthritide* inopinate bullae oriebantur, cum tumore oedematoso totius corporis, pustulis magnis, ubique dispersis, sero puriformi repletis, cum delirio perpetuo, sudore profuso, excrementis involuntariis et eventu inter triduum funesto¹⁰⁾.

B. in peripneumonia.

9. Binis in *peripneumoniis* nos ipsi bullas conspeximus. Unus aegrorum antehac hepatitide laborabat, quod bullarum exemplum memorabile apud J. P. FRANK legi meretur¹¹⁾.

B. in dysenteria.

10. De bullis, in *dysenteria* obvenientibus, exempla collegerunt BONTIUS¹²⁾, RENGIER¹³⁾ aliique¹⁴⁾.

§. LIV.

7) De morbo bilioso anomalo. p. 110.

8) HUTELAND's *Bemerkungen über das Nervenfieber*. 1799.

9) *Beiträge*. 1. *Thl.* p. 100.

10) *Acta soc. med. R. Hafniensis*. Vol. I. p. 8.

11) *Epitom.* I. c. p. 265.

12) *De medicina Indorum*. p. 38.

§. LIV.

Prognosis. Cura.

1. *Prognosis* bullarum ex indole morbi pri-*Prognosis.*
marii desumendam esse, per se patet. Eas semel
criticas vidimus, viditque SALABERT. Infantes
facillime morbum perferre dicuntur; contraria
habemus exempla. De summo periculo bullae in
peste et typho testantur.

2. *Cura* bullarum morbo primario prorsus ac- *Cura.*
commodanda est. Infantes plerumque sine phar-
macis a bullis liberantur. Praesente magna virium
jactura, *cortex cinchonae officinalis* et *vinum* uno
ore celebrari solent. Imo MACBRIDE singulos in-
fantes bullis affectos in Hibernia mortuos vidit,
quibus cortex non fuerit porrectus. In epidemia
Pragensi *acetum bezoarticum* optime conduxit.
Vigente diathesi gastrica, bullae ea potissime al-
vum evacuantia exposcunt, quae simul transpira-
tionis officium promovent. Si natura peripneu-
moniae, bullis stipatae, venae sectionem expete-
ret, ea non obstante exanthemate, instituenda
foret. Quocunque in morbo bullae compareant,
secretionis urinae ratio habenda est. Bullae ipsae,
quas aperiri nil vetat, nullis indigent remediis
localibus *).

CAPUT

13) *Beobachtungen eines mit der Ruhr verbundenen Pem-
phigus.* V. *Museum der Heilkunde.* 2. B. p. 102.

14) LIND *ibid.* 4. B. p. 226.

*) „La meilleure manière de traiter l'exanthème pemphi-

CAPUT X.

De urticaria.

§. LV.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. **M**aculae, aut tubercula, citissime prorumpentia, summe prurientia, basi inaequali, ac si cutis urticis caesa fuisset, instructa, sub frigore, plerumque evidentiora, fugacia, cum febre, *urticariam*¹⁾ constituunt.

Historia. 2. **C**ELsus obiter, morbi cutanei sub nomine *aspritudinis* meminit, iis pustulis, quae ex urtica (vel ex sudore) nascuntur, similis²⁾. Longe clarius

goûde est de n'y point toucher. Tous les soins de l'art dans le pemphigus simple simultané, consistent bien moins à donner des remèdes qu'à régler convenablement le régime, et préserver les malades de tout-ce qui pourroit être nuisible." (Dict. des sciences médic. l. c. p. 159).

1) *Synon.* Febris urticata, uredo, scarlatina urticata, purpura urticata, febris rubra pruriginosa, essera sora, morbus porcinus. **GERM.** Nesselausschlag, Nesselfieber, Nesselsucht, Porzellan-Fieber, Wiebelsucht, Säusucht. **BELO.** Brandnetelkoorts, Netelzugt, Netelkoorts. **DAN.** Naeldeseber, Naeldesot. **SUEO.** Näselfeber, Nässling. **ANGL.** Nettle-rash. **GALL.** Fièvre ortiée. **ITAL.** Ortigaria. **HISP.** Ortigaria. **LUSIT.** Ortigaria. **ROSS.** Крапивная сыпь. **POL.** Pokrzywka.

2) *Medicina Lib. I. cap. XXVIII. 15.*

rius SYDENHAM urticariam, quo loco *de altera febris erysipelatosae speciei* locutus est, descripsit³⁾. Ita quoque SENNERTUS, qui nomina arabica *esserae, sorae*, retinuit⁴⁾. Serius idem exanthema apud varios auctores, ut monuimus, sub nominibus *purpurae urticae*⁵⁾, *febris urticae*⁶⁾, *porcellanae*⁷⁾, *scarlatinae urticae*⁸⁾ etc. obvenit. Optimi de eo scriptores sunt: CHEMNIZ⁹⁾, ALBERTI¹⁰⁾, CRAMER¹¹⁾, LOCHNER¹²⁾, SAALMANN¹³⁾, HEBERDEN¹⁴⁾, VOGEL¹⁵⁾, WICHMANN¹⁶⁾, J. P. FRANK¹⁷⁾ et KOCH¹⁸⁾.

§. LVI.

- 3) Opp. Sect. VI. cap. 6.
- 4) Med. Praxis. Lib. V. P. I. cap. 26.
- 5) JUNKER Tab. 75.
- 6) VOGEL de cognoscendis et curandis etc. §. 158.
- 7) LIEUTAUD Synops. med. T. I. Lib. I. Sect. 4.
- 8) SAUVAGES Nosologia. cl. 3. ord. I. gen. 8. spec. 2.
- 9) Diss. de essera Arabum. Hafn. 1703.
- 10) Diss. de purpura urtica. Hal. 1719.
- 11) Diss. de purpurae urticae et scarlatinae febris convenientia ac discrimine. Hal. 1759.
- 12) De nova purpurae specie, *Nesselsucht* dicta; an aspreto Celsi, vel uredo Plinii, et urigo Vegetii et Apuleji? (Ephem. acad. nat. eur. cent. 5 et 6. p. 415).
- 13) Descriptio febris urticae. Monast. 1790.
- 14) Medical transactions. Vol. 2. Art. 11.
- 15) l. c.
- 16) Ideen zur Diagnostik. 3 Thl. p. 121.
- 17) Epit. Vol. III. p. 104. et praecipue: Interpretationes clinicae. Vol. I. p. 405. Tubingae 1812.
- 18) Progr. de febre urtica. Lips. 1792.

§. LVI.

*Symptomata. Causae.*Sympto-
mata.

1. *Urticaria symptomatibus prodromis*, pro varia febris indole diversis, non destituitur. In genere huc pertinent: lassitudo, torpor, capitis gravitas, vertigo, lipothymia, pectoris oppressio, nec non tussicula. Sunt, qui et sudores acidos inter symptomata prodroma hujusmodi exanthematis referant; vehementer tamen timemus, ne ii miliaria pro urticaria habuerint. *Eruptio* urticariae rapide et magno cum pruritu contingit. Pruritus perstante exanthemate continuat, et ad scrotum potissime in dolorem desinit. Urticaria praecipue ad pectus, brachia, femora, faciem et interdum vel ad reliquum corpus prodit. Kochius, cavitatem ipsam oris ab ea non immunem mansisse, refert, quod in femina in clinico Vilnensi decumbente observavimus, cui, vigente urticaria in universo corpore, *lingua* sub magno pruritu valde pere intumuit. *Forma* exanthematis varia est. Plerumque in *maculis* latis, interdum palmae magnitudinis, ad circumferentiam parumper prominentibus, in centro depressis, consistit. Alias maculae sunt, quasi inflicto cuti flagello. Utroque in casu, colorem ex pallido rubrum, in centro fere albescentem prae se ferunt (*Urticaria maculosa*). Nonnunquam descriptis vix maculis, praecipue latis, *papulae* vel *phlyctenae* insident (*U. papulosa* seu *phlyctenosa*). Tandem macularum prominentium

tium loco, interdum *tubercula*, nucis, quin imo palmae magnitudinis, excepto apice ex albo rubente, colore obscure rubro atque basi irregulari instructa, obveniunt (*U. tuberculosa*). Urticaria ut plurimum erratica et fugax animadvertitur. Sub frigore, paucis concessis exceptionibus, evidenter fit. Duratio admodum varia est. Plerumque, quin vestigium reliquat, evanescit. Rara enim exempla desquamationis, a KOCHIO animadversa, dicenda sunt.

2. Urticaria praeprimis in juvenibus et femi-
 nis, quolibet anni tempore, interdum et maxime
 atmosphaera electricitate abundante¹⁾, epidemice,
 occurrit. Communissima illius *caussa* in transpi-
 ratione suppressa locata est. Accedunt errores in
 diaeta, inprimis abusus liquorum fermentatorum
 et alimenta *qualitate* peccantia, vel ob peculiarem
idio-

- 1) Urticaria epidemice grassabatur Vilnae mense Junio a. 1815. quo tempore tempestates cum tonitru (quarum una, si fides habenda, lapides largiebatur) creberrimae erant. Et Vindobonae mense Julio 1825, dum atmosphaera electricitate maxime imbuta erat, frequenter urticaria obveniebat. Sed quod maxime nexum electricitatis cum urticaria demonstrare videtur, est exemplum puellae, mihi tempore supra determinato Vilnae visae. Haece fulminis ictu vehementer in uno corporis latere adusta, in febrem nervosam incidit, urticaria cutim altero in latere vehementer detinente.

idiosyncrasiam adversa. Sic urticariae a mytilis jam mentio injecta est²⁾. Testantur de eodem exanthemate (aliquando sub nomine erroneo *scarlatinae*), ab esu cancri fluviatilis et fragariae vescae GRUNER³⁾; — a carne suilla comesta SCHEIDEMANTEL⁴⁾; — ab aliis adhuc cibis WINTERBOTTOM⁵⁾, a copioso cioccolatae vel coffeae, quibus balsamus peruvianus admistus fuerat, potu KOCH⁶⁾. Nec animi pathemata, praecipue terror et ira⁷⁾, — nec pharmaca e. c. semina arthemisiae contra⁸⁾, valeriana⁹⁾, — oleum anisi¹⁰⁾, — nec aquae minerales¹¹⁾, — nec venena¹²⁾, hic excludenda sunt. De contagio autem vix suspicio occurrit.

§. LVII.

- 2) Cap. IV. §. XXI. No. 5. Vide et: MOHRING epist. ad WERLHOFFIUM in HALLERI collect. diss. pract. Vol. III. No. 88.
- 3) Programma de febre urticata a cancri fluviatilibus et fragariae vescae fructu. Jenae 1774.
- 4) *Fränkische Beyträge*. No. 35.
- 5) *Medical facts and observations*. Vol. V. No. 6.
- 6) l. c. p. 12.
- 7) Post iram plurima urticariae exempla numero.
- 8) WENDELSTÄDT in HUFELAND's und HIMLY's *Journ. der pr. Heilk.* 1813. Junius p. 61.
- 9) FRANK Epit. l. c. p. 111.
- 10) *Medic. chirurg. Zeitung*. 25. *Ergänzungsst.* No. 624. 1822.
- 11) Virum nosco, qui, quoties aqua Selterana mititur, toties urticariae obnoxius.
- 12) *Journ. de méd.* T. 37. p. 28.

§. LVII.

D i a g n o s i s.

1. Urticaria confundi potest: cum *maculis* sive *tuberculis* a *vegetabilibus* acribus et ab *insectis* nonnullis excitatis, cum *miliaribus rubris*, cum *erysipelate*, cum *furunculis*, cum *exanthemate mercuriali*, cum *scarlatina*, cum *morbillis*, cum *rubeola* et cum *urticatione*¹⁾. Facilis confusio.

2. Adspectu quidem conveniunt, sed plurimis urticariae characteribus destituuntur, *maculae* et *tubercula*, quibus *urtica dioica*, n. *stimulans* et n. *crenulata*²⁾, *rhus toxicodendron*³⁾, *cimex lectuarius*, *culex cyanopenis*, *c. lineatus*, *c. ferox*, *c. chloropterus*, *c. maculatus*, *cynops colutrans*⁴⁾ etc., aliaque vegetabilia et insecta, interdum setarum, pilorum subtilissimorum causa⁵⁾, Distinctio a maculis, tuberculis etc.

ansam

1) Sic WICHMANNO praecunte urticariam chronicam voco.

2) *Mémoires du muséum de l'histoire naturelle*, 3. année.

4. cahier. p. 359. (Dolor ab urtica crenulata, Calcuttae crescente, ortus, a manu laesa ad fossam axillarem usque propagatur; sequitur inde aternutatio effrenis et contractio maxillarum, quae per plures durat dies. Maximus est dolor, si manus affecta aquae immergatur).

3) WICHMANN vitium cutis, a rhus toxicodendro excitatum, immerito ad zosterem revocavit.

4) A. HUMBOLDT *voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent*. (Maxime advenis Europaeis insidias hoc insectum struit).

5) De vitio cutis, urticariae simili, a pilis subtilissimis

ansam porrigunt. Cave igitur, ne hujusmodi cutis vitia, prorsus localia, cum urticaria, utpote cum exanthemate, a morbosa conditione totius systematis pullulante, confundas.

Distinctio
a miliaribus rubris.

3. *Urticaria papulosa* adeo *miliaribus rubris* similis est, ut exanthemata haec nonnisi magnitudine papularum inter se invicem differre, opinatus fuerit SCHLACTIUS⁶⁾. Maxime inde suspicio nostra, exanthema, multis sudoribus stipatum ac pro urticaria habitum, ad miliaria pertinuisse, confirmatur. Error hujusmodi eo facilius committitur, cum utrumque exanthema plerumque anxietate annuncietur, verumtamen alio sub respectu inter se differt:

<i>Miliaria rubra.</i>	<i>Urticaria papulosa.</i>
a. Arcetur eruptio frigore.	a. Promovetur ut plurimum eruptio frigore.
b. Pruritus, si adsit, modicus est.	b. Pruritus semper magnus.
c. Eruptio plerumque per repetita conamina contingit.	c. Eruptio uno ictu et celerrime fit.
d. Cuti, colore haud mutatae, insident.	d. Papulae maculis prominentibus insident.

U. exanthema symptomaticum.

4. Urticariam exanthema sistere *symptomaticum*,

crucarum, et fabam quandam indicam (*couchage*) obducentium, testantur REAUMUR (*mém. sur les insectes*. T. 3.) et HEBERDEN (l. c. p. 135).

6) Institut. med. pract. XI. §. 6.

cum, observatio, quod illa in variis ac diversis inter se morbis obveniat, docet. Hujusmodi sunt: febres intermittentes, rheumaticae, gastricae et nervosae. Neque typhi, variolarum⁷⁾, morbillorum⁸⁾, ictori consortium, urticaria respuit.

5. Plurima exempla febrium intermittentium U. in febr. intermitt. tentibus. urticariâ stipatarum apud PLANCHON⁹⁾, CLEG-
HORN¹⁰⁾, KOCH¹¹⁾, et FRANK¹²⁾ occurrunt, vidimusque eorum permulta Ticini, mensibus Majo et Junio a. MDCCXCIV. et Vilnae, mensibus Martio et Aprili a. MDCCCXII. quibus scilicet temporibus febris intermittens urticata, fere epidemica fuit¹³⁾. Plerumque haec typum tertianae, sive simplicis, sive duplicis sequitur. Benignus morbus cum leni faucium inflammatione, ardore oculorum et tussi incipit; perniciosus vero saevè lumbagine, anxietate, jactatione, lipothymiis et singultu insignitur. Comparente exanthemate, symptomata hujusmodi ut plurimum evanescent. Comparet vero illud aut versus finem stadii frigoris, aut incipiente

7) WICHMANN l. c.

8) HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 13. B. 3. St. p. 39.

9) Journ. de médecine. Juillet 1765. p. 75.

10) Observ. of the epidemical diseases of Minorca. Lond. 1768.

11) l. c. p. 14.

12) Interpretationes clinicae. p. 413.

13) Et annis proxime sequentibus febris intermittens urticata Vilnae vernali quovis tempore grassabatur. Imo haec febrium intermittentium forma (aut cephalalgica) quotannis inter reliquas prima apparuit.

Frank Prax. I. 1. 2.

cupiente eo caloris, atque cum sudore evanescit. Sub ipsâ tamen apyrexia urticariam aliquando perstitisse observavimus.

U. in febr.
rheumati-
ca.

6. Frequentissime urticaria in *febris rheumaticis* observatur, imo in ea versamur opinione, *febrem urticariam* auctorum nil aliud esse, quam febrem rheumaticam, exanthemate urticato stipatam. Morbus cum refrigerationis sensu incipit, cui ille moderati caloris ac sitis succedunt. Pulsus febrem indicat, ac artus et abdomen interdum dolent. Urina saepe jumentosa est. Hinc inde alvus liquida, levisque nausea occurrunt. Accedit intolerabilis pruritus, quo vigente, primo, secundo, rarius tertio morbi die, urticaria, sub forma plerumque *maculosa*, erumpit. Nonnunquam febris vix aut ne vix quidem, saltem si ex pulsu iudices, observatur; alias febrilia symptomata, facta jam eruptione exanthematis, perfecte evolvuntur. Accidit interdum, ut cum KOCHIO vidimus, febrem omnibus quidem prodromis signis urticariae stipatam fuisse, in cute vero *nihil praeter pruritus vel acutissimae punctationis sensum* obvenisse. Adnotante eodem auctore, tunc saepe sensus aurae frigidae ex parte, in qua pruritus est, ad alia loca remota transit. Urticaria, ut diximus, plerumque sub temperatura frigida evidentior est, ac sub calida evanescit. Interea vel contraria cum HEEBARDENIO exempla observavimus. Quocunque in casu, evanescente pro tempore

pore exanthemate, saepissime anxietas, oppressio pectoris, aliquando vero lipothymiae imminens sensus, percipi solent. Quum exanthema quodvis peculiarem cum viscere quodam nexum habere soleat, habita ratione istiusmodi symptomatum, talem nexum inter *urticariam* et *cor* existere, suspicamur. Irrueretne istud exanthema ita in cor, uti irruit in linguam?

7. Praeviis causis gastricis, interdum vel post U. in febr. modicum pastum, aeger nausæ, vomituritione, gastricis. pytalismo, anxietate, aurium tinnitu, vertigine et intolerabili cutis pruritu, prehenditur. Post nonnullas horas febris, ab initio non semper fortis, accenditur. Citissime nunc *urticaria*, sive maculosa, sive papulosa, saepius vero *tuberosa*, variis in locis, praesertim ad faciem subtumidulam, ad jugulum, dorsum, et super brachia prorumpit. Adjuvante sive natura, sive arte, morbus spatio unius alteriusve nychthemeri feliciter absolvitur. Alias *urticaria*, plerumque maculosa et fugax, febres comitatur biliosas et praecipue bilioso-inflammatorias.

8. Nec desiderantur exempla *urticariae*, *fe-* U. in febr. *brem nervosam* comitantis. Vario morbi tempore nervosis. hoc exanthema, ad gangraenam tunc pronum, ut apud MONSEY¹⁴⁾, KOCH¹⁵⁾, FRANK¹⁶⁾ et LACHAUSSE¹⁷⁾ videre est, erumpit.

E e 2 §. LVIII.

14) *Medical transactions published by the college of physicians in London. Vol. I. p. 173.*

§. LVIII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Urticaria, in genere, leve ac benignum exanthema sistit. Hoc autem non impedit, quominus ab illius retrocessu ophthalmia, tussis, vomitus, animi deliquium, languores chronici, oedema*), dyspepsia diuturna et febres intermittentes larvatae successerint. Imo CLEGHORN de exitiosa metastasi, hac ex causa ad encephalon facta, testatur. Contra ea KOCHIVS pleuritidem illico sublatam ac febris nervosae symptomata, cum papulae urticae in cute efflorescerent, cito pacata observavit.

Cura. 2. *Febris intermittens urticata* instar aliarum febrium periodicarum curatur; saepe et hic stupendos *cinchonae* effectus conspeximus. In urticaria *febris rheumaticae* socia, methodus, simplicissimo hujus morbi gradui accommodata, adhibenda est. Quae *gastricam* agnoscit indolem, urticaria haec medendi methodum, febribus gastricis tum primariis, tum secundariis adaptatam, exposcit. Neque in cura *febrium nervosarum* urticae praesentia aliquid immutat.

CAPUT

15) l. c. p. 14. 16) l. c. p. 417.

17) *Journ. de médecine*. T. 37. p. 28.

*) Sic a. 1825 vidi Viennae in medico.

CAPUT XL

De erysipellate.

§. LIX.

Definitio. Historia. Momentum.

1. **Rubor**, per summam cutem, calentem, Definitio.
ardentem diffusus, per compressionem evanescens,
hac cessante citissime revertens, sedem facile mu-
tans, parte affectâ nunc levigatâ, nunc tumente,
nunc phlyctaenis aut pustulis obsessâ, sociâ saepe
febre, *erysipelas*¹⁾ dicitur, pro re natâ *levigatum*,
phlegmonosum, *phlyctaenosum*, *pustulosum*.

2. *Doctrina erysipelatis debetur*, inter anti-*Historia.*
quos, — HIPPOCRATI²⁾, GALENO³⁾, AETIO⁴⁾,

ALEXAN-

1) Ab ἰσχυρὴς ruber, et πῖλας prope, vel potius opi-
nante SWEDIAUR (op. c. Vol. I. p. 144.) a vocabulo
antiquo πῖλλας cutis. *Synon.* Epiphlogisma HIPPOCHA-
TIS; — febris erysipelatos SYDENHAMI; — febris
erysipelacea HOFFMANNI; — rosa SENNERTI; — em-
phlysis erysipelas MASON GODDIL. GERM. *Die Rose*,
der Rothlauf. GALL. *Erysipèle*. ANG. *Erysipelas*.
ITAL. *Erisipela*. ROSS. РОЖА. POLON. *Róza*.

2) Lib. III. epidem.

3) Method. med. ad Glaucon. lib. II. cap. I. CHARTER.
T. X. p. 368. 369.

4) Tetrab. IV. Sermon. 2. c. 59.

ALEXANDRO TRALLIANO⁵⁾ et PAULO AEGINETAE⁶⁾, interque recentiores — SENNERTO⁷⁾, SYDENHAMO⁸⁾, HEISTERO⁹⁾, FR. HOFFMANNO¹⁰⁾, CAROL. RICHA^{*)}, HAENIO¹¹⁾, SCHROEDERO¹²⁾ et RICHTERO¹³⁾. Accedunt alii de doctrina erysipelatis plus minusve benemeriti¹⁴⁾. Iluc praeterea spectant aucto-

5) Cent. II. Cur. 24. 6) Lib. IV. cap. 21.

7) De febr. Lib. II. c. 15.

8) *The entire Works*. 5. edit. Lond. 1769. Sect. VI. Ch. 6. *Of erysipelatous fever*. Et Misc. nat. cur. Dec. II. ann. 10. 1691. Append. p. 155.

9) *Medicinische, chirurgische u. anatomische Wahrnehmungen*. Rostock 1753. I. B. No. 658.

10) Med. Rat. Syst. Vol. IV. P. I. c. 13.

*) Constit. epidem. Taurin. altera. §. VIII.

11) Febr. Div. VI.

12) Diss. de febribus erysipelatosi. Goett. 1771. v. opuscul. Vol. I.

13) *Anfangsgründe der Fundarzneykunst*. Götting. 1784. Et: *Die specielle Therapie*. 2. B.

14) HEURNIUS diss. de erysipelate. Leid. 1596. — SCHOEN diss. de erysipelate. Basil. 1605. — BURMEISTER diss. de erysipelate. Ibid. 1615. — MOKOLINO diss. ἐρυσιπελαγυμνασία. Ibid. 1621. — SCHILLINO diss. de erysipelate seu rosa Germanorum. Lips. 1621. — KUEFFER diss. de erysipelate. Argent. 1640. — SLEGELIUS diss. de erysipelate, vulgo rosa. Jen. 1640. — MICHAELIS diss. de rosa, seu vero ac legitimo erysipelate. Lips. 1655. — METZGER diss. historia erysipelatis cum aliorum gravissimorum morborum satellitio. Tub. 1666. — SCHENCK diss. ordo et methodus scrutandi et curandi febrem erysipelatosam — rosam. Jen. 1666. — VEHR diss. de erysipe-

auctores therapiae specialis, imprimis BURSERIUS¹⁵⁾,

late. Altd. 1667. — SCHNEIDER diss. de erysipelate seu rosa. Witteb. 1668. — WINKLER diss. de erysipelate. Heidelb. 1679. — WEDEL diss. aeger erysipelate laborans. Jen. 1682. — DESSALI diss. de erysipelate. Leid. 1694. — MAPPA diss. de erysipelate. Argent. 1700. — ZABEL diss. de erysipelate. Lugd. Bat. 1717. — De PRÉ diss. de erysipelate, vulgo *Rothlaufen*. Erf. 1720. — JUCH diss. de inflammationibus erysipelaceis. Erf. 1732. — GOELICKE diss. de erysipelate. Fr. 1736. — RICHTER diss. de erysipelate. Gött. 1744. — LEANE MACLAUCHLIN diss. de erysipelate. Edinb. 1755. — AURIVILLIUS diss. de erysipelate. Upsal. 1762. — HERMANN diss. de rosa. Argent. 1762. — HOFFMANN diss. de volatica a. erysipelate volatico. Vienn. 1780. — HELLBACH diss. de erysipelate. Erf. 1780. — LUTHER diss. de erysipelate. Erf. 1780. — VAN DER BELEN diss. de erysipelate. Lovan. 1782. — GOURLAY diss. de erysipelate. Edinb. 1782. — KYPER instit. med. de erysipelate. Monspel. 1783. — J. W. GULBRAND observationes de erysipelate (Act. Reg. soc. med. Havn. Vol. I.). — AMMON diss. de erysipelate ejusque ab inflammatione diversitate. Harderov. 1790. — M'CULLEY diss. de erysipelate. Edinb. 1790. — THIERRÉ diss. de erysipelate. Lugd. Bat. 1790. — DESAULT *observations sur diverses espèces d'érysipèle*. (Ejusd. *Journ. de chirurgie*. Paris 1791. Vol. 2. p. 13). — GERGEN diss. de erysipelatis febrisque erysipelatosae causa materiali. Mogunt. 1792. — WINCKEL diss. de cognoscendo et curando erysipelate. Erl. 1794. — FERNÉ diss. de diversa erysipelatis natura. Francof. 1795. — ENGELHART diss. de erysipelate. Lundae 1797. —

RIUS¹⁵⁾, J. P. FRANK¹⁶⁾, J. CH. REIL¹⁷⁾, S. G. VOGEL¹⁸⁾ et maxime chirurgorum coetus.

Momen-
tum.

3. Est enim chirurgia et hic medicinae magistra. In ea saltem versamur opinione, notiones de erysipelate traumatico potissimum naturam erysipelatis ex causis internis oriundi, illustrasse. Nec satis. Arbitramur etiam erysipelatis doctrinam non solum fundamentum universae pathologiae et therapiae morborum cutis, sed et illius inflammationum sistere. Quare alium majoris momenti tractatum non novimus.

§. LX.

L. J. RENAULDIN *diss. sur l'érysipèle. Paris 1802.* — ARNOLD *diss. erysipelatis pathologiam complectens. Viteb. 1802.* — J. E. LECOURT-CANTILLY *essai sur l'érythème et l'érysipèle. Paris 1802.* — L. C. LEQUEULE *diss. sur l'érysipèle. Paris 1805.* — TERRIOU *essai sur l'érysipèle considéré dans son état de complication avec la fièvre adynamique. Paris 1807.* — MARIANDE *essai sur l'érysipèle simple. Paris 1811.* — J. R. SOURISSEAU *diss. sur la nature et le traitement de l'érysipèle bilieux, et du phlegmon aigu. Paris 1813.* — P. BEYDELLET *diss. sur l'érysipèle. Paris 1814.* — C. D. RUBBENS *diss. de erysipelate. Parisiis 1814.*

15) *Instit. med. pract. Vol. II. cap. 2.*

16) *Epitome de curandis hominum morbis. T. III. Ordo I. Genus I.*

17) *Ueber die Erkenntniss u. Cur der Fieber. 2. B. Halle 1799. p. 329—369.*

18) *Handb. der pract. Arzneywissenschaft, 3. Th. Sten-dal 1820. Cap. XI.*

§. LX.

Symptomata. Necroscopia.

1. Symptomata erysipclatis pro varia morbi ^{S. genera-} sede, vi et indole differunt. ^{tim.}

2. De *erysipclate universali* fasti quidem me- ^{E. univer-} dici plura offerunt exempla, uti videre est apud ^{salc.} ZACUTUM LUSITANUM¹⁾, SALMUTHIUM²⁾, CHERLIS³⁾, DE LA MOTTE⁴⁾, BRONFIELD⁵⁾, MICHAELIS⁶⁾, METTERNICH et WITTMANN⁷⁾; verum, ubi de erysipclate, uno eodemque temporis puncto universam cutim obducente, agitur, potius sive scarlatinam, sive urticariam, sive lepram squamosam incipientem, pro erysipclate habitas fuisse, opinamur. De hoc vero *sensim sensimque* universam per corporis superficiem ita migrante, ut parte una derelicta in in alteram conversum sit⁸⁾, propria quoque nobis experientia testatur.

3. Communissimum est *erysipclas capitis*, aut ^{E. capitis.} saltem *faciei*. Nisi illud (quod rarius contingere solet) per causas traumaticas excitetur, a symptoma-

1) Praxis medica admirabilis. Lib. III. obs. 9.

2) Cent. I. Obs. 32.

3) Cent. 2. di rare osservazioni di medicina e di chirurgia. Venez. 1725. Oss. 93.

4) Traité complet de chirurgie. T. I. Obs. 92.

5) Medical communications. Vol. 2. art. 4. p. 22.

6) LODER's Journ. f. die Chirurgie. 2. B. p. 668.

7) HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1814. April. p. 21.

8) LA MOTTE l. c. — Eph. nat. cur. Dec. II. a. 3. p. 171.

ptomatibus febris, aut saltem⁹⁾ a sensu valetudinis laesae, videlicet lassitudine, morositate, imbecillitate animi, gustu depravato, ciborum desiderio deleto, cephalaea, somno profundo¹⁰⁾, *praeceditur*. Dolet praeterea caput, dolentque saepe fauces, vel aures¹¹⁾. Haud raro simul tumor et tensio glandularum jugularium animadvertitur¹²⁾. Secundo sive tertio a febris ingressu die, — nonnunquam primo, vel et octavo, ut vidimus, erysipelas, praevio ustionis sensu, prorumpit. Initium plerumque id in alterutra gena, vel, ad aurem, vel ad nasi radicem, ducit, rubedine splendente rapide per totam utplurimum faciem et

9) Erysipelas nonnunquam *absque ulla febre* oriri jam dudum monuerunt DE MEZA (compend. med. pract. fascic. I. cap. XVII. §. 116.), RICHA (l. c.), BURSERIUS (l. c.) ac quotidiana quoad pulsum, calorem et sitim confirmat experientia. Haec vero febris absentia non impedit, quominus evolutionem erysipelatis alia morborum acutorum prodroma praecedant. Recte igitur REIL (l. c. p. 331.): „*Der Rose von innern Ursachen laufen meistens Vorboten, Schwere der Glieder, Kopfschmerz, Mangel des Appetits, unruhiger Schlaf u. s. w. voraus.*“

10) Sic alumnus seminarii medici Vilnensis WYSZYŃSKI mense Februario a. 1819. in clinico decumbens ante erysipelatis faciei eruptionem, praevia cephalaea in somnum profundum *duodecim horarum* incidit.

11) HIPPOCRATES in Coac. 200.

12) FRID. HOFFMANN l. c. — BURSERIUS op. c. Vol. III. §. 12.

et saepe per capitis partem capillatam propagatâ. Facta eruptione, febris, in leviori malo, remittit vel evanescit, in graviori vero aequali, quin imo majori vi saevit. Erysipelas autem ab initio roseum et splendens, tardius obscuriorem induit colorem. Saepe tumor nullus, excepto eo palpebrarum¹³⁾ et labii superioris, observatur (*erysipelas levigatum*). Alias universa facies, monstrosum exhibens adspectum, tumet ac tenditur (*e. phlegmonodes*). Praecipue vero tument palpebrae, super oculis clausae, ac materia puriformi conglutinatae, tumetque labium superius cum naribus, unde hiant ore respirare cogitur aeger. Ex hoc saepe magis, quam ex febre, lingua¹⁴⁾ fit arida. Subinde serum sanguinolentum ex auribus vel cruor sincerus e naribus manat. Haud raro erysipelas, imprimis ad genas, ad frontem et ad aures *phlyctaenas* vel *pustulas* vel *vesicas*, enormis interdum magnitudinis¹⁵⁾ offert (*e. phlyctaenosum, pustulosum*). Liquidum ex phlyctaenis vel pustulis hujusmodi disruptis manans, *crustis*, nunc densis, nigris, bruncis, nunc tenuibus, fuscis, flavis, ansam porrigit. Praeterea epidermis, quocun-

13) Conjunctiva palpebrarum et oculorum inflammationi erysipelaceae obnoxia est, quae in tractatu de morbis oculorum describetur.

14) Erysipelas linguae descripsit SELLÆ (Pyretolog. edit. 2da. p. 174).

15) Tales pluries observavi quales MONRO (*Krankheiten der Soldaten. Altenb. 1781. p. 411.*) descripsit.

cunque in loco erysipelas floruerit, in levissimo malo, sub forma *furfurum*, aliàs sub illa *squamarum*, secedit. Opus hoc *desquamationis*, nec non secessus crustarum, saepe nonnullorum, aliàs septem, decem, octodecim dierum spatio absolvitur. Sub convalescentia, cutis faciei, tenera et rubella, saepe crustarum reliquiis obsidetur.

E. trunci. 3. Erysipelas partem capillatam capitis occupans, interdum ad *nucham* extenditur, quod dum contingit, inevitabilis plerumque est, sub novo febris insultu, proptagatio illius per universum *dorsum* ad *lumbos*, vel usque ad *os sacrum*. Aliàs erysipelas faciei, a *mento* descendens, *pectoris* superficiei, potissimum autem *mammis* communicatur. Neque exempla erysipelatis, *primitive* ad *mammæ* præcipue gravidarum, puerperarum et lactantium, nec non ad *dorsum* vel ad *pectus*, prævia febre variæ indolis orti, desiderantur. Imo erysipelas *totum truncum* circumdans, descripsimus¹⁶⁾. FR. HOFFMANN de erysipelate, in febribus malignis et pestilentialibus sub *papilla mammae* vel ad *cordis regionem* comparente, loquitur. Simile fere malum (forte *anthrax*?) a PLATERO sub nomine *maculae latae* describitur¹⁷⁾. Constitutionis erysipelatosæ *scrotum* aggredientis et in gangraenam terminatæ BROCKLESBY meminit¹⁸⁾.

16) Acta mea clinica. Vol. III. p. 20.

17) Opp. T. II. p. 23.

nit¹⁸⁾. Interdum bubones, a causa venerea orti, erysipelate, late super *abdomen* et ad *crura* diffuso, circumdantur¹⁹⁾.

6. Maxime autem memorabile est *erysipelas*, *F. neonatorum*. abdomini, genitalibus et extremitatibus recens *natorum* infensum. De hoc morbo jam FR. HOFFMANN²⁰⁾, BURGIUS²¹⁾ et OEHME²²⁾ mentionem fecerunt: verum prima et absoluta illius descriptio UNDERWOODIO debetur²³⁾. Novi inde morbi doctrinam BROMFIELD²⁴⁾, GARTSHORE²⁵⁾, OSIANDER²⁶⁾, REDDELIN²⁷⁾, LODEMANN²⁸⁾, VELSEN²⁹⁾, SCHMIDT³⁰⁾,

18) *Oekonomische und medicinische Beobachtungen*. p. 93.

19) Erysipelas hujusmodi, mihi pluries visum, nuper NEUMANN descripsit (*Chiron*. 3. B. p. 11).

20) Op. c. T. II. §. V.

21) De erysipelate raro vide: *Miscell. nat. cur. sive ephemerides medicae*. Dec. 111. an. 3. p. 334.

22) *Diss. de morbis recens natorum chirurg.* p. 40.

23) *On the diseases of children*. London 1784.

24) *Medical communications*. Vol. 3. p. 22. — *Samml. auserl. Abhandl. f. prakt. Aerzte*. 16. B. 2. St. p. 322.

25) *Medical communications*. l. c.

26) *Denkwürdigkeiten für die Heilkunde und Geburtshülfe*. Gött. 1794—95. 2. B. 2. St. p. 370.

27) *Ueber die Ross der neugebornen Kinder*. Lübeck und Leipzig 1802.

28) Vid. HUYELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1810. 31. B. 4. St. p. 79.

29) Vid. HORN's *Archiv für med. Erfahr.* Jahr 1811. p. 426.

SCHMIDT³⁰⁾, HEYFELDER³¹⁾ et HEMMER³²⁾ locupletare satagerunt. Tertio nempe, quinto, decimo, vel et tardiore a partu die³³⁾, praeviis inquietudine, insomniis, gemitu, interdum vomitu lactis non coagulati, erysipelas plerumque circa *umbilicum*, aliquando autem ad *nucham*, ad *extremitates*, vel ad plurima loca simul, comparet, et super genitalia, crura et nates colorem livescentem et duritiem exhibens, extenditur. Tanto cum impetu contingere haec solent, ut jam tertio sive quarto morbi die infantes obiisse conspecti sint. Exitus fatalis potissimum transitui morbi in gan-

30) Disquisitio de erysipellate neonatorum ejusdemque a nonnullis similibus morbis differentia. Lips. 1821.

31) *Beobachtungen über die Krankheiten der Neugeborenen, namentlich als Zellengewebeverhärtung, Augenentzündung, Rose, Gelbsucht u. s. w. Nach eigenen Erfahrungen in den Hospitälern zu Paris.* Leipz. 1825.

32) *Die Rose der Neugeborenen ohne und mit ihrer Folgekrankheit der Zellengewebeverhärtung.* (HARLESS *Rheinische Jahrbücher für Med. u. Chirurgie.* 7. B. 3. St. p. 55).

33) Erysipelas characterem et indolem illius, quod recens nalis familiare est, habens, usque ad tertium aetatis mensem observavi; serius infantum erysipelata mihi ab illis adultorum hominum nequaquam differre videbantur, quod perpendere debuisset Dr. ZIMMERMANN ubi casum erysipelatis puellae quinquennis ad erysipelas recens natorum refert. (*Magazin der ausländ. Literatur der gesammten Heilkunde, von GERSON und JULIUS.* 1823. May, Juny. p. 345).

gangraenam debetur. Facillime ab hac partes genitales corripuntur; quo in casu stranguriam et convulsiones inducens observata fuit³⁴⁾. Et adulti pernicioso erysipelati subjiciuntur, quod *glandulis inguinalibus* infensum est, quod vero vel ad *pestem*, vel ad *lepram partialem*³⁵⁾ pertinet.

6. Erysipelas capitis interdum ad *brachia*, E. extremitatum, rarissime tamen ultra locum, quo musculus biceps inseritur, descendit. Caeterum erysipelata extremitatum superiorum, illis forsitan, quae a causis localibus gignuntur, exceptis, haud communia dici queunt. Contrarium prorsus de erysipelate *extremitatum inferiorum* valet, quod praecipue senibus cachecticis, hominibus munera stante pede exercentibus, ut metallicis³⁶⁾, coquis, lotricibus, pauperibus inprimis regionum septentrionalium³⁷⁾, habituale est. Stipatur quandoque tumore et dolore glandularum inguinalium³⁸⁾.

7. Veteres, quidquid dicatur³⁹⁾, non immerito E. internum.

34) VELSEN l. c.

35) ALARD *histoire de l'elephantiasis des Arabes*. Paris 1810. p. 205.

36) RAMAZZINI *Abhandl. von den Krankheiten der Künstler u. Handwerker, neu bearbeitet von J. C. G. ACKERMANN*. Stendal 1783. 2. B. p. 43.

37) Vilnæ numerus aegrotorum erysipelate crurum laborantium insignis est.

38) REIL l. c. p. 334.

39) Scribit G. A. RICHTER (*Specielle Therapie*. 2. B. p. 188.): „Die Rose an innern Theilen ist ein Ueßing.“

At paulo post ipse facit: „Indessen können an in-

rito doctrinam *erysipelatis interni* statuerunt⁴⁰⁾. Confirmatur hujus, aut saltem inflammationis superficialis internae praesentia per cadaverum sectiones. Saepius accidit praeterea, homines, erysipelati habituali aut capitis aut extremitatum inferiorum obnoxios, tempore, quo hoc morbo laborare debuissent, in viscerum inflammationes incidere, quarum resolutio vix aliter, quam com-
parente extus erysipelate, obtinetur. Tandem erysipelas haud raro evidenter a partibus externis ad internas proserpit⁴¹⁾.

Necrosco-
pia.

8. Superficies *cadaveris* vel nulla amplius erysipelatis vestigia, vel livorem gangraenosum in parte affecta offert. Plerumque epidermis hic secedit. Textus cellulosus cutis (saltem in recens natis) materiâ tenaci, albumini ovi simili repletus⁴²⁾. Ad partes internas migrante erysipelate,

visce-

nern Theilen und Eingeweiden, die eine der Beschaffenheit der Haut ähnliche Umkleidung haben, oberflächliche Entzündungen statt finden, die wegen dem gleichen Bau grosse Aehnlichkeit mit der Rose haben, und daher allenfalls erysipelatöse Entzündungen genannt werden können."

40) FRANK l. c. p. 28. (Nemo argumentis hic allatis resistere valet).

41) Vere REIL (l. c. p. 335.): „Zuweilen pflanzt sich auch die Rose, besonders wenn das äussere Ohr sehr entzündet ist, durch die Tuba zum innern Ohr und zum Rachen fort, und erregt daselbst mehr oder weniger heftige Hals- und Ohrenschmerzen."

42) WARBUTTON in the medical repository of original es-

viscerum, potissime cerebri, tracheae et pulmonum superficies externa, specifico colore roseo, notari solet. Haud raro idem hic color, vel coccineus, ad membranas internas, tunc magis turgescences, inprimis ad meninges, pleuram et peritoneum, observatur. Ut plurimum tunc in cavis vicinis humor serosus aut puriformis reperitur. Vix autem cadaver aegri, ex erysipellate defuncti, secumimus, quin labem antiquam, saepeque reconditam, e. c. abscessum aurium, cariem cellularum mastoidearum, maxillae, ossis frontis, obstructionem sive scirrhum hepatis, vel vitia cystidis felleae, invenerimus.

§. LXI.

C a u s s a e.

1. Homines exstant, qui a nativitate, peculiari ratione ad erysipelas praedispositi sunt¹⁾; ad illud faciei inprimis juvenes et feminae²⁾ tempore catameniorum³⁾. Idem de hominibus, re-

C. praedisponen-
tes.

gio-

says and intelligence relative to physic, surgery etc. Vol. IV. 1817—18.

- 1) Verissime ait VOGEL (l. c. p. 342.): „Manche Personen haben eine angeborene Neigung zu Rosen, obgleich man eigentlich nicht immer angeben kann, worinn sie besteht.“
- 2) Inter viginti aegros, erysipellate in instituto clinico Ticinensi decumbentes, non minor quam sedecim feminarum numerus observabatur.
- 3) TISSOT von den Nerven und ihren Krankheiten. 2. B. p. 379. versionis WEBER.

Frank Prax. I. 1. 2.

F f

gionibus calidis prius aduetis valet 4). Erysipelas extremitatum saepius senes aggreditur. Tempus hiemale (potissimum quatenus atmosphaera electricitate abundat 5)) praepriis morbis erysipelatosi favet, qui morbi interdum ignotae constitutionis gratia, epidemico more obveniunt 6).

C. excitantes.

2. Ad causas erysipelata excitantes spectant: frictio cutis rudi manu suscepta 7), adustio, contusio, vulnera, inprimis ex ictu sclopeti, sed et levia illa, quae venae sectionis 8), acu puncturae, scarificationum, variolarum et vaccinae inserendarum 9), vel secandorum cadaverum gratia inferuntur; excisio tumorum cysticorum, extirpatio mammarum, fracturae, potissimum cranii, extensio

4) MASON GOOD *the study of medicine. Vol. II. p. 614.*

5) Vigente gelu siccio pluries erysipelas epidemicum vidi in Lithuania.

6) HIPPOCRATES lib. tertius epidem. text. 29. — SYDENHAM L. C. — BROMFIELD chir. obs. — STRACK in act. Moguntin. T. I. p. 321.

7) Erysipelas dorsi, pectoris et brachiorum aliquoties in convalescentibus ex asphyxiis, ob frictiones ruditer nimis adhibitae, observavi. Eundem effectum a frictionibus in oedemate crurum conspexi.

8) Memorabile hujus generis exemplum legitur apud BRAMBILLA (*Chir. Abhandl. von der Phlegmone. p. 22.*)

9) De erysipelate post insertionem vaccinae lege: HUYELAND'S *Journ. der pr. Heilk. 1811. März. p. 120.* — HARDER *die Vaccination, als Gelegenheitsursache einer sehr bösartigen wandernden Rose. (HUYELAND'S Bibliothek der pr. Heilk. 1825. Septbr. p. 176).*

tensio praemagna cutis, e. c. a varicibus¹⁰⁾, a tumore vel a sero in textu celluloso collecto; compressio integumentorum¹¹⁾, ligatura umbilici; attactus equi morbo contagioso affecti¹²⁾; ichor cuti insertus¹³⁾, specifiens liquor ab animalculis, praesertim inséctis¹⁴⁾, in sui defensionem cuti inspersus, hirudines pravae indolis, succi vegetabilium rodentes^{*)}, forte eorum exhalationes¹⁵⁾.

F f 2

un-

10) Apud senes saepius hao ex causa erysipelas crurum ortum vidi.

11) Erysipelas pedum a caligis nimis arctis, plus vice simplici mihi obvenit; ita erysipelas faciei a larvis tempore bacchanalium applicitis.

12) SEIDLER in RUST's *Magazin der gesammten Heilk.* 17. B. 1. St. p. 161.

13) Scribit WILLAM (*On cutaneous diseases.* p. 514.): „When the acrimonious lymph contained in the phlyctenae or vesications of a genuine erysipelas, is inoculated or casually applied to any slight wound in a person otherwise healthy, it produces febrile symptoms with a red and painful but diffuse swelling, analogous to that of the disease from which the virus was derived.“

14) REAUMUR *mémoires pour servir à l'histoire des insectes.* Amst. 1737. T. II. p. 226. — *Der Naturforscher.* 14. Stück. Halle 1779. p. 60. — *Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie.* 1. B. p. 44. 50.

*) De erysipelate faciei ex succo euphorbiae pepli ad fugandam ephelidem adhibito lege: RUST *Magazin d. gesammte Heilk.* 19. B. 3. Heft. p. 498.

15) R. A. VOGEL praelectiones de cognoscendis et curandis corporis humani affectibus. p. 195. (*Rhus vernix* L.).

unguenta rancida, acrida¹⁶⁾, sinapismi, vesicatoria fortiora neglecta, vel eidem loco inflammato, sauciato frequentius imposita, ignis, caustica¹⁷⁾, aliaque irritantia¹⁸⁾; porro vicissitudines atmosphaerae, refrigeratio corporis aut partis aestuantis¹⁹⁾, frigus humidum, nebulae maritimae²⁰⁾, insolatio²¹⁾, alimenta pravae indolis, inprimis esus piscium rancidorum²²⁾, cibi, ob peculiarem idiosyncrasiam contrarii, e. c. hepar squali catuli²³⁾, cyprini²⁴⁾, carnis anserinae²⁵⁾ etc.; — secretio

16) Erysipelas faciei, ab oxydo mercurii rubro, ad pediculos necandos capiti admoto, in nosocomio Ticinensi a. 1792. conspexi. Ex linea capitis, arsenici ope fugata, non solum erysipelas faciei, sed et encephalitidem ortam vidit pater meus.

17) A caustico bubonibus imposito aliquoties erysipelas inguinum et abdominis observavi.

18) Acetum radicale, temporibus et naribus lipothymiae causa incaute admotum, erysipelas faciei generasse, compertum habeo.

19) LORRY op. c. p. 365. Homines per abusum liquorum fermentatorum aestuantes, ac hiemali tempore in plateis obdormientes, acpe gravissimo erysipelate capitis affectos *Vilnae* conspexi.

20) PALLAS *neue Beyträge*. 4. B. p. 156.

21) PELARGOUS *med. Jahrgänge*. IV. Jahrg. p. 185.

22) TODT *med. chirurg. Bibliothek*. 1. B. 3. St. p. 161. — Sic erysipelas tempore quadragesimae inter homines solis piscibus et oleo nutritos commune esse, in Russia observavi.

23) SAUVAGES *Nosol.* T. I. p. 421.

24) *Ephem. nat. cur.* Dec. I. a. IX. X. obs. 70.

crepito morbosae bilis²⁶), vermes intestinales²⁷), animi pathemata, inprimis ira et terror²⁸), haemorrhagiae, potissime menstrua, suppressae, ulcera artificialia praepostere sanata, *forte* interdum contagium²⁹), et arsenicum³⁰).

3. Cir-

25) HANNEMANNUS quotiescunque carne anserina vesceretur, erysipellate faciei exulcerato afficiebatur. (Ephem. nat. cur. Dec. II. an. IV. obs. 52.).

26) GALENUS de simplic. medicam. facultatibus. Lib. VII. — SCHROEDER l. c. §. VIII. §. XIII. — TISSOT *avis au peuple*. §. 283.

27) VAN DER BOSCH histor. constitut. epidem. verminosae. p. 179.

28) Permultis huiusmodi exemplis, inprimis a SCHROEDERO allatis (l. c. §. 8.), illud a me observatum addam, infantis scilicet *sex mensium*, a rixis inter parentes ita terrefacti, ut illico febre, et postridie erysipellate faciei corriperebatur. Imo erysipelas aliquoties in recens natis vidi, quum mater tempore graviditatis perterrita fuerit. In genere nullibi locorum erysipelas tam crebro post animi pathemata evolutum conspexi, quam in Lithuania.

29) WELL's in *Transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge*. Vol. 2. No. 17. — WILLAN (l. c.) de infante narrat, erysipellate laborante, qui morbum matri illi ubera praebenti communicavit. — Dr. BAILLIE (apud WELLS l. c.) asserit: „that the erysipelas of the face was (1795—96) much more frequent in St. George's Hospital than he had ever before known it to be; that many persons were attacked after they came into the hospital, and that the number in a particular ward was much greater than in any other.“ — Dr. PARS (Diction. verb. erysipelas.) re-

C. proxi-
ma.

3. Circa causam proximam erysipelatum variae exstant hypotheses. Querebatur ab antiquis in bile, porro in humore calido, tenui, acri¹¹⁾; in corruptione adipis¹²⁾ etc. Illa a causa proxima inflammationum (qualiscunque demum haec sit) differre non videtur. Inter inflammationes enim et exanthemata erysipelas ita medium tenere arbitramur, ut in leviori gradu (*erysipelatis scilicet levigati*) id magis ad *exanthemata*; in graviore vero (*erysipelatis videlicet phlegmonosi*) ad *inflammationes* magis accedat. In primo casu *sedes mali* potissimum in *rete mucoso*, — in altero, profundius et simul in *textu celluloso compacto, cutem*, proprie dictam, constituyente¹³⁾, — et

qui-

fert: „we have four times seen it epidemic, and more than once we have had reason to suspect that it was communicated by infection.“ Inter ea fateor me inter millena erysipelatis exempla nec unum yidisse, quod de contagio testimonium largiretur.

30) *Case of chronic rheumatism and observations on the exhibition of Arsenic in the protracted form of that disease.* By GEORGE KELLIE.

31) BURSERIUS l. c. §. 24.

32) WEDEKIND v. VOGEL (l. c. p. 343. not.) et J. F. GEROENS de erysipelatis febrisque erysip. causa mater. Mogunt. 1792.

33) ANDR. DUNCAN jun. erysipelas phlegmonodes, nomine inflammationis diffusae textus cellulosi describit (*Transactions of the medico-chirurgical society of Edinburgh.* 1824. Vol. I. No. 21.) observationibusque memorabilibus, quibus et illae Dr. DAVID SCOTT (*Edinb.*

quidem non in solis, ut docent, vasis cruentis, sed in *totius systematis cutanei substantia*, posita est. Posito erysipelas sistere *inflammationem cutis* modo plus modo minus profundam, illam jure *dermatitidem* vocari posse³⁴⁾, liquet. Sunt porro, qui erysipelas, prout morbus primum in summa cute incepit et denique ad textum cellulorum propagatus fuit, aut oppositum iter secutus est, in *erysipelas phlegmonodes* et *phlegmonen erysipelatodem* subdividunt³⁵⁾. Quodsi istis nosologiae

med. and surgical Journal. T. XXIV. p. 255) addi possunt, describit. (Vide *Magazin der ausländ. Literatur der gesamt. Heilkunde, von GERSOW u. JULIUS* 1825. Sept. Octob. p. 332.): Agitur praesertim eo de morbo, cui venaesectioes infaustae et vulnera in cadaveribus perlustrandis accepta ansam porrigunt, quique hucusque a laesione modo tendinis, modo vasis lymphatici, modo nervi, modo venae repetitus fuit. Istum igitur morbum potissimum ex inflammatione diffusa textus cellulosi repetendum esse docet egregius DUNCAN. Illius opinioni (quin ideo reliquae pro re nata excludantur causae) accedi posse existimo. Interea quum morbus a DUNCANIO descriptus rubore cutis insigniri solet, cur ille ad erysipelas non revocaretur non video. Textum cellulorum cutis inflammatione simul detineri objicis? Sed hanc inflammatoriam textus cellulosi affectionem in erysipelate phlegmonode existere neminem hucusque latuit.

34) CH. FR. HARLESS *prakt. System der speciellen Nosologie. 1. Hälfte. Coblenz* 1824.

35) HARLESS *Rheinisch Westphälische Jahrbücher f. Med. u. Chirurgie. 8. B. 3. St. p. 137.*

logis jactatam divisionem ad lectos aegrorum demonstrare licebit, toto illis animo gratulamur.

§. LXII.

D i a g n o s i s.

Facilis confusio. 1. Erysipelas confundi potest: cum *bullis*, cum *urticaria*, cum *anthrace*, cum *zostere*, cum *scarlatina*, cum *strophulo* et cum *erythemate*.

Distinctio a bullis. 2. *Erysipelas pustulosum*, a quibusdam scriptoribus cum *bullis* confusum¹⁾, ab his differt; quod *bullae*, facta eruptione, praeter halonem rubrum eas arcte ambientem, ruborem extensum non exhibeant, atque ad singulas corporis partes, imprimis ad crura compareant; *erysipelas* vero *pustulosum*, exorta jam pustula magis magisque rubere continuet et sat raro citra faciem observetur.

Distinctio ab urticaria. 3. *Urticaria* faciem occupans magnam cum erysipellate hujus partis alit similitudinem. Differt autem sequentibus notis:

<i>Urticaria.</i>	<i>Erysipelas.</i>
a. Magno pruritu stipatur.	a. Stipatur dolore ardente.
b. Uno temporis puncto faciem occupat.	b. Sensim sensimque faciem obducit.

c. Fa-

1) SPRENGEL *Handbuch der Pathologie.* Leipz. 1807. 2. Thl. §. 439. — CARL BELL in *Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 20. B. p. 621.

- | | |
|---|---|
| c. Facies <i>variegata</i> apparet. | c. Facies <i>aequali rubore</i> prehensa est. |
| d. Rubor alternatim evanescit reditque. | d. Rubedo constans observatur. |
| e. Vix desquamazione aliqua terminatur. | e. Desquamatio evidens locum invenit. |

4. *Erysipelas* nunc *malum locale*, nunc *sym-* Indoles varia.
ptoma morbi universalis constituit; quo ultimo in
casu diathesis *rheumatica*, *inflammatoria*, *gastri-*
ca, *nervea*, *arthritica*, *scorbutica* et *carcinoma-*
tica illi ansam porrigere solent.

5. *Erysipelas locale* a causis tum mechanice, E. locale.
tum chemice in cutim agentibus excitatur. In
parte laesa illud incipit, et, graviori tantum in
malo, febrem provocat; pro varia rerum positione
characterem inflammatorium, gastricum vel ner-
vosum patefacientem.

6. *Erysipelas*, quod ex atmosphaerae vicissit. E. rheu-
tudinibus, vel ex frigore aestuante corpore susce- maticum.
pto originem trahit, *rheumaticum* vocatur. Hoc
quum communissimum sit, *erysipelas* in genere
pro inflammatione cutis *rheumatica* declarare li-
cet²⁾. Morbus hic instar febrium *rheumaticarum*
orditur. Interdum tamen, rite monentibus DE
MEZA³⁾ et RICH⁴⁾); pulsus vix febris praesentiam
indi-

2) „Qui humor in cuti cutaneos affectus egerminat et
excitat, *idem* affectum istum *rheumaticum* promovet.“
(BALLONIUS opp. omnia. T. IV. Lib. de rheumat.).

3) Compend. med. pract. fascic. I. c. 17.

indicat. Erysipelas rheumaticum, sede prae aliis erysipelatis speciebus volubile, *faciem* aut *extremitates inferiores* occupare, atque *formam* *plerumque levigatam* prae se ferre solet. Solvitur aegritudo quinta sive septima morbi die, cum sudore universali et urina sedimento lateritio instructa.

E. inflammatorium.

7. Erysipelas *rheumaticum*, sub constitutione corporis florida, *complicationem inflammatoriam* facile induit. Erysipelas praeterea extat, prima jam origine *inflammatorium*, quod praecipue vernali tempore⁴⁾, apud viros floridos, obesos, liquoribus fermentatis deditos, haemorrhagiis habitualibus nunc suppressis obnoxios, obvenit. Incipit hic morbus cum frigore, interdum ad quatuor, sex vel septem horas extenso. Sequitur aestus cum pulsu duro, cephalaea, epistaxi, sopore ac facile cum vomitu. Comparente erysipelate, quod saepissime contingere solet, ad *faciem*, praedicta symptomata, sat saepe quidem, nec tamen in omnibus, leniuntur. Sub morbi incremento facies intumescit, saepe phlyctaenis, sive pustulis obsidetur, ac aegrotus, magis magisque soporosus, rhonchos ducere, ac interdum tacite, delirare, observatur. Tenduntur nunc hypochondria, alvus obstruitur, ac tendines nonnunquam subsiliunt. Crisis vix ante septimum diem, *plerum-*

4) Constitut. epidem. Taurin. altera. §. 8.

5) GRANT *Beobachtungen über die Fieber*, p. 391.

rumque circa decimum, vel tardius, sub largo sudore, diarrhoea, haemorrhagia narium, fluxu menstruorum sive haemorrhoidum et urina, copioso sedimento puriformi, fere squamoso, obtinetur. Aliàs *encephalitis* vel *otitis*, propriis signis et periculis stipatae superaccedunt, aut febris ex inflammatoria in nerveam convertitur. Ne symptomata nervea ex illis inflammationibus pullulantia ingruenti huic feбри tribuas! Virium ratio hîc praecipuum suppeditat criterium: Si praeter modum dejectae, imprimis obveniente simul symptomatum contradictione, potius transitus in febrem nervosam arguendus.

8. *Erysipelas gastricum*, praeviis indicatis ^{E. gastricum.} causis ac sociis symptomatibus febris gastricae (inter quae urina crocea), sat placide, nunc ad *faciem*, nunc ad *truncum*, nunc ad *extremitates* prorumpit. Forma illius ut plurimum *levigata* est, atque sub debita medendi ratione, aut in sanis caeterum hominibus, nonnullorum dierum spatio, interdum (ut in TAURINENSI epidemica erysipelatum constitutione accidit) leni diarrhoea solvitur, sub contrariis autem conditionibus, nervosam facile induit naturam.

9. *Erysipelas nervosum*, aliis *malignum*, ^{E. nervosum.} quamvis CULLENIO, quod miramur, haud visum⁶⁾, minime in dubium revocandum est. Huc nisi ad pestem, atrox et epidemicus ille morbus, *ignis*
St.

6) *First Lines*. §. 713.

St. Antonii (*feu de St. Antoine, mal des Arden-nes*), quo regnante LUDOVICO VII. utraque *Lotharingia* devastata fuit⁷⁾, pertinere videtur. Neque absoluta erysipelatis nervosi descriptio, apud FR. HOFFMANNUM desideratur⁸⁾. Morbus hic vel ex erysipellate traumatico⁹⁾, inflammatorio, gastrico sive neglecto sive male curato descendit; vel in primo mox limine atrocem suam patefacit naturam. Primo in casu, praeviis sudoribus saepe inanibus, ac invalescentibus caeteris symptomatibus, erysipelas concidit, livescit, vires sphincterumque officia franguntur, ac peticulae, miliaria et gangraena, maxime a decubitu, in conspectum veniunt. Altero in casu, morbus cum ingenti virium jactura et interdum cum lipothymiis orditur. Rapide deinde consueta febris nervosae symptomata evolvuntur. Erysipelas ipsum, saepe primis morbi horis, nunc ad *faciem*, nunc ad *truncum*, nunc ad *extremities* comparet. Forma illius plerumque *levigata*, et color profunde lividus est. Interdum cutis affecta, vesiculis, sero acri, rodente repletis, cooperitur, quae vesiculae disru-

7) MEZERAY historia Galliae.

8) Op. c. T. IV. p. 303.

9) Exemplo esto infame illud erysipelas, quod, ut chirurgi in magnis nosocomiis praxin exercentes, probe norunt, vulneribus superaccedere et cito in gangraenam transire solet, quodque a recentioribus, *phlegmone nosocomialis cutanea* nuncupari solet. (HARLESS *Rhein. Westph. Jahrbücher*. l. o.).

disruptae, totidem *loca gangraenosa* relinquunt. Haud raro hîc *vibices* et alia *ecchymomata* ceruntur. Curriculum et finis morbi illis febris nervosae respondent.

10. *Recens natorum erysipelas*, etsi ob id ^{Observatio.} gentilitium, quod inprimis partibus genitalibus infensum est, et peculiarem proclivitatem ad gangraenam manifestat, nihilominus non unum eundemque morbum sistere, variamque admodum indolem habere posse, experientia edocti sumus. Apparet enim modo ut malum *locale* (a prava umbilici tractatione et ab immunditie), modo ut *morbus gastricus* (a neglecta meconii evacuatione, acidis primarum viarum) modoque ut *affectio nervosa* (a magna, qua recens nati pollent, sensibilitate, facile intelligenda).

11. Luculentissimum *erysipelatis arthritici* ^{E. arthriticum.} exemplum, ipsa *podagrae*, alibi describendae symptomata, largiuntur. At, vel praeter podagram, diathesin arthriticam, rite monentibus STOLL¹⁰⁾, MUSGRAVE¹¹⁾ et S. G. VOGEL¹²⁾, in generationem erysipelatis saepius imperium exercere, ex eo apparet, quod homines, arthritidi subjecti, simul erysipelati, praesertim *habituali* frequenter obnoxii sint; — quod hoc, ubi vere et autumnopro more revertitur, ab aliis malis, potissimum arthri-

10) Rat. medendi. Vol. V. p. 436.

11) De arthritide anomala. 12) l. c. p. 342.

arthriticis, immunitatem concedat¹³⁾: — et quod, non comparente consueto erysipelate, haud raro inflammationes internae, inprimis peripneumoniae, sequantur.

E. febr.
intermitt.
sympt.

12. Quamvis erysipelas haud raro *periodice* recurrat, intervalla tamen libera relictia nimis protracta sunt, ut de febre intermittente quaestio esse possit. Hujus quidem suspicionem moverent observationes MORTONI, quippe qui de febre intermittente perniciosâ loquitur¹⁴⁾; sub cujus paroxysmis „cutis rubedine intensa ubique perfundebatur.“ Sed ipsa-haec *universalis rubedo*, exanthema minime ad erysipelas pertinuisse demonstrat. Alioquin ex pruritu, quo illud stipabatur, urticaria manifesta est. Nullam praeterea apud PUCCINOTTIUM (morbos periodicos inflammationibus, et exanthematibus stipatos tam exacte describentem)¹⁵⁾ febris intermittens erysipelaceae mentionem invenimus, neque unquam illam observavimus. Caeterum absit, ut contendamus, eam dari haud posse¹⁶⁾.

13. Ne-

- 13) Virum novit LONAR, qui, dum diarrhoea laborabat, ab erysipelate liber erat; dum illam sistebat, hoc denuo laborare coepit. Feminas nonnullas malis arthriticis et fluori albo obnoxias curavi, quae, prorumpente erysipelate, a malis illis, saltem pro tempore, liberabantur.
- 14) De proteiform. febris interm. genio.-Hist. XXIII et XXIV.

15) *Storia delle febbri intermittenti di Roma. Urbino 1824.*

16) Forte huc spectat inflammatio genae dextrae perio-

13. Neque erysipelas ex *diathesi scorbutica*, E. scorbuticum. inprimis senibus et cachecticis habituale, rarum est. Plerumque id extremitates inferiores saepe cum varicibus detinet; ac ad exulcerationem et gangraenam¹⁷⁾ pronum observatur.

14. Erysipelas, ad loca glandulis permultis E. carcinomatum et leprosum. instructa, comparens, saepe revertens, in duritiem desinens, subsequente ulcere cancroso, aperte indolem *carcinomatam* prae se fert. Non multum ab eo altera erysipelatis species differre videtur, quae nunc ad faciem, nunc ad mammas, nunc ad scrotum, nunc ad labia vulvae, nunc ad extremitates comparet, quaeque periodice revertens sensim sensimque *volumen partis monstrose auget* ac jure *pro initio leprae partialis* declaratur¹⁸⁾. Hujus generis erysipelata familiaria sunt plicosis.

§. LXIII.

P r o g n o s i s.

1. Nullum erysipelas, ob facilem propagatio-Generatim. nem sive conversionem ad partes internas, flocci pendendum est. Praeterea prognosis potissimum a morbi *sede, indole*, nec non ab aegrorum *aetate* et

dica, sulphate chininae sanata, de qua DURAND (*Journ. complémentaire du diction. des sciences médicales. T. XX. Cah. 77. Novembr. 1824.*) loquitur?

17) JACOBI diss. casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati. Erfurt. 1711.

18) *Nouvelles observations recueillies sur l'éléphantiasis des Arabes*, par ALARD. Paris 1811. p. 27.

et *constitutione* desumitur. Erysipelas faciei, etiamsi adspectu leve, praesentibus gravi cephalaea, sopore, deliriis atque anxietate, ob metum transitus in encephalitidem, hydrocephalum acutum et apoplexiam, magno semper periculo stipatur. Idem de erysipelate, cui graves laesiones locales, vel diathesis nervea ansam porrigunt, dici oportet. Infantes et senes difficillime erysipelas ferunt. Sic et valetudinarii, apud quos erysipelas partem jam labefactatam facilius aggreditur e. c. in phthisi tracheali tracheam, in phthisi pulmonali pulmones, in difficultibus urinae vesicam etc. — Saepe erysipelas salutare¹⁾, vel, uti in multis febribus vidimus, *criticum*²⁾ observatur. Erysipelas ab externis partibus *intro* converti; malum; ab internis vero *extra*, bonum³⁾; addite tamen:

ei

- 1) „Novi, inquit SCHROEDER, alios morbos, praesertim asthma convulsivum, ab erysipelate superveniente, fuisse feliciter sublatum.“ l. c. p. 308. Hujus generis observationes exstant praeterea in: *Samml. auserl. Abhandlungen für prakt. Aerzte*. 10. B. p. 436 et 714.
- 2) LE ROY *mélange de physique et de médecine*. p. 164. — PERCIVAL *essays*. Vol. I. p. 274. — FRANK l. c. p. 16. — REIL (l. c. p. 353.) ait: „Die meisten Rosen entstehen von innern Unordnungen des Körpers, die die Natur durch die Rose zu heben sucht.“
- 3) HIPPOCRATES (Sect. VI. aph. 25.) scripsit: „Erysipelas ab exterioribus verti ad interiora, non est bonum; ab interioribus vero ad exteriora bonum.“ Et (Cogn. No. 366.): „Erysipelas foris quidem exstare, utile: intro autem vergere, lethale. Cujus quidem

si partes internae ab erysipelate ad exteriora converso liberentur⁴⁾).

2. Erysipelas aut *resolutionem*, aut *oedema*, Exitus. aut *indurationem*, aut *suppurationem*, aut *exulcerationem*, aut *gangraenam* pro exitu agnoscit.

3. Erysipelas symptomaticum, per morbi pri-Resolutio. marii *crisin* solvitur. Quocunque autem in erysipelate, ut *crisis perfecta* dici queat, *desquamatio epidermidis* plus minusve requiritur, ut sub cuius defectu malum plerumque recrudescit, vel ad vicina loca propagatur⁵⁾. In erysipelate partis capillatae crânii, praeter epidermidis desquamationem, et *defluvium capillorum* succedere solet.

4. *Oedema* genarum, colli, dorsi, et lumbo-Oedema. rum, cum imminuta simul urinae secretionem, haud raro harum partium erysipelas sequitur; quem

rei iudicium est, cum, rubore evanescente, pectus gravatur, et acrius spiritum trahit aeger.⁶⁾

- 4) Vir illustris, Mediolani, cum sibi tumores folliculosos ad partem capitis capillatam scarificari jussisset, mox vero se aëri liberiori frigido, ac simul radiis solis exposuisset, nocte insequente in lethargum incidit. Versus sextum morbi diem insigne comparuit faciei totius erysipelas. Medicus ordinarius, aegrum in salvis esse, decrevit, cum vero lethargus persisteret, erysipelas externum pro morbi incremento se pro lethali a patre meo declaratum et eventu confirmatum fuit.
- 5) Sic erysipelas capitis, deficiente debita desquamatione facillime ad nuquam propagatur, quod dum accidit, inevitabilis descensus ad dorsum et lumbos observatur.

quem hujus morbi non infrequentem exitum in *hydropem textus cellulosi acutum* a scriptoribus negligi, miramur. Nec rarum est, sub erysipelatis curriculo aut convalescentia, praecipue apud potatores, *hydropem acutum internum*, inprimis cavitatis pectoris, vitae insidias struere.

Induratio. 5. Jam AETIUS, ubi remedia spirituosa et frigida in erysipelate adhiberentur, partium adfectarum *indurationes* succedere, edixit⁶⁾. Sed et praeter hanc causam, erysipelas, inprimis illud extremitatum inferiorum, frequenter repetitum, saepe duritiem, rigiditates⁷⁾ et insigne partis volumen relinquit. Sunt tandem, qui *indurationem textus cellulosi recens natorum* praevio erysipelati attribuunt; — at plane immerito, uti suo loco demonstrabimus.

Suppuratio. 6. Facilis, et nunc salutaris⁸⁾, nunc ominosus⁹⁾ est erysipelatis phlegmonosi in *suppurationem* transitus, inprimis ad palpebras, ad genas¹⁰⁾, super nasi radicem, sub galea aponeurotica cranii, sub

6) Tetrab. IV. Serm. II. c. 59.

7) Rigiditatem manuum ab erysipelate relictam describit SIMS (*Epidem. Krankh.* p. 36).

8) SCHROEDER, observationes STRACKII de erysipelate epidemico adducit, quod, nisi suppuraretur, in mortem abivit (l. c. p. 207).

9) HOME principia medicinae. p. 183.

10) Exemplum memorabile abscessus post erysipelas in nutrice caeteroquin sanissima describit S. G. VOOZL (l. c. p. 338).

sub musculorum bicipitis et fasciae latae expansionibus tendinosis¹¹⁾. Ne *abscessus* hujusmodi nos lateant, partes dicto erysipellate diutius detentae, iterum iterumque examinandae sunt. Constat, abscessus ex erysipellate ortos facile in fistulas¹²⁾ transire, cutimque plurimis in locis perforare, unde foedae cicatrices. Ne tamen *materiam puriformem* ex phlyctaeis hinc inde sub crustis densis retentam, pro pure in *vero abscessu* collecto habeamus, cavendum est¹³⁾. Abscessus loco, post erysipelas, interdum *furunculus* nascitur.

7. Indurationes et abscessus ab erysipellate, Exulceratio.
nec non erysipelas scorbuticum, imprimis ad crura, saepe saepius *ulceribus chronicis*, pro varia aegrorum constitutione, indolis variae, ansam porrigunt.

8. *Gangraena* potissimum ex erysipellate nec-Gangraena.
voso et scorbutico ad palpebras¹⁴⁾, aures, genas,

G g 2 scro-

11) Et casum erysipelatis cruris in suppurationem conversi idem enarravit S. G. VOOGEL (l. c. p. 339).

12) METZGER advers. med. P. II.

13) In errorem istum procul dubio incidit PEARSON, ubi ait (*Principles of surgery*. §. 289.): „A circumscribed cavity containing laudable pus is never seen in the legitimate erysipelas. Where a purulent effusion happens in any considerable degree, it affords, when the part is examined, a sensation similar to that excited by a quagmire or morass. In that sort of suppuration, which sometimes supervenes to erysipelas genae, the cellular membrane suffers great injury, and not uncommonly the part is in a gangrenous condition.“

scrotum et extremitates inferiores expectanda est. Plurima hujusmodi exempla apud BROCKLESBY¹⁵⁾, TISSOT¹⁶⁾ et VAN DER BUSCH¹⁷⁾ obveniunt. Trans-
itum erysipelatis in gangraenam praecipue autum-
nali tempore contingere, GRANTIUS existimat¹⁸⁾. In genere, annuntiatur hic gangraena a livore aut
nigredine partis, a strâis quasi igneis, nec non a
vesicis sero cruento turgentibus. Ne vero *nigre-*
dinem a sanguine extravasato pro gangraena
habeatis, cavete.

§. LXIV.

C u r a.

C. erys. lo-
calis.

1. Cura *erysipelatis localis* in eo consistit, ut
caussa morbi, si id sine nimia partis irritatione
fieri queat, abigatur, aut saltem, ut illius effe-
ctus, quoad licet, temperentur. In malo *recenti*
hirudines in viciniis loci affecti applicandae sunt.
Ipsi vero parti aegrotanti *fomentum frigidum*, vel
*simplex*¹⁾, vel *ex aqua et acetate plumbi liquido*,
methodo GOULARDI paratum²⁾, ope lintei tenuis
im-

14) REIL l. c. p. 333. 15) l. c.

16) l. c. §. 272. 17) l. c. p. 188.

18) l. c. p. 391.

1) C. H. DZORDI über Verbrennungen und das einzige
Mittel, sie in jedem Grade schnell und schmerzlos zu
heilen. Hal. 1825. (Consistit hoc auxilium in applica-
tione aquae frigidae, quam quidem in minori ambu-
stionis gradu, jam dudum cum fructu adhibui, neui-
quam vero in majori, partibus tensis et exesis).

2) Abhandlung vom Gebrauche des Bleyes. 1. Abschn. p. 26.

imponitur, saepeque renovatur. Sub minore mali gradu, *chartam compactam*, cui *pulvis acetatis plumbi* adpersus fuit, imposuisse sufficit. Morbo autem *profecto* alia accommodanda est medendi ratio. Nisi enim hinc suppurationis jam adsint indicia, pars morbosa *fomentis siccis ex herbis resolventibus*, addita *camphora*, vel saltem *linteo sicco* camphora adperso, cooperienda est. Si febris simul adfuerit symptomatibus inflammatoriis stipata, ea methodo antiphlogistica temperanda foret. Senescente morbo, et ingruente virium prostratione, purgatis, si opus fuerit, primis viis, ad *decoctum corticis cinchonae officinalis* devenitur. Doloribus et vigiliis tunc quoque opium prospicit³⁾.

2. *Erysipelas rheumaticum* regimen exanthematibus simplicibus accommodatum⁴⁾ exposcit. C. e. rheu-
matici. Morbus tutissime naturae committitur. Lenissima caeterum diapnoica non nocent; inprimis si alvum simul apertam teneant. Familiaris nobis est his sub rerum circumstantiis usus *tartari emetici*, refractâ, ut dicunt, dosi. Remedia topica, hic sicuti in omni erysipelate symptomatico, superflua et saepe nociva sunt. Solum, si lectus ab afflatu aëris non omnino securus esset, ac faciem erysipelas teneret, haec linteo tenuissimo, larvæ in-

3) E. c. homini adulto ad vespers *granum unum*, aut *gut-
tae quindecim* tincturae opii compositae *Sydenhami*.

4) Cap. VI. §. XXXVIII. No. 8.

instar, foraminibus circa oculos, nares et os instructo, obtegi posset. Neque in erysipelate *trunci* et *extremitatum* partes affectas ope *sacculorum*, *farinæ fœni graeci aut tritici repletorum*, feveri nocet. In erysipelate, ad aures usque extenso, ornamenta istarum feminea, quae in tumore partis quasi sepulta gangraenam induxisse observavimus, sine mora removenda sunt.

C. c. inflammato-
rii.

3. *Erysipelas inflammatorium* veluti exanthemata primaria inflammatoria tractatur. *Venae sectione*, quemadmodum in genuinis inflammationibus utimur, idque juxta indicationes ab ASTRUCIO⁵⁾, BURSERIO⁶⁾, S. G. VOGEL⁷⁾ stabilitas, videlicet in aegro robusto et florido, in morbo recente, sub annua constitutione, morbis inflammatoriis favente, sub pulsu constante, in morbo phlegmonoso, cum sopore, delirio aut alio phlogoscos internae signo. Ne symptomatum sive gastricorum sive nervosorum, hepatis cum cerebro, aut nervorum cum ventriculo consensui tribuendorum, praesentia, hic a venae sectione, alioquin indicata, nos absterreat. Imo si post emissum sanguinem, vis morbi non satis frangeretur, et ad alteram phlebotomiam devenire oportet; non neglecto nitri usu. Si provento in morbo vires jam evidenter fractae usum venae sectionis dubium redderent, aut mitior morbi gradus duntaxat

5) Tractatus de tumoribus. Lib. II. cap. 1.

6) l. c. §. 32. 7) l. c. p. 348.

taxat evacuationem cruoris localem exposceret, ad hirudines confugiendum foret. Earum decem vel duodecim in erysipellate faciei, pone aures, circa collum ponuntur. Quodsi ab applicatione hirudinum prope partem erysipellate detentam vel irritatio vel tumiditas absterrent, illarum quatuor gingivis admoveri possent, vel adhuc tutius scopo revulsivo, internae femorum superficiei. Suppressas cum damno haemorrhagias spontaneas restituendas esse, per se patet. STOLLIIUS, inprimis vigente gravi cephalaea, scarificationes ad nucham adhibuit⁸⁾. Ipsius partis erysipellate affectae scarificationes commendarunt FREIND⁹⁾ et HUTCHINSON¹⁰⁾, cui tamen consilio, ob exempla gangraenae inde exortae, minime subscribimus. Periculosum quoque est consilium erysipelas faciei ope fomentationum frigidarum curandi¹¹⁾, quae uni erysipelati ex causis localibus excitato, ut docuimus, convenirent. Pessimum est suusum,

cry.

8) Rat. medend. T. IV. p. 65.

9) Historia medicinae. p. 29.

10) In erysipellate extremitatum phlegmonode, incisiones ope scalpelli in cutem affectam longitudinis pollicis cum dimidio ad musculos usque suadet, ut inde sanguis multus fluat. Dein applicat fomenta emollientia, etiam esturnina frigida. Sic suppurationem taediosam praepediri aescit. (*Medico-chirurgical transactions. Vol. V. London 1814.*).

11) J. J. REUSS *die Gesichtsrose u. deren Behandlung mit kaltem Wasser.* (*HUTELAND's Journ. der prakt. Heilk.* 1824. Mai. p. 71).

erysipelati vesicatorium, sinapismum vinumque fervidum imponendi¹²⁾. Insons, sed nemini concedenda, est cura erysipelatis magnetica¹³⁾.

Continua-
tio argu-
menti.

4. Peractà in erysipelate inflammatorio sanguinis detractio, ad lenem alvi purgationem, ritè monente BROCKLESBY, in erysipelate inflammatorio efficacissimam, deveniendum est. Interea *temperies* cubiculi esto moderata, ac abstinence a remediis topicis. Hac sub methodo spatio nonnullorum dierum plerumque frangitur impetus mali, quò facto tempus, ut morbus curriculum consuetum absolvat, concedendum est. Quod si res sub methodo antiphlogistica, forte sero nimis adhibita, minus fauste incederet, ac transitus morbi in febrem nervosam timendus foret, virium tunc summam rationem habere oporteret. Hac de caussa, concesso victu ex jusculis carneis, exhibitoque pro potu infuso diapnoico, primum ad

liquo-

12) M. J. SABLAIROLES *mémoire et observations sur le traitement de l'érysipèle phlegmoneux*. Montpellier 1823.

13) Vulgus nonnullarum Germaniae provinciarum jam dudum, methodum erysipelas adlocutione (*das Besprechen der Rose*) curandi jactat. Homo videlicet sanus palmam manus in distantia sesqui pollicis super partem erysipelate laborantem repetitis vicibus duoit eamque vicissim proprio halitu adflat. Nec desunt inter ipsos Germaniae medicos qui testantur, tali pacto dolores erysipelatis mox sedari et dein ruborem quoque prodigati. (KUNTEMANN in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 1810. 10. St. Octob. p. 102. — WOLFART med. chirurg. Wochenblatt. 1. Jahrg. p. 1305).

liquorem acetatis ammoniacae, dein ad *infusum radicis angelicae archangelicae*, et si haec non juvarent, ad parvas *camphorae* doses, *nitrati potassae* nuptas¹⁴⁾ deveniendum est. Urgente sopore vel delirio *vesicatoria* aut *sinapismi*, cruribus, nunquam vero nuchae, ob facilem morbi ad hunc locum propagationem, admoventur. Haec ipsa remedia, si, quod frequenter accidit, encephalitis, erysipelatis faciei socia, in cerebri hydropem acutum jam transiverit, aut *muriati hydrargyri*, aut *floribus arnicae montanae*, aut *foliis digitalis purpureae*, secundum artis praecepta, alibi tradenda¹⁵⁾, nubenda forent.

5. *Erysipelas gastricum* methodo exanthematis C. e. gastrici. ^{gastrici.} tibus gastricis accommodata curatur. Saepe *emetico* locum esse, SYDENHAM, BAGLIVI, MEAD, FREIND, TISSOT, SAUVAGES, BROCKLESBY, MONRO (quorum testimonia SCHROEDER collegit), docuerunt, ac propria nobis experientia ultro confirmat. Plerumque vomitum excitandi scopo hic *tartarum emeticum*, ut quo simul alvus leniter et cum fructu movetur, eligimus. Fortiora nempe purgantia, recte monentibus QUARIN¹⁶⁾ et BURSERIO¹⁷⁾,

14) R. Camphorae grana duo. Nitri, sacchari albi àà drachmam semis. M. F. pulvis. Div. in sex partes aequales. D. S. omni secunda hora pulverem capiat.

15) P. II. Vol. I. Sect. I. Cap. IV. §. XXII. No. 13.

16) De curandis febribus et inflammationibus. Cap. X. p. 111.

SERIO¹⁷⁾, praecipue in debilioribus, quorum pulsus celer et parvus est, morbum exasperant.

C. e. nervosi.

6. In *erysipelate nervoso*, caeterum secundum regulas generales curando, *cortex cinchonae officinalis* praecipuam sibi laudem promeruit¹⁸⁾. Virtus illius potissimum in *erysipelate recens natorum* ab UNTERWOOD et GARTSHORE celebratur idque, ut experti sumus, omni jure, dummodo in provectioni morbo, eliminatis prius saburris primarum viarum, ingruenteque virium prostratione magnâ. *Clysteres* hîc ex *decocto corticis saturato*, addito quoque ejusdem extracto, omni quarta hora injiciuntur, ac simul, quantum ore porrigi potest, ingeritur¹⁹⁾. Parti *erysipelate dentatae* lintea calida, quibus camphora rasa adspersa est, vel, suadentibus supra laudatis Angliae medicis, lintea *alcohole camphorato* imbuta apponuntur. Et *mercurius* hoc in recens natorum morbo commendatus fuit²⁰⁾.

C. e. arthritici.

7. Ut *erysipelas arthriticum* consuetum sibi decursum rite absolvat, maxime studendum est. Hac de caussa, si praesens forte *complicatio inflammatoria* aut gastrica regulari morbi curriculo obstaret, ea vel *hirudinibus*, vel *lenibus purgantibus*,

17) L. c. §. 36.

18) BROMFIELD in *medical communicat.* II. 4. — COLLY Ibid. II. 3. FORDYCE v. MASON-GOOD L. c. p. 615.

19) R. Syrupi corticis peruviani unciam unam. Extracti corticis ejusdem gramma decem. M.

20) VELS L. c. p. 436.

tibus, e. c. electuario lenitivo, abigenda, simplex vero morbus naturae committendus. Erysipelas ipsum, nisi faciem detineat (quo in casu secundum regulas supra allatas agendum est), speciebus resolventibus siccis fovendum. Devicta jam febre, praecipue sub somni defectu, pulvis radicis cephaelidis ipecacuanhae cum opio porrigitur.

8. *Erysipelati scorbutico, praeter generale regimen antiscorbuticum, potissime usum internum infusi radicis acori calami et baccarum juniperi communis, accommodatum invenimus.* C. e. scorbutici.

9. In cura *erysipelatis carcinomatici* cautissime incedendum. Pars affecta auxilia localia ut plurimum respuit. Quamobrem potius ut ignis sponte deflagret expectandum. Interea pabulum morbo subtrahitur, si hirudines aut ad aliquam ab erysipelate distantiam, aut ad vasa, e quibus antea salutaris haemorrhagia locum obtinuerat, apponantur; si puritati tractus intestinorum et transpirationi studeatur; dolores somnum abigentes, viresque exaurientes, opio compescantur; sique corporis constitutio debito regimine diaetetico emendetur. C. e. carcinomatici.

10. Convalescens, donec desquamationis opus absolutum sit, a refrigeratione sibi caveat et spontaneum squamarum vel crustarum decessum expectet. Crustas vero praeter modum duras ac densas, imposita charta hibula butyro insulso imbuta, vel

vel applicitis sive *cremore lactis*, sive *decocto malvae rotundifoliae* emollire oportet.

C. exituum.

11. Ut *oedemati* occurramus, per omne erysipelatis curriculum *urinae secretionis* summa habenda est ratio, ac quamprimum ea, quin sudor illius vices agat, imminuitur, *diuretica*, sedi et indoli morbi accommodata, secundum regulas alibi tradendas²¹⁾, sine mora adhibenda sunt. — *Indurationes* ab erysipelate relictæ, vel tractu temporis, imprimis sub debito partis affectæ exercitio, sponte evanescent, vel *roborantibus*, præcipue *aquis martialibus*, sive lenibus diapnoicis atque diureticis dissipantur. Indurationes, quæ hisce auxiliis non cedunt, sanationem vix aut ne vix quidem admittunt, et resolventia localia, frictiones etc., novam pejoremque inflammationem plerumque excitando, plus damni quam auxiliû ferunt. — Si *abscessus*, erysipelatum reliquiae, superficiales sint, spontanea eorum ruptura expectari potest; alias cultro aperiendi sunt. Quoniam vero partes erysipelate prius detentæ, usum protractum cataplasmatum aegre ferunt, eorum loco abscessus maturandus, imprimis noctu emplastro adhaesivo, c. *g. diachylon*, cooperiendus est. — *Exulcerationes* chronicæ ab erysipelate relictæ remedia tum interna, tum externa exposcunt. Illa, ex classe *tonicorum* et *antiscorbuticorum*, desumuntur; hæc, quousque ulcus impurum est, in

21) P. I. Vol. III. Sect. II. Cap. de anasarca.

in usu pulveris carbonum, radicis acori calami, et unguenti digestivi, dein vero in applicatione filamentorum carptorum, primum liquore acetatis plumbi madefactorum, dein siccorum, consistunt. Praeterea maxime puritati studendum est. Si ulcus extremitatem occupat, tota pars affecta fasciâ, sic dicta *expulsivâ*, circumdari debet. Neque tunc motus moderatus nocet. *Plagae gangraenosae*, polline corticis cinchonae cum camphora et myrrha insperguntur, vel decocto ejusdem corticis fovendae sunt. *Scarificationes*, circa partem affectam institutae, augere potius quam arcere gangraenam solent. Si adventante gangraena erysipelas adhuc evidentes notas inflammatorias exhibeat, methodus antiphlogistica, viriliter adhibita, optime gangraenae limites ponit.

12. *Evanescente a cute erysipelate ac viscere* Cura retrocessus.
quodam inde laeso, juxta praecepta therapeutica respectu retrocessus exanthematum in genere tradita²²⁾, agendum. Si affectio interna symptomatibus inflammatoriis stipatur, *phlebotomia* non negligenda²³⁾. Contra si languent vires, ad *camphoram*

22) Cap. VI. §. XXXVIII. No. 35.

23) „So lange die Lebenskräfte stark sind, das Fieber heftig, der Puls voll, hart ist, muss man Ader lassen, kühlende Mittel in reichlicher Menge oben und unten beybringen und alles vermeiden, was Hitze bringt. Nach dem Pulse darf man sich aber nicht allein richten. Dieser ist bekanntlich in innern Entzündungen oft klein und zusammengezogen; aber er erhebt sich nach dem Ader-

phoram confugiendum. Phlogosi unâ cum debilitate urgente, prope partem affectam *hirudines* et interne *camphora* cum nitro indicatur. Interea cutis locus, quem erysipelas deseruit, auxiliis topicis irritandus, videlicet vel sinapismo, vel vesicatorio, vel simplici tincturâ cantharidum, vel cucurbitulis siccis. Et universae cutis tonus, ope frictionum columnae vertebralis, illi nervos largientis, excitandus, dummodo id sine refrigerii periculo fieri possit. Transpirationi enim maxime studendum. Elicitur ea haud raro *emeticis*²⁴⁾.

Prophylaxis erysipelatis habitualis.

13. Ad praepediendum erysipelas habituale primum in causam ejusdem inquirendum. Latet ipsa saepissime in vitio hepatis, vernali tempore succis vegetabilibus resolventibus, sero lactis; aestate aquis soteriis salinis, et autumno esu uvarum debellando. Aliàs cutis sensibilitas morbose mali sistit causam; cui obviam itur frictionibus moderatis superficiei corporis, vestibus laneis illi immediate applicitis, thermis, inprimis sulphureis. In arthriticis erysipelas fonticulorum ope securissime

lassen, und dieses ist oft desto nöthiger, je kleiner er ist. Die heftigen innerlichen Schmerzen, die grossen Beängstigungen, die starke Hitze und die fast guten Kräfte des Patichten müssen hier den Arzt leiten und die Nothwendigkeit und Zuverlässigkeit der Aderlässe bestimmen.“ (S. G. VOGEL op. c. 3. Th. p. 352. 353).
24) „Zuweilen bringt ein Brechmittel, wenn sonst nichts dawider, die Rose schnell wieder auf die Haut.“ (Idem, ibidem).

sime praepeditur, dummodo cutis sensibilitas non obstat²⁵⁾.

CAPUT XII.

D e f u r u n c u l o .

§. LXV.

Definitio. Literatura.

1. **T**uberculum nucis avellanae vel ovi co-Definitio.
lumbini magnitudine, in medio elevatum, profunde rubrum, ut plurimum valde dolens, *furunculus*²⁾ dicitur.

2. Quam.

25) Feminae quadraginta annorum Vindensī, erysipelati faciei aliisque malis arthriticis obnoxiae, fonticulos ad brachia, scalpelli ope, adplicari jussi. En postridie in brachio dextro erysipelas, brevi phlegmonosum redditum, et licet illico pisum e vulnere remotum fuerit, vitae insidias struens. Universum enim brachium enorme adeptum erat volumen. Cura propterea difficilis evasit, quoniam auxilia, aliis in erysipelate locali proficua, e. c. fons frigidus, saturnina, ob conditionem aegrae arthriticam tuto adhiberi haud potuere. Optime conduxerunt folia recentia betae rubrae et brassicae, brachio imposita.

1) GRÆC. *Δεδήν*. *Synon.* Abscessus nucleatus, abscessus sanguineus. ITAL. *Furoncolo, figuolo, ciccione*. GERM. *Blutgeschwür, Blutbeule*. GALL. *Clou, furoncle*. ANGL. *A boil*. BATAV. *Bloedzweer, Bloedvine*. DAN. *Blodbyld*. SUEC. *Blodböld, Böld*. HISP. *Divie-*

Literatura. 2. Quamvis hic morbus ad chirurgiae imperium spectet²⁾, nihilominus exemplo GALENI³⁾, CELSI⁴⁾, PAULI AEGINETAE⁵⁾, ORIBASII⁶⁾, AVICENNAE⁷⁾, MERCURIALIS⁸⁾, STAHLII⁹⁾, HEIMII¹⁰⁾, RITTERI¹¹⁾, GUIDETTI et MALVANI¹²⁾, aliorum-

que

so, Colondrino, Venino. LUSIT. Fourcho, Gravo, Leicenco. Ross. Чирей, Вепедь. POLON. Czyrak.

- 2) HEISTER institutiones chirurgiae. Amst. 1750. — RICHTER Anfangsgründe der Wundarzneykunde. Gött. 1782. — NESSI istituzioni di chirurgia. Venez. 1787. — BELL Lehrbegriff der Wundarzneykunst. 1790. — CALLISEN institutiones chirurgiae. Hafn. 1788. Edit. nova Germanica. Copenh. 1798. Ejusd. System der neuen Chirurgie, nach der 4. Ausgabe a. d. Lat. übers. und mit Commentar nebst vielen Zusätzen versehen von A. C. P. CALLISEN. 2. B. Copenh. 1824. — SABATIER méd. opératoire. 3. édit. T. 2. — RICHERAND Grundsätze der Wundarzneykunde. 1. B. — BOYER chir. Krankh. 2. B. — SAM. COOPER chir. Handb. 2. B.

3) De compos. med. sec. loc. L. V. c. 7.

4) De re med. Lib. V. Cap. XXVIII. No. 9.

5) L. V. c. 23. 6) Synops. L. VII. c. 41.

7) Canon. L. IV. Fen. 3. Tract. 1. cap. 33.

8) De decoratione. cap. 21.

9) Diss. de abscessu et furunculo. Hal. 1714.

10) Erfahrungen über die Furunkeln, nebst Beobachtungen über eine ansteckende Art derselben. (HORN'S Archiv der med. Erfahrung. 4. B. 1. Heft. p. 151).

11) Aetiologie und Therapie der Blutschwäre. (WALTER und GRÄFE Journ. der Chirurgie. 3. B. p. 81—104).

12) Journ. général de méd. No. 294. — GERSON u. JULIUS Magazin der ausländ. med. Literat. 3. B. p. 465.

que medicorum, illius mentio, ob nexum cum aliis morbis, praetermitti a nobis nequit.

§. LXVI.

Symptomata. Causae.

1. Furunculus nunc in uno solum cutis loco ^{Sympto-} (*f. solitarius*), nunc in plurimis simul partibus, ^{mata.} potissimum facie, axillis, natibus, femoribus, perinaeo, nec exceptis semper oris cavitate, ani, vulvaeque orificiis et pene, sub forma noduli duri, rubri, splendentis, in conspectum venit. Citissime is, sub magno plerumque cruciatu, decubitus super partem affectam impediens, crescit. Tumor, ut diximus, variae magnitudinis¹⁾, rotundus, circumscriptus, durus, in fastigium altum elevatus, observatur. Febris, nisi sub magna aegri et partis affectae sensibilitate, aut nisi plures furunculi simul prorumpant, raro occurrit. Ea praesente, agrypnia, ciborum aversio et hinc inde, apud infantes, convulsiones²⁾ succedunt. Furunculus lentius, quam reliquae inflammationes, in suppurationem transit. Incipit vero suppuratio circa apicem, quo in loco, nucleus³⁾, ex fibris densis et crassis, subalbidis, subrubris compactus, nec in pus convertendus, in-

1) Vidi pluries furunculos ovum anserinum adaequasse, vidit RITTER (l. c.) eosdem amplitudinis pagni visilis.

2) RICHTER op. c. 1. Th. p. 133.

3) ГЕНН. *Pfropf; Eiterstock*. GALL. *Bombillon*. ITAL. *Barba del furuncolo*.

Frank Prox. I. 1. 2.

invenitur⁴⁾. Reliqua apostematis maturi superficies, plura tandem foraminula, pus, multo sanguine mixtum, fundentia, exhibet. Expulso sive educto nucleo, saltem in corpore caeteroquin sano, abscessus cito sanatur. Quandoque furunculo uno sanato, alius in vicinia, vel etiam plures alii in variis corporis partibus comparent. Furunculus crines includere visus est⁵⁾.

CALISSAC. 2. Furunculi nulli parcent aetati et sexui. Communiore tamen sunt infantibus et feminis potissimum succi plenis, plethoricisque, et concurrente annua vel epidemica constitutione⁶⁾. Ex locis, quibus praecipue addicti observantur, pinguedinem illis favere suspicari licet. Excitantur a transpiratione cohibita, a protracta caloris actione⁷⁾, a potu liquorum fermentatorum insolito, motu corporis nimio, a sinapismis, vesicatoriis, cauteriis, unguentis acribus, cuti applicitis, a peora⁸⁾, a morbillis, variolis, scarlatina, typho

4) Veluti *radices* habuisse nucleum apud FORESTUM (Obs. chir. Lib. I. obs. 9.) legitur.

5) GILBERT *adversaria medico-practica*. Lugd. 1794. p. 140.

6) Plus vice societati medicae C. Vilnensi de furunculis epidemica grassantibus quaestio erat. Memoratu dignum est, et *panaritium* simul regnasse.

7) FRANK *Epit.* Vol. IV. p. 40.

8) BOSE in WEITZ *neue Auszüge aus Diss.* 6. B. p. 63. MALACARNE (*Journ. der aul. med. Literat. von HARLESS und RITTER.* 3. B. 2. St. p. 74).

typho imperfecte judicatis, a vitiis primarum viarum⁹⁾ viscerumque abdominalium, a labe scrophulosa, scorbutica, arthritica, venerea¹⁰⁾, a laesa uteri et mammarum functione¹¹⁾; forte a vermibus¹²⁾ et exhalationibus animalibus¹³⁾, vix

H h 2

a

9) Inter infantes a lacte depravato, observante CONRADIS (HUFELAND's Journ. der prakt. Heilkunde. 6. B. p. 518).

10) Ex hac causa virum triginta circiter annorum Villinae triginta duobus furunculis obsessum vidi.

11) LEVRET *essai sur l'abus des règles générales*. Paris 1766. p. 235.

12) *Filaria medinensis*. GRAM. *Der Medinawurm, der guineensische Fadenwurm*. GALL. *Le dragonneau*. ANGL. *The guineaworm*. Vermis hic in regionibus torridis endemicus, hinc inde in Lithuania obvius, longitudine duorum, trium, duodecim pedum, crassitie chordae medtocris et coloris albidii observatur. Habitat in tela cellulosa subcutanea hominis, praesertim ad pedes. Excitat pruritum intolerabilem, et, nisi vermis extrahitur, funestam inflammationem. Optimi de eo scriptores sunt: KÄMPFER (de dracunculo Persarum, in amoenitatum exoticarum Fasc. V. p. 524). — GRUNDLER (Commercii litter. Nor. 1746.). — RUDOLPHI (Op. c. Vol. II. P. I. p. 56). — C. BURSY *aetiologischer Beytrag z. Helkologie*. (HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1825. September. p. 82).

13) Vulgus Germaniae quondam furunculos pusionum a quassatione canis, cubiculum infantile simul inhabitantis, repetiit, idcoque *Hunde-Schütteln* vocavit. (STORCH *Kinderkrankheiten*. 4. B. p. 176). Quum vulgi opintiones quandoque experientiae innixae sint, quum ad transitum morborum ab animalibus ad ho-

a contagio¹⁴⁾. Num causa proxima pullulet ex corruptione adipis, ex affectione telae cellulosaе subcutaneaе¹⁵⁾, ex inflammatione vasorum capillariorum corii¹⁶⁾ etc. non audemus determinare.

§. LXVII.

D i a g n o s i s.

Facilis
confusio.

1. Furunculi confundī possunt cum sic dictis *comedonibus*, cum *urticaria nodosa*, cum *anthrace* et *carbunculo*, cum *pydracia* et cum *psora*.

Distinctio
a comedo-
nibus.

2. *Comedones* seu *crinones*¹⁾ sistunt materiam sebaceam in ductis excretoriis glandularum cutis coagulatam. Adspectus illis est punctorum durorum, nigrorumque. Dum digitorum ope exprimuntur, sese sub forma vermium flavo colore, alterā extremitate nigrā instructorum, longitudinis duarum linearum, crassitiei acus exhibent. Mirum igitur non est, illos ante microscopii debitum usum pro *vermibus* revera habitos fuisse²⁾,
in.

minem maxime attendendum sit, hanc forte fabulam anilem silentio praeterire nolui.

14) HEIM (l. c.) furunculum pro contagioso declarat.

15) BOYER l. c. 16) CALLISEN, RITTER ll. cc.

1) *Synon.* Crinones, acne punctata. GERM. *Mitesser*, *Zehrwürmer*, *Dürrmaden*. GALL. *Crinons*, *cees*, *dragoneau*, *maiclou*. ANG. *Maggots*. ITAL. *Crinoni*. HISP. *Culebrillas*, *Gusanillo*. LUSITAN. *Inças*.

2) Hanc opinionem defenderat ETTMÜLLER (opp. T. III. p. 543.) et tabula aenea sustinere conatus est. Interea

inprimis quum in infantibus atrophiam laborantibus (ac si illis nutrimentum detraherent) prae aliis obvenire soleant. Nec defuere, qui morbum de quo agitur, quandoque endemicum³⁾, pro affectu pilari habuerunt⁴⁾. Etiam si comedones veluti nodulos in cute referant, nihilominus ob defectum symptomatum inflammatoriorum facile a furunculis distingui possunt.

3. Si furunculi per universam corporis superficiem prorumpant, ut ab *urticaria nodosa* distinguantur, ad sequentes characteres respiciendum est.

Distinctio
ab urticaria.

Urticaria nodosa.

Furunculi.

a. *Pruritu* summo et impetatur.

a. *Dolore* insigniuntur.

b. Tubercula irregularia

b. Tumores circumscribitur

jam FR. HOFFMANNUS eam in dubium vocavit (Meth. med. lib. I. cap. 19.) rejeceruntque ut falsam ALBERTI (de atrophia infantum. Hal. 1729. p. 23.) et STORCH (Kinderkrankheiten. 4. B. p. 156. edit. a. 1751.). Erat hinc A. C. P. CALLISEN (l. c. p. 88.) dum ait: „ADOLPH AUGUSTIN VOGEL zu Göttingen (de cogn. et cur. corp. hum. affectibus. Goett. 1772. p. 642.) war wohl der erste, der diesen Irrthum widerlegte.“ Cfr. ACKERMANN über die Mitesser der Kinder in BALDINGER's neuem Magazin. 3. B. 1781. p. 330.

3) In Provincia Franco-Gallica (Provence) comedones endemicos esse refert BASSIGNOT. Vid. Salzburg. med. chir. Zeitung. 1790. 2. B. p. 260.

4) HORST Part. I. p. 405.

aut subrotunda re-
fert.

ptos et acuminatos ex-
hibent.

c. *Desquamatione* termi-
natur.

c. Semper in *suppura-
tionem* transeunt.

Varia in-
dolens.

4. Furunculos modo vitium cutis locale si-
stere; modo ex labe universi corporis pullulare,
modo acute decurrere, modo chronice, non est
cur moneamus.

§. LXVIII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Furunculi interdum cum emolumento
erumpunt, ac non raro sub convalescentia alio-
rum morborum *criseos* sistunt *complementum*. Sic
a furunculo aliquando febrem intermittentem quar-
tanam solvi, VOGEL docuit¹⁾. Convalescentes ex
typho vidimus, quibus vires non prius, quam
ubi unus alterve furunculus prodiisset, restitutae
fuerunt. Luculentissimum quoque furunculi cri-
tici post erysipelas habuimus exemplum²⁾. Ma-
niae, a copiosa furunculorum eruptione fugatae,
casum refert HEIM³⁾. Furunculi autem, qui in
seni-

1) Praenot. P. I. p. 15.

2) Vetula, erysipelati habituali indolis arthriticae sub-
dita, in eundem morbum initio hiemis 1811. incidit.
Erysipelas dorsum occupabat, omnem desquamationem
respuens. Conspicua virium prostratio, vigiliae, in-
quietudo et cephalaea jam vitae insidias struere vide-
bantur, cum, furunculo in medio dorsi comparente,
omnia illico in melius mutata fuerint.

3) L. o. p. 161.

senibus aut in hominibus, labe aliqua detentis, prope aponevroses⁴⁾, circa anum, ad perinaeum et scrotum contingunt; eo quod facile ulceribus fistulosis ansam porrigant, mali ominis habentur. Interdum furunculi indurantur et fere scirrhosam induunt naturam.

2. In furunculo *locali*, eo quod nulla resolutio expectanda sit⁵⁾, prima suppurationem promovendi est indicatio, ac nisi abscessus, quo decet modo, locum inveniat, durities, per novam solum inflammationem dissipanda, relinqui solet. Ad suppurationem autem promovendam, in modico inflammationis gradu, cataplasma ex mica panis albi et lacte paratum, addito sub magnis doloribus croco, applicatur. Saepissime emplastrum *diachylon simplex*, quo furunculus cooperitur, bisque de die mutatur reliquis auxiliis palmam eripit. Vigente nimio inflammationis impetu, regimen

4) WEINHOLD in HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. 86. B. 5. St. p. 99.

5) Aliter quidem sentit RITTER (l. c. p. 96.) suadens, malum in incunabulis exemplo CELSI (Lib. VII. cap. 2. p. 408. v. 4.) suffocandum esse, idque furunculo nascenti cucurbitulam scarificantem imponendo. Mihi remedium morbo pejus videtur. Sciendum in genere conatus resolutionem furunculi per acidum sulphuricum dilutum (HEISTER l. c.) aut per extractum saturni, obtinendi, hucusque non solum nihil profuisse, sed potius nocuisse, tum furunculum durum reddendo, tum illius repulsionem efficiendo, a qua praecipuis tussis observata est. (RICHTER chir. Biblioth. v. B. p. 6).

gimen antiphlogisticum in auxilium ducendum est. Contra ea si processus inflammationis et supurationis lente incederent, cepae assatae, mel farinae mixtum ac similia, furunculo imponenda forent. Quoprimum autem mobilis est nucleus, is, nisi sponte secedat, arte extrahatur, quo neglecto, cicatrix nulla formabitur, atque ulceris chronici fistulosi periculum imminebit. Raro hoc in opere cultro opus est. Praesentibus insectis sive vermibus, illa *foliis nicotianae tabaci et oleo* necanda, hi vero caute abigendi sunt⁶⁾. Furunculus

- 6) Pro *filaria medinensi* sequentem methodum commendat KAEMPFER: „Loci, ubi erumpere tentat, durities emplastro aliove medicamento emolliente maturatur, ut vermis infixus suppuratione aensim proliciatur; deprehensi portio, quanta lenem attractionem sequitur, circa ligulam pollicaris longitudinis rotatur et epithemate retinetur, ne in ulcus recedat. Hoc indies gemina obligatione a pure suo liberatur, iterata semper attractione et totalis eductionis qualicunque tentamine. Raro vivus illico extrahitur (nisi in scroti cavo, vel sub pectoris cute haeret, ut media ejus pars arripi queat), plerumque diebus circiter decem elapsis auferitur. Cautio est, ne fiat attractio fortis et subitanea; illa inanis est et dolores excitat, haec periculosa, qua vermis plerumque rumpitur et inaro recedit, multis symptomatibus aegrum afficiens, donec largiori suppuratione, vel eodem illo, vel novo ulcere excernatur. Verme panitus egesto, ulcus fistulosum vulgari quovis remedio paucos intra dies et supra omnem tractantis fidem, facillime sanatur. Vulgus pauper sola cepearum, sub cinere tostorum, impositio totum maturationis

culus *symptomaticus*, praeter curam localem, et remedia, morbo primario accommodata, exposcit. Latente diathesi scrophulosa, optime usus *sulphureti antimonii et hydrargyri*, cum *extracto conii maculati* conducit. In furunculo ex labe scorbutica et venerea orto, aliquoties *acidum nitricum dilutum* intus assumptum profuit. Rebelles furunculos, indolis ignotae, sed aperte ex vitio totius systematis pullulantes et continuo recrudescentes, tum *decocto corticis ulmi campestris*⁸⁾, tum connubio *radicis acori calami, smilacis chinæ et baccarum juniperi communis* pluries debellavimus. Nec *ulcera artificialia* ad brachia, in morbo rebelli negligenda sunt. *Comedones* praeter curam, si opus, atrophiae accommodatam, abiguntur balneo tepido, deindeque massâ confectâ ex duabus partibus farinae tritici, exque unâ faccis cerevisiae et mellis invicem fermentatis. Haec massa tepide manua ope cuti illinitur; ac post nonnulla horae momenta abstergitur; tunc comedones prominentes panno lanco et sapone remonentur.

CAPUT

et eductionis negotium nec infeliciter perficit. Sunt, qui frequenti aquae frigidae affusione sibi consulere satagant." (l. c. p. 533). Et *assae foetidae* locus concedendus videtur (*Schreiben des Dr. DE CARRO zu Wien über den Hautwurm in HUFELAND's und HIMLY's Journ. der pr. Heilk. 1813. p. 112*).

8) Uncia una corticis pro libra decocti.

CAPUT XIII.

De anthrace et carbunculo.

§. LXIX.

Definitio. Historia.

Definitio. 1. *Anthrax* est tumor inflammatorius, urens, circumscriptus, apice elevatus, citissime in gangraenam transiens. — *Carbunculus* est vesicula, sive potius *phlyctaena* gangraenosa, ambitu indurato, livido, splendente instructa¹⁾.

Historia. 2. Jam HIPPOCRATES anthracum et carbunculorum mentionem injecit²⁾. Ita GALENUS³⁾, CELSUS⁴⁾, PLINIUS⁵⁾, AETAEUS⁶⁾, AEGINETA⁷⁾, AETIUS⁸⁾

1) Uterque morbus indistincte vocatur: GR. Ἀνθραξ. LAT. carbunculus, furunculus gangraenosus, malignus. ARAB. *Giamrach*, pruna. PERS. *Atshac* (GOLII lexicon p. 651.) ab *atshca*, ignis (NICOLAI lexicon harmonicon p. 70). GERM. *Brandbeule*, *Karfunkel*. GALL. *Charbon*, *carbuncle*, *anthrax*, *pustule maligne*. ANGL. *Carbuncle*, *anthrax*. ITAL. *Carboncello*, *crusco*, *carbunchio*. HISP. *Lobanillo*. ROSS. Огненный Вередъ. POLON. *Powietrzna chrosta*.

2) Epid. Lib. II. Sect. I. 3) Lib. de atra bile. cap. 4.

4) Lib. V. c. 28. Lib. VI. c. 6. §. 10. c. 18. §. 5.

5) Histor. natur. Lib. XXVI. c. 1. §. 4.

6) Lib. I. c. 9. de acut. morb. caussis.

7) Lib. III. c. 22. §. 20.

TIUS⁸⁾ aliique. HAHNIUS quidem et TRILLERUS, veteres, sub nomine anthracis, *variolas* descripsisse, crediderunt⁹⁾, at docte hanc opinionem WERLHOFFIUS refutavit¹⁰⁾. Clarior anthracis et carbunculi notio apud Arabas, praecipue apud AVICENNAM obvenit¹¹⁾. Exactissima autem horum morborum descriptio a seculo decimo sexto incipit, operâ A. TOSSI A SERRA¹²⁾, CH. P. DE HERRERA¹³⁾, MONAREDO et MOLINA¹⁴⁾, QUINONES LAS LANGOSTAS¹⁵⁾, BORDENAVE¹⁶⁾, FOURNIER¹⁷⁾, BALDINGER¹⁸⁾, CHAMSON¹⁹⁾, CHABERT²⁰⁾, ENAUX et

8) Cap. de pustulis in febris.

9) Opuscul. medica. Vol. II. p. 13.

10) Disquisitio de variolis et anthrace. Opp. T. II. III. p. 745.

11) Lib. IV. Sect. 3. Tract. 1. c. 9.

12) De anthrace et carbunculo tractatus. Venet. 1576 et 1618. 4. Cfr. HALLERI bibl. med. pract. T. II. p. 475.

13) De carbunculis animadversiones. Pintiae 1604. 4.

14) *Paradoxa sobre la curacion local del carbunculo maligno.* Jaen. 1701.

15) *Del carbunculo.* Madrid. 1720.

16) De anthrace. Theses anatomico-chirurgicae, resp. J. J. ROBIN. Parisiis 1765.

17) *Observations et expériences sur le charbon malin, avec une méthode assurée pour le guérir.* Dijon 1769.

18) *Neues Magazin.* 3. B. p. 73.

19) *Traité de l'anthrax ou de la pustule maligne.* Paris 1781.

20) *Traité du charbon ou anthrax.* Paris 1782.

et CHAUSSIER²¹), J. J. H. BÜCKING²²), LEMASTRE²³), VIMAT²⁴), CHOPART²⁵), BUREL²⁶), ACHARD²⁷), CHATENET²⁸), FICKER²⁹), MATHY³⁰), E. H. STRUVE³¹), SCHRAUD³²), HEIROTH³³), RINNE³⁴), BRENSKY³⁵), KAUSCH³⁶), KOTTMANN³⁷),
LOH-

21) *Méthode de traiter la morsure etc., et de la pustule maligne.* Dijon 1785.

22) *Der gutartige Karbunkel und dessen Heilung.* Stendal 1786.

23) *Journal de médecine.* T. 7. p. 254.

24) FOURCROY *médecine éclairée.* T. I. p. 118.

25) *Ibidem* l. c. p. 343.

26) *Ibid.* T. III. p. 11.

27) *Ibid.* T. II.

28) *Essai sur l'antrax.* Paris an. XI.

29) *Beiträge zur Arzneywissenschaft, Wundarzneykunst und Entbindungskunst.* Münster 1796—1802.

30) *Briefe über Gegenstände der Therapie.* 1. Theil. Berlin 1801.

31) *Diss. de anthracibus seu carbunculis.* Kiliae 1805.

32) *Nachricht vom Scharbock in Ungarn, und Geschichte des brandigen Ausschlages, welcher Pokolwar genannt wird.* Wien 1805.

33) *Мѣдико-практическое описаніе болѣзни такъ называемой Сибирскою изд. Фридериковъ Гейрошомъ.* 1807.

34) *De pustula livida, morbo Esthoniae endemico.* Dorpati 1809.

35) *HORN's Archiv* 1811. Februar. p. 45 sq.

36) *In HUFELAND's Journ. der pr. Heilk.* 1811. Sept. p. 68—86. Octbr. p. 49—80.

37) *Die schwarze Blatter.* *Ibid.* 1815. Novemb. p. 88.

LOHMEYER³⁸⁾, RICHTER³⁹⁾, MARTINS⁴⁰⁾, HOPF⁴¹⁾, MAURER⁴²⁾, BUNGE⁴³⁾, CARRON⁴⁴⁾, HOCHMAYR⁴⁵⁾ et FR. A. VERGNIER DE VICDESSUS⁴⁶⁾ etc.⁴⁷⁾. Accedunt scriptores, qui Russiam perlustrarunt⁴⁸⁾.

§. LXX.

38) *Ein Beytrag zur schwarzen Blatter, als Folge des Milzbrandes. Ibidem. 1818. April. p. 68.*

39) *Die Karkunkel oder die schwarze Blatter in Pohlen. Ibid. 1822. December. p. 103.*

40) *Ueber die hie und da in Deutschland beobachtete schwarze Blatter oder Sibirische Brandbeule. Ibid. 1824. Octob. p. 101.*

41) *Beobachtungen und Bemerkungen über die sogenannte schwarze Blatterkrankheit. Altenb. 1812.*

42) *In KOPF's Jahrbuche der Staatsarzneykunde. Fünfter und sechster Jahrgang. 1813.*

43) *De morbo sic dicto Sibirico, homini cum animalibus domesticis communi, oratio. Mosquae 1819.*

44) *Observations sur l'utilité de l'application de la pierre à cautère pour arrêter les progrès du furoncle malin; appelé par les Italiens Vespasio. (Journ. général de méd. française et étrangère. T. LXIX, VIII. de la seconde série. No. 277. Décemb. 1819. p. 289).*

45) *Beobachtungen der Karkunkelkrankheit bey mehreren Menschen, welchen sie bey dem Abhäuten des am Milzbrand gefallenen Viehes durch Ansteckung mitgetheilt wurde. (Med. Jahrbücher des k. k. österreich. Staats. Neue Folge. 2. B. 1. St. p. 21).*

46) *Traité sur l'anthrax non contagieux. Par. 1824.*

47) *Краткое описаніе Сибирской язвы. Санктъ-Петербург. 1796.*

48) *GMELIN Reise nach Sibirien. 4. Th. p. 142. Gött. 1752. — СОФЕДИН Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs. Altenb. 1774.*

§. LXX.

Divisio. Symptomata. Necroscopia.

Divisio. 1. Jam de anthrace et carbunculo, ut *symptomatibus febrium gastricarum*, ex esu carniū animalium morbis contagiosis demortuorum pululantibus, mentionem injecimus¹⁾. De iis, quatenus *pestis* progeniem sistunt, mox dicemus²⁾, hic interea de anthrace et carbunculo, *per se* obveniente.

Symptomata. 2. Incipit hic morbus³⁾ cum pruritu, veluti ab ictu insecti, sive a scintilla. Sequitur vel tumor durus, inflammatorius, urens, solitarius, magnitudine plerumque baccae juniperi, vel majore,

1. B. p. 3. — GEORGI *Bemerkungen einer Reise im Russischen Reiche*. St. Petersburg 1775. — IMOLIN *Sibirische Reise*. 4. B. p. 290. — PALLAS *Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften*. St. Petersburg 1776. 1. B. p. 166. — *Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs*. St. Petersburg 1801. — *Neue nordische Beyträge* 1. B. p. 113. et 4. B. p. 398. — BRÜGE *Nachrichten seiner Reisen in Deutschland, Russland, der Turkey*. Leipz. 1784. p. 337. — FALK *Beyträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reiches*. St. Petersburg. 1785. 1. B. p. 260 et 372. — HERMANN *statistische Schulerung von Russland*. St. Petersburg. 1790. — HABLIGEL *neue nordische Beyträge*. 3. B. p. 394.

1) Cap. IV. §. XXI. No. 7.

2) Part. I. Vol. II. Sect. I. Cap. I.

3) Descriptio BUNGE, anthracia scilicet Siberici, cum hac nostra plane convenit (l. c.).

jore, apice elevatus, in medio punctum sive maculam aut vesiculam gangraenosam exhibens (*anthrax*); — vel *vesicula*, sive potius *phlyctaena* gangraenosa, ambitu indurato, livido, splendente, instructa (*carbunculus*). Utroque in casu, sensus in puncto gangraenoso deletur, ac loca propinqua, praevio interdum glandularum vicinarum morbozo augmento, rubore erysipelaceo, sive tumore oedematoso, sive utroque, nunc cum, nunc sine dolore, corripuntur. Rubor ille ad partes vicinas nonnunquam cum foco mali confluit; tumor vero vel supra eum elevatur, vel profundius haeret. Focus, aut crustam cineritiam, nigram (*eschara*), aut consuetae gangraenae humidae imaginem refert. Ibi anthrax sive carbunculus dicitur *siccus*, hic *humidus*. Raro malum solis integumentis inhaeret, sed plerumque musculos, tendines et pinguedinem afficit. Incisa anthracis aut carbunculi *sicci* substantia albicans, flava, livida, nigricans, ac non nisi paucas ichoris guttas manans, conspici solet. Anthrax vel carbunculus *humidus*, conspicuam et ex plurimis foraminulis saepe manantem saniei copiam largitur. Nunquam vero hisce in morbis suppurationis animadvertuntur indicia. Elapsis a prima morbi origine nonnullis horis, interdum uno alterove nychthemero, aegri vires franguntur, caput obtuse dolet, pulsus fit debilis, somnus inquietus est, et animus dejicitur. Jam vero febris, calore
uni-

universae cutis vel nullo, vel modico, pulsu autem admodum frequente, saepe vacillante, aut contracto stipata, subintrat. Conqueritur aeger de anxietate, de doloribus vagis artuum, et de peculiari cordis sensu, quod ipsi sublevari videtur. Sequuntur vaniloquia, hebetudo, stupor, ac, nisi mature succurratur, mors ipsa. Feliciori in casu eschara secedit, vel gangraenae limites ponuntur, atque rejectis partibus mortuis, ulcus remanet purum, ocyus serius relicta cicatrice plus minus deformi, sanandum. Quoad *sedem* anthracum et carbunculorum, observati fuerunt ad oculos⁴⁾, ad palpebras⁵⁾, ad genas reliquamque faciem⁶⁾, ad collum⁷⁾, ad nucham⁸⁾, ad dorsum⁹⁾, ad

mam-

4) Herodotus introduct. c. 45. — LIEUTAUD *Journ. de méd.* T. 29. p. 469.

5) AEGINETA Lib. 3. c. 22. §. 29. — AMATUS LUSITANUS Cent. 4. cur. 9. — DUPONT in CAPELLE *Journ. de santé.*

6) ACHARD, CHOPART l. c. WOJNIEWICZ diss. de carbunculo faciei. Vilnae 1812.

7) CAVILLANDI *observations iatro-chirurgiques.* Lyon 1640.

8) TESTART *Journ. de méd.* T. 43. p. 525. — MEASE in JONES *surgical Works.* — WERLHOFF l. c. — Plurima exempla anthracis nucham obsidentis in propria numero praei.

9) PANAROLUS Pentecost. II. — KIRKLAND on the present state of surgery. Vol. 2. — GORREL consiliorum Cent. I. No. 53. JONES transactions of Philadelphia. Vol. I. P. I. No. 20.

mammæ¹⁰⁾, ad penem¹¹⁾ et ad manus¹²⁾. Anthracem faucium¹³⁾ ad scarlatinam, anthracem vero ani¹⁴⁾ ad furunculum, gangraena accidentali stipatum, pertinuisse arbitramur¹⁵⁾.

3. Animadvertente CHOPART, textus cellulo-
sus partium anthraci sive carbunculo contiguarum
sanguine soluto repletus, pulmones rubri, tumi-
di, sero innatantes, epiploon et mesenterium li-
vida, intestina inflammata, gangraenosa, aliquan-
do cum volvulis¹⁶⁾, inveniuntur. Teste HEIROTH
carbunculus, qui in dextro colli latere sedem
occupaverat, circumdatus erat livido, per totum
pectus et abdomen propagato tumore. Cum ille
in vivo adhuc aegroto excisus esset, manabat
postea

Necrosco-
pia.

10) BUREL l. c.

11) RUST *Magazin der gesamt. Heilk.* 18. B. 3. Heft.
p. 453.

12) FRID. EPIPHANIO centum historiae.

13) ARETAEUS l. c. — TOURNEFORT *relation d'un vo-
yage au Levant.* — *Recueil des actes de la société de
santé à Lyon.* Vol. I. p. 28.

14) GARENKOT *chirurgische Operationen.* 2. Thl. 3. Cap.
p. 335.

15) Et POTT anthracem sibi ad furunculum revocat (*Ab-
handlungen über verschiedene Gegenstände der Wund-
arzneykunst.* Dresd. 1771. p. 79).

16) BERTIN *relations des accidens extraordinaires ob-
servés à la Guadeloupe sur les negres du quartier de la
Capesterre, à la suite de l'usage qu'ils ont fait de la
chaire d'animaux, morts d'une maladie épidémique.* (HU-
VELAND's Journal 1811. Octob.).

postea ex hoc loco dissolutus putridusque sanguis. Dissecto abdomine effluxit rubescentis liquoris a viginti ad viginti quatuor libras. Omentum majus carebat naturali colore, et multis locis peritoneo adhaerebat, quod et ipsum inflammatum erat nigrisque maculis obductum. Aequae inventa erat inflammatio et gangraena in ventriculo et intestinis tenuibus, quae in colo transverso summum attigit gradum. Hepar solitam habebat magnitudinem, sed parenchyma ejus obscurius apparebat; vesica fellea et ductus bili-feri inflammati solito minorem copiam bilis epistae et fuscae continebant.

§. LXXI.

C a u s s a e.

Contagium
epi-
zooticum.

1. Communissima carbunculi causa in commercio cum bobus, vaccis et capris, *lienitide*, ut vocant, vel simili lue laborantibus, invenitur¹⁾: sicuti enim carnes hujusmodi animalium comestae, febres gastricas carbunculis *symptomaticis* stipatae gignunt²⁾, ita jam solus eorum *attactus* carbunculo

1) Sic docent carbunculi saepius tum in Lithuania, tum prope Warsoviam (sub nomine *crustae nigrae*, *czarna Krosta*), tum in nonnullis Galliae meridionalibus regionibus (*charbon provincial*) obvii et quidem hic a PLINII temporibus (HARDUINUS in notis ad PLINIIUM l. c. p. 391. — BOUCHÉ Lib. I. Historiae Provinciae. c. 8. p. 47).

2) Cap. IV. §. XXI. No. 7.

culo *primario* locum concedit. Visi enim sunt carbunculi ex cura boum³⁾ et ovium⁴⁾ aegrotantium, ex attactu pellium caprarum lue enectarum⁵⁾, ex detractioe pellis tauri infecti⁶⁾, ex tractione pellium contaminatarum⁷⁾, ex introductione brachii in intestinum bovis aegri⁸⁾, ex sanguine bovis mactati⁹⁾, ex anatome vaccae¹⁰⁾,

li 2

cae¹⁰⁾,

- 3) CHAIGNEBRUN in *histoire de l'académie des sciences à Paris* 1764.
- 4) LOHMAYR (l. c.). Et: RUST's *Magazin für die gesammte Heilkunde*. 15. B. p. 135. („Merkwürdig ist, dass von den ein und zwanzig an der schwarzen Blatter (im Kreise Calbe a. 1822.) erkrankten Personen, zwanzig von Schafen, die an der sogenannten Blutseuche crepirt sind, angesteckt wurden“).
- 5) SEZZONI in *Salzburger med. chirurg. Zeitung*. 1804. 3. B. p. 113.
- 6) J. P. FRANK in *judaeo observavit*.
- 7) Carbunculum coriariorum morbum esse, ex RUST op. c. 17. B. p. 581. elucet.
- 8) *Fränkische Sammlung*. 3. B. p. 267.
- 9) GUALENDRINI in *Giornale di medicina*. Vol. 5. p. 135. REMER in HUFELAND's *Journal* 1814. Januar. p. 68. RUST op. c. 16. B. p. 438. („Bey der Bearbeitung der Haut (einer am Milzbrande gefallenen Leiche) hatte S. mit einem Messer den Schwanz aufgeschnitten, und hierbey waren ihm einige Tropfen schwarzes Blut auf die Arme gespritzt. Dieses behauptet er zwar augenblicklich abgerieben zu haben, indessen war doch gerade an dieser Stelle die schwarze Blatter entstanden“). Et op. c. 18. B. p. 329. („Im Neustädter Kreise fielen 1822 in einem Dorfe drey Rin-

cae¹⁰⁾, ac, uti vulgus in Lithuania contendit, ex ipso aëris contigui, ab effluviis epizooticis inquinati, afflatu. Contagium lienitidis tam facile ex animalibus ad animalia¹¹⁾, atque ab istis ad homines pervenire, ab homine vero ad hominem, uti videtur, haud propagari, mirum est¹²⁾.

Insecta. 2. Jam PALLAS suspicatus est, anthracem in Sibiria aliisque Imperii Rossici provinciis¹³⁾ endemicum (vulgo *Morawaja Jasswa*) ab insecto originem trahere. Hanc opinionem et HEIROTH, HOFF et REHMANN defendunt, quamvis nullus eorum praesentiam insecti demonstrare hucusque

potuerat am Milzbrande. Zwey Menschen, welche dieselben abgeledert hatten, wurden am Arme, und ein Dritter, welcher mit entblößten Füßen, die mit dem Blute der gefallenen Rinder befleckte Erde berührt hatte, am Fusse vom Milzbrand-Karbunkel befallen¹⁴⁾.

10) *Göttingische gelehrte Anzeigen*. 1793. p. 165.

11) Memorabilia sunt experimenta BARTHELEMY, insitionem contagii lienitidis respicientia, ex quibus inter alia colligitur, hoc contagium minorem vim in animalia carnivora, quam in herbivora exercere. (FRORIEF *Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde*. No. 188. 9. B. 1825.).

12) BERRA *giornale di medicina pratica* 1812. Cap. 4.

13) „Non in sola Sibiria sed et in aliis Rossiae provinciis, potissimum orientalibus, praesertim Asiaticis, ut in vastis desertis Barabinensi, et Ischimensi, supra flumen Irtysch, circa flumina Uy, Isset etc., item circa humiles Volgae ripas a Tauricis usque ad Astrachan.“ (BUNGE l. c. p. 4).

potuerit. Constat autem, anthracem Sibiricum aestate fervidissima¹⁴⁾ et in locis paludosis, ab insectis inquinatis, grassari, ac non solum homines, sed et equos bovesque, et in genere animalia, paucâ lanâ obiecta, afficere. Constat quoque inter *Calmucos*, insecta varia, praecipue *phalangium araneoidem*, *scolopendram morsitantem*, *bibionem sanguinarium* (vulgo *Moskora*) vitia cutis, anthraci similia, producere; nec minus constat, morbum, Sibiriae, neutiquam contagiosum¹⁵⁾ esse, et sine discrimine sexus et aetatis, inopinante cum pruritu et tumore, illi, qui ex punctura insectorum oritur, plane simili, ingruere, atque certissimo insectorum antidoto, *nicotiana*, profligari. Si objicias, malum Sibiricum, praecipuis quidem faciem, sed haud raro et *partes tectas* prehendere; — exiguo insecto viam undique patere, facile respondetur. Praeterea BUREL historias trium aegrotantium, anthrace in Gallia correptorum, refert, quorum duo censum puncturae ab insecto perceperunt, et tertius insectum, araneae simile, digitis arripuit. Observationes hujus naturae et apud CHOPART, ACHARD et RICHARD obveniunt¹⁶⁾. VIMAT, insecta per se innocua,

e. c.

14) „Aestatibus frigidiusculis Sibiriam non invadit, eo-
que minus alia loca.” (Idem, ibidem. p. 5).

15) ИКИОТН l. c. BUNGE l. c. p. 15.

16) *Recueil d'observations de medecine militaire. Vol. 2.*
p. 517.

e. c. muscas, fortuito ichorem ulcerum malignorum, sive contagium epizooticum secum ferre, ac insonti aliàs punctura anthracem sive carbunculum excitare posse, autumat. Mirum hinc non foret; si incolae Sibiriae etc. morbum istum in locis pascuis, contaminatis ab armentis lienitide laborantibus, moram faciendo, acquirerent. Sunt tandem qui putent, pravam tum atmosphaerae, tum aquarum conditionem, ad carbunculum endemicum producendum, concurrere¹⁷⁾.

Cachexia. 3. Senes, cachectici, ebrietati dediti, retentionibus urinae obnoxii¹⁸⁾ animique curis vexati, anthraci haud raro subjecti sunt. Excitatur idem morbus in valetudinariis aut convalescentibus ab aestu solis¹⁹⁾ et a repetita vesicatoriorum in eundem locum applicatione²⁰⁾. Et *bilis* inter causas illius pertinere videtur²¹⁾.

§. LXXII.

17) BUNGE l. c. p. 15.

18) LA FONTAINE in *Götting. Anzeigen* 1803. p. 626.

19) PORTAL *précis de chirurgie pratique*. Vol. 2.

20) A vesicatorio ad nucham, brevi temporis spatio, ter repetito, bis hujus partis anthracem J. P. FRANK observavit.

21) Carbunculi haec ex causa, potius *symptoma* febris gastrico-biliose constituere videntur. Inter eos carbunculus Hungaricus (POKOLUAR), quamvis symptomatibus febrilibus vix stipetur, attamen pro bilioso habetur a SCHRAUDIO (l. c. p. 112.).

§. LXXII.

D i a g n o s i s.

1. Anthraces et carbunculi confundi queunt ^{Facilis} cum bullis, cum erysipelate, cum furunculo et ^{confusio.} cum cancro.

2. Ne bullae cum carbunculo confundantur, ^{Distinctio} memoriâ retinendum, carbunculos ambitum ha- ^{a bullis.} bere induratum, lividum, splendentem, bullas autem duntaxat rubro halone circumdari; praeterea bullas ad volumen saltem amygdalarum rapide increascere, et sero flavescente, raro purulento repleri; carbunculos vero mox in medio punctum gangraenosum exhibere, exsiccari aut ichorem fundere.

3. Erysipelas sequentibus notis ab anthrace ^{Distinctio} et carbunculo differt. ^{ab erysipelate.}

*Erysipelas.**Anthrax et carbunculus.*

a. Ruborem diffusum exhibet.

a. Anthrax, tumorem inflammatorium circumscriptum prae se fert.

b. Pustulae tantummodo sub morbi curriculo evolvuntur.

b. Carbunculus, in primo jam morbi limine pustulâ notatur.

c. Gangraena solum in morbi acme accedit.

c. Gangraena initium tum anthracis tum carbunculi comitatur.

4. Anthracem et carbunculum pro morbis, ^{Distinctio} gradu tantum a furunculo diversis, habitos fuisse, ^{a furunculo.} nomen furunculi maligni, quod illis tributum fuit,

testa-

testatur. Conspicua autem inter hos morbos intercedit differentia potius a forma quam a sede¹⁾ determinanda.

Furunculus.

- a. Centro tumoris maxime dolente instruitur.
- b. Suppurationem semper exhibet.
- c. Nucleo in medio instructus est.

Anthrax et carbunculus.

- a. Centrum mali, sensu orbatum referunt.
- b. Suppurationem nunquam offerunt.
- c. Gangraenam in medio exhibent.

Interea non negandum dari morbum, veluti *medium inter furunculum et anthracem tenentem*²⁾, a nonnullis *Vespajum* dictum³⁾.

Differentia
inter an-
thrac. et
carbunc.

5. Anthracis et carbunculi nomina ut *synonyma* vulgo sumuntur. Ex tradita autem utriusque mali definitione, alius opinionis nos esse elucet. Nec antiqui scriptores⁴⁾ anthracis a carbunculo distin-

- 1) VICDESSUS (l. c.) contendit anthracem a furunculo et abscessu distingui, quoniam ille sedem habet in ipso contextu corii.
- 2) FOSBROOKE (*the Edinburgh medical and surgical Journal* 1821. January) cum *carbuncular furuncle* vocat.
- 3) A VOCE ITALICA *Vespajo*. GERM. *Wespennest*. GALL. *Gulpier*. (MALVANI in *Journ. de médecine*. No. 294. et: GERSON und JULIUS *Magazin der ausländischen Literatur der gesamt. Heilkunde*. 3. B. p. 465).
- 4) AVICENNA, anthracem sub nomine ignis *persici*, et carbunculum sub eo *prunae* descripsisse videtur. FRANC. WIDEMANN inter anthracem et carbunculum differentiam statuit, quod hic sedem suam semper in

distinctionem, cui nuperrime et MOUTON accessit⁵⁾, neglexerunt. Neque gradu tantum, e. c. uti erysipelas levigatum ab erysipelate pustuloso, dicti morbi inter se differunt: cum vesicula sive phlyctaena carbunculi tumori inflammatorio anthracis non *superveniat*, sed morbi illius jam constituat *initium*. Differentia demum anthracis a carbunculo ipsi caussarum diversitati superstruitur; insecta enim, cachexia *anthracem* potius; — contagium autem epizooticum *carbunculum*, *pustulam* scilicet malignam proprie dictam, excitant.

6. Cum carbunculo similitudinem habere videtur morbus, inprimis regionibus calidis proprius, de quo AETIUS⁶⁾, DIOSCORIDES⁷⁾, SEVERINUS⁸⁾, RIVERIUS⁹⁾, FORESTUS¹⁰⁾, potissime vero STRACK¹¹⁾ sub nomine *epinyctidis* egerunt. Consistit epinyctis in *pustula* solitaria, sublivida, vel subnigra, maxime *noctu* in cute erumpente, cum dolore intensissimo, instar ignis urente, humore tenui et acri referta, post paucos dies in ulcus icho-

Epinyctis,
thermin-
tum quid
aint?

glandulis cutis habeat, ille vero in panniculo tum carnosio, tum adiposo (*Kurze und allgemeine Lehre der Wundarzneykunst. Augsburg 1737. 2. edit. p. 299*).

5) *Diction. des sciences médicales. Paris 1812. T. 2. p. 183.*

6) *Tetrab. IV. Serm. 2. c. 61.*

7) *Facile parab. cap. 172.*

8) *De recondita abscessuum natura. Lib. VII.*

9) *Observat. communic. No. 1.*

10) *Obs. chirurg. Lib. I. obs. 16.*

11) *HOMERI diss. de epinyctide. Mogunt. 1776.*

ichorosum sordidum abitura, materiam viscosam glutinosam fundente¹²⁾; nunc vero in *pustulis plurimis*, discretis, eodem tempore in trunco vel et in extremitatibus corporis, fabae magnitudine vel etiam minore, erumpentibus. *Thermintum Galeni* hac pertinere verisimile est¹¹⁾.

§. LXXIII.

Prognosis. Cura.

Prognosis. 1. Anthraces et carbunculi neque resolutionem¹⁾, neque suppurationem admittunt; ac nisi antequam universum corpus inficiant, qua decet ratione, curentur, aegrotum praecipitant. Frequenter vero morbi initium ab ignavis vilipenditur²⁾. Anthrax faciei, animadvertente jam AETIO, praec

12) STRACK quandoque plagas, quinque aut sex pollices longas, quatuor vero pollices latas, hinc inde cutem ipsam nigram, quasi igne adustam, aecedente paulatim eschara profundiore, *foveam* in cute relinquire observavit. Cicatricee similes *Berolini* apud nonnullos, qui, fatente egregio HENR, morbo entis vix definiendo antehac laboraverant, me observasse recordor.

13) *Therminti GALENI* sunt pustulae, basi rubra, purpureae, in apicem nigrum desinentes, summe dolentes, cum gangraenae periculo.

1) Contrarium quidem asserit BUNGE (l. c. p. 19.) saltem de anthrace Sibirico.

2) Incolae Sibiriae, quibus carbunculus epidemicus bene notus est, proveniente eo non expavescunt, certi (?) enim sunt, admotis statim remediis morbum absque malis sequelis abiturum. (BUNGE l. c. p. 6).

prae aliis malignus est. Pessimi quoque ominis observatur anthrax æenum, nisi, eo comparente, alia evanescent mala. Nunquam autem carbunculum *criticum* vidimus. In genere, dum hi morbi sibi ipsis limites ponunt, bonum est. Sin affectio localis celerrime decurrit, si morbus universalis eam proxime sequitur; mors ipsa, spatio paucorum dierum, aliquando secundo jam ingruente nychthemero, praevidenda est.

2. *Leges politiae medicae,* adversus morbo-^{Prophylactica.}rum epizooticorum propagationem stabilitae, pericula quoque carbunculi hoc ex fonte contrahendi avertunt. Qui ab insectis oriuntur anthraces, hi forte *fumo*, ex stercore et vegetabilibus, in locis suspectis accensis, per aërem disperso, praepedirentur. Et corporis superficiem oleo illiniri, vel faciem saltem ope retis oleo foetenti imbuti obtegi, non inutile erit. Nec *assae foetidae* parcendum foret³⁾.

3. In anthrace et carbunculo *a causa externa* C. ^{generatum.}nascentibus prima indicatio est: irritationem inflammatoriam compescere, focus mali destruere, ac imperio illius in universum corpus limites ponere. Praesente *causa interna*, actio principii morbose ad cutem promovenda, primae viae, si opus est, expurgandae, ac vires vitae sustinendae sunt.

3) Vulgus (Sibiriae) suspendit collo animalium gummi-resinam *assae foetidae* vel inungit superficiem corporis pice liquida. (Buxor l. c. p. 17).

sunt. Haec ultima indicatio, et facto jam viti localis in morbum universalem transitu, locum habebit.

C. localis. 4. Ad compescendam inflammationem focus mali ambientem, praeter *hirudines*, *cataplasma emolliens* applicandum est. *Fomenta frigida*, hoc in morbo cum successu jam tentata⁴⁾ et quae analogia anthracis cum gangraena a gelu commendare videtur, ulteriori tentamini, saltem in recenti morbo, subjicienda forent. Stupendos inde nuper obtinuimus effectus⁵⁾, obtinuerunt alii⁶⁾ Senescente malo, ac inducto jam sphacelo, *fotus* partium finitimarum cum *herbis aromaticis in vino decoctis*, conducit. Plagae gangraenosae
parum

4) YONGE in BEDDOES *contributions to physical and medical knowledge*, 1799. No. 5. Vide et *FÄRSE Annalen* 1. B. 1. St. No. 4.

5) Vilnae aestate a. 1821. a D. SOLTKEWICZ ad curationem militum senem, cachecticum, convulsionibus epilepticis obnoxium, in consilium vocatus sum, cui arthrax, seu potius id genus furunculi, quod *Vespa-jum* nuncupant, ad dorsum prorupuerat. Malum a circumferentiam trium palmarum extensum erat, e rubor lividus longe ultra, cutim occupabat. Praeterea vires admodum dejectae erant, febrisque conspicua. Suasi ut medio tumoris cataplasma tepidum emolliens imponeretur, circumcirca vero *fotus* ex *aqua frigida* cum aceto lithargyri adhiberetur. Sic illico morbo prius cunctis auxiliis resistenti, frenum injectum est aegro orci faucibus erepto.

6) FICKER l. c. — KOTTMANN l. c.

*parum extensae, caustica, e. c. aut pulvis supersulphatis aluminae fusi (alumen ustum), aut nitrus argenti fusus (lapis infernalis), aut murias antimonii (butyrum antimonii), aut ignis⁷⁾ et calx viva⁸⁾ olim adhibitae, aut lapis causticus chirurgorum nuper commendatus⁹⁾, imponi queunt. Et solutio salis medii, ex connubio acidi muriatici oxygenati cum soda aut cum calce emergentis, tentanda foret¹⁰⁾. Eschara jam mobilis, ut ichori liber concedatur effluxus, forficibus abigitur. Praesente autem *majoris ambitus sphacelo*, a causticis abstinendum, et *scarificatione* partis mortuae, haec a viva separanda est. Licet et duplex filum cum acu incurvata per locum gangraenosum ducere, ac sumtis elevatisque extremitatibus illius, hunc discindere, ac si quid de sphacelo remaneat, per scarificationem abigere. Vel ipsa partis affectae *amputatio* proposita fuit¹¹⁾.*

Loco,

7) Celsus. Lib. V. c. 8. No. 1. — DE LA VIGNE:

Ergo anthraci ferrum et ignis? Paris. 1616.

8) AETIUS l. c.

9) CARRON l. c. — HOCHMAYER l. c.

10) *Observation d'une affection gangréneuse de la joue, guérie par le chlorure d'oxide de sodium de Mr. LABARRAQUE, communiquée à l'académie R. de médecine dans sa séance du 10. Avril 1823, et insérée dans la revue médicale par Mr. REY. Cfr. A. G. LABARRAQUE de l'emploi des chlorures d'oxide de Jodium et de chaux. Paris 1825. p. 12.*

11) HELVETIUS: Ergo amputatione tutius, quam decussata sectione, anthrax serpens curandus? Paris. 1740.

Loco, prius a gangraena obsesso, *unguentum* aut *digestivum*, aut de *styrace*, aut *aegyptiacum*, aut simile¹²⁾ applicari debet. Interim a rebus nimis irritantibus abstinemus, ac ODIERI potius consilium, cataplasma ex *pulvere carbonum opio* et *camphora* commendantis¹³⁾, sequimur. Immo si ulcus omnino purum fuerit, illud filamentis carptis, aqua tepida imbutis, cooperiri ac sanationis opus naturae committi, sufficiet. Sibiriae populi anthracem cum acu vel subula perforare ac ope *muriatis ammoniae* et *foliorum nictianae tabaci* perfricare solent: Sunt inter eos, qui sine praevia scarificatione *lixivium potassae* et *decoctum tabaci* cum *alumine* super anthracem applicent. Alii cataplasma calidum ex pulvere *herbae solani dulcamarae* cum *muriate ammoniae*, *fermento panis* et *farina avenae* anthraci imponunt. Confirmata magis suspicione latentis in anthrace Sibiriae insecti, *sulphuris* et *mercurii*¹⁴⁾ virtus

12) CHAMBERON sequens commendat remedium: R. Pulveris acetatis cupri (aerugo crystallisata) unciam unam; — aloes succotrinae, gummi resinae myrrhae aa unciam semis; — alcohol camphorati et ammoniaci, theriacae venetae, mellis puri aa unciam unam. F. unguentum. — MENDRET unguentum ex vitello ovi et uncia una muriatis addae (sal commune) parat et anthraci illiniri jubet (*Journ. de médecine de Paris* 1810. p. 82).

13) *Manuel de médecine pratique*, p. 48.

14) *Expérience sur la guérison du charbon au moyen du*

virtus exploranda foret. Item *gummi resinae formulae assae foetidae*.

5. *Venae sectio*, quamvis a medicis antiquis C. universalia. et non ita pridem a BERTINIO in anthrace et carbunculo commendata, tamen, rite cum aliis animadvertente CHAMBERLAIN, vix locum obtinet¹⁵⁾. Prehenso contra ea jam toto systemate et praesentibus indiciis gastricis, nulla obstante contraindicatione *c. c. gastritide*¹⁶⁾, ad *emetikum*, a SCHRAUDIO maxime laudatum, sine mora confugiendum est. *A remediis alvum purgantibus*, quoniam lente agunt, ac vires facile prosternunt, abstineri suademus. In anthrace a morbo *universali* originem trahente levia *diapnoica* cum parvis tartari emetici dosibus conducunt. Febrem ingruentem *acidis tum mineralibus, tum vegetabilibus*, inprimis

succo

mercuris. Par FERRA MOSEA (*observ. med.* 1. Marzo 1824).

- 15) Forte anthrax Sibiriae exceptionem constituit. Scribit saltem BUNON (l. c. p. 20.): „Febris, quae tunc temporis nascitur, characterem habet inflammatorium, crescenteque ea formantur inflammationes viscerum abdominalium, forsan et pulmonum: quamobrem tam vitii hujus avertendi, quam totius morbi sanandi causa, omnino laudanda est methodus antiphlogistica. . . . Propterea itaque instituenda est venaesectio, quantum vires aegroti aliaeque majoris momenti res permittunt; plus aut minus larga, et necessitate urgente, vel symptomatibus recrudescuntibus repetenda.“
- 16) Haec et nitri usum excludit (BUNON l. c.) et exposcit mucilaginosam, oleosam, clysteres etc.

*succo citri medicae*¹⁷⁾, temperare oportet. Decrescentibus magis magisque viribus, *decoctum corticis cinchonae officinalis*, infusum radicis *aristolochiae serpentariae*, *camphora*, *subcarbonas ammoniae*, cum *vino* et *jusculis carneis meracibus*, potissima sistunt auxilia. Vel somno indulgere, vel ab eodem abstinere¹⁸⁾ aeger cupiat, ejusdem hoc votis relinquimus. Sub *convalescentia* omnis in conditionem viscerum abdominalium dirigi debet attentio, ac labefactata eorum functione potissimum ad remedia amara, si alvus tarda fuerit, lenibus purgantibus nupta, deveniendum est.

17) BERTIN l. c.

18) BONELLI, de carbunculo in urbe *Rupescurum* endemico loquens, abstinentiam a somno per novem dies potissimum fuisse remedium, refert. (Cent. 2. observat. Obs. 12.).

